

ວັນທີ ៣ តុລាស ២៥១១



อบุสรณ์
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ
ขุนไธสงการวม
(เชื้อม รัตนกนก)

ณ เมรุวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท ๒๒
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑

บันทึก

เลขหมู่ 616.0252

0252.0

ว. 2

เลขทะเบียน 021654


1951



ขุนโอสถกรรม (เชื่อม รัตนกนก)

ช้าตะ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๖

มรณะ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๑



๔๕
สมเด็จพระยาปิยนาทเรนทร ทรงฉายร่วมกับคณะแพทย์รพท ๒๒

ประวัติ

ขุนไธสงธรรม (เชื้อม รตนกนก) เกิดที่จังหวัดอ่างทองเมื่อวันท ๒๗
พฤศจิกายน ๒๔๓๖ มีชีวิตที่ต้องต่อสู้พึ่งตนเองมาแต่เด็ก ได้มาอยู่กรุงเทพฯ
กับคุณน้าทองคำ จันทนชาติ จนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดมหาธาตุ
จากนั้นได้เข้าเรียนที่วชิราภิเษก มาจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้เข้าศึกษาวิชาแพทย ที่ราชแพทยาลัย สำเร็จเป็น
แพทย์รุ่นที่ ๒๒ เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๐ รับราชการประจำกองไธสงธรรม โรง
พยาบาลศิริราชและในปีนั้นได้สมรสกับ เน่ง พึ่งสมบูรณ์ ข้าราชการใน
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งโปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นข้าหลวง
พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท และสมเด็จพระยา ชาญนาท-
นเรนทร เมื่อสมรสแล้วได้ไปอยู่ทวงสมเด็จพระยาชาญนาท

วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๔๖๑ สมเด็จพระยาชาญนาทฯ โปรดให้
มาเป็นแพทย์ประจำวังสระปทุม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดเกล้า
ปลูกเรือนประทับ ในขณะนั้นก็ยังไปทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชด้วย งาน
ที่มากมาย บางวันต้องกลับเวลาค่ำมืดซึ่งลำบากมาก ถนนหนทางและรถ
รับส่งก็ไม่สะดวกเหมือนในขณะนี้

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๖ ได้กราบถวายบังคมลาออกมาอยู่บ้าน
ทถนนมหารณพซึ่งใกล้ทำงาน

พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โท ชุนโอสถกรกรม
ได้ไปราชการซ่อมรถเสือป่า ได้รับพระราชทานนามสกุล “รัตนกนก” และ
เสมา ร.ร. ๖

พ.ศ. ๒๔๖๘ ออกจากราชการ ได้เปิดคลินิก โอสถศัลยกิจ ที่ถนน
ตะนาว ประสงค์ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ได้จัดตั้งเป็นบริษัทโอสถ-
ศัลยกิจ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๘๓

ชุนโอสถกรกรมมีบุตรธิดา ๕ คน

- ๑ นางอสนัย ลานติวัตร
- ๒ นายแพทย์ ปรีณันท์ รัตนกนก
- ๓ พ.ต.ท. นายแพทย์ สุปรีชา รัตนกนก
- ๔ นายเปรมานนท์ รัตนกนก
- ๕ น.ส. อัมพชนิ รัตนกนก

ชุนโอสถกรกรมเป็นผู้ทรมารกายแข็งแรงตลอดมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
นายแพทย์เลม พริงพวงแก้ว ผู้ซึ่งเป็นมิตรที่ดีของครอบครัว ได้ตรวจพบ
ว่าเป็นความดันโลหิตสูง ได้ให้การรักษาตลอดมา

๒๘ เมษายน ๒๕๑๑ มีอาการผิดปกติ ได้ไปทำการเอกซเรย์
พบว่าเส้นโลหิตใหญ่พอง นับแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ มีอาการเป็นลม
หลายครั้ง นายแพทย์เลม ได้มาให้การรักษาอยู่ตลอดเวลา

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว
มีอาการเป็นลม ได้ไปเชิญนายแพทย์เสมแต่ยังไม่ถึง แพทย์หญิงอัมพิกา
พลเกล้า ซึ่งอยู่ใกล้บ้านได้กรุณามานัดยาและนวดหัวใจให้ แต่อาการก็ไม่
ดีขึ้น และถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา ๑๘.๓๐.น. รวมอายุได้
๗๕ ปี ๖ เดือน

ขอขอบพระทัยและขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระทัยและขอขอบพระคุณ สำหรับเกียรติยศและการบำเพ็ญ
กุศลที่ได้ประทานและให้แก่อนุโสดกรรม นับแต่บวชและหลังจากถวายชนม์
จนถึงงานพระราชทานเพลิงศพ

และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์นายแพทย์สงกรานต์ นิยมเล่น
นายแพทย์ เสนอ อินทรสุขศรี และคุณจิตต์ แพ้วพานิช กรุณาอนุญาตให้
พิมพ์ หนังสือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพ่อบ้าน แม่บ้าน และประชาชน
ทั่วไป หนังสือปัจจุบันพยาบาล และหนังสือความรู้เบ็ดเตล็ด

เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอผลบุญ
แห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญแล้วนั้น จงดลบันดาลให้ท่านประสบ
แต่สิ่งที่ดีงามอันพึงปรารถนาทุกประการ หากจะมีนิทานใดที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
จะทราบได้ก็คงจะปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โดย

ศาสตราจารย์นายแพทย์สงกรานต์ นิยมเสน

ถ้าคนใดคนหนึ่งได้รับอันตราย อุบัติเหตุ หรือเกิดป่วยไข้ขึ้นทันที ก็จำเป็นต้องทำการช่วยเหลือเป็นการปฐมพยาบาล ก่อนที่แพทย์มาถึง หรือ นำส่งโรงพยาบาล ฉะนั้นการที่ท่านทำการปฐมพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป ถูกผิด ผิดถูก หรือละเว้นการช่วยเหลือเสียก็ผิด อาจหมายถึงความเป็น หรือความตายก็ได้

ข้อแนะนำทั่วไป

๑. อย่าเคลื่อนผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ ตกจากที่สูงถูกทับ หรือถูกกระแทกอย่างแรง เว้นเสียแต่จำเป็นจริง ๆ เช่น เคลื่อนผู้ป่วยหลบจากกลางถนนไปริมถนน เพื่อกันรถทับเท่านั้น

การเคลื่อนไหวนั้นผู้ป่วยจำพวกนี้ ยิ่งทำให้กระเทือนจะเกิดอันตราย มากขึ้น เช่น ผู้ป่วยหลังหักอาจจะตายเลย หรือผู้ป่วยเลือดตกใน อาจจะ เลือดออกมากขึ้น เพราะการกระเทือน

๒. ตัดสินใจช่วยโดยเร็ว เพราะเรื่องอย่างนี้รอรอไม่ได้ เช่น ผู้

บ๊วยเลือดตกมากก็ช่วยห้ามเลือด กินยาพิษก็ช่วยถอนยาพิษ จมน้ำก็ช่วย
ผายปอด ถูกไฟฟ้าช๊อคก็ช่วยเอาสายไฟออกแล้วผายปอด ผู้บ๊วยอาจตาย
เสียก่อน ถ้าท่านยังรอรอหรือตกตะลึง หรือไม่ตัดสินใจ

๓. ในเหตุฉุกเฉินเช่นนี้ พยายามช่วยไว้อีก่อน โดยที่ไม่เป็น
ผลร้ายต่อผู้บ๊วย ดังนี้

จัดให้ผู้บ๊วยนอนราบโดยสงบ

ถ้าผู้บ๊วยอาเจียน พลิกศีรษะให้ตะแคง อาเจียนนั้นจะได้ไม่ตก

ลงไปนอนปอด

หาผ้าหรือเสื้อคลุมให้ผู้บ๊วย อย่าปล่อยให้หนาวหรือลมโกรก
แต่อย่าให้ร้อนเกินไป

๔. ถ้าเสื้อผ้านี้อยู่ทำให้เจ็บปวด ตัดออกค่อย ๆ อย่างตั้งใจ อย่า
ดึงเสื้อผ้านี้ออกในรายบาดแผลไฟไหม้

๕. ปลอบใจผู้บ๊วยไว้ และแม่แต่ตัวท่านเอง

แจ้งให้ผู้บ๊วยทราบว่า ไม่มีอันตรายร้ายแรง และกำลังได้รับความช่วยเหลือ

๖. พร้อมทั้งจะรักษาอาการช๊อค (ดูเรื่องช๊อค)

๗. อย่าเพิ่งให้กินอาหารอะไรทั้งสิ้น

ถ้าผู้บ๊วยหมดสติ ห้ามขาดแม่แต่น้ำ ห้ามสุราทุกชนิด


อย่าพยายามปลุกผู้บ๊วยที่หมดสติ

ตู้ยาประจำบ้าน

ท่านควรม^๒ตู้ยาประจำบ้าน^๒พร้อมเส^๒มอ เป็นเรื่อง^๒ที่ร^๒อกัน^๒ไม่^๒ได้ ทุก^๒
 ด้^๒ง^๒ทุก^๒อย่าง^๒ควร^๒เขียน^๒บ^๒้าย^๒ไว้^๒ให้^๒ช^๒ัด^๒เจน อย่า^๒ใ^๒้^๒กุ^๒ญ^๒แจ^๒ตู้^๒ยา มิ^๒ฉะนั้น^๒จะ^๒มี^๒ว^๒เด^๒ย^๒
 เว^๒ลา^๒หา^๒ล^๒ูก^๒กุ^๒ญ^๒แจ^๒อยู่ จ^๒ง^๒เก็บ^๒ตู้^๒ยา^๒อย่า^๒ให้^๒ส^๒ู^๒ง^๒เก^๒ิน^๒ก^๒ว^๒า^๒ที่^๒เด^๒ก^๒จะ^๒ห^๒ย^๒ิ^๒บ^๒เล^๒น^๒ได้ ควร^๒
 มี^๒ช^๒ุด^๒เล^๒็ก^๒อก^๒ช^๒ุด^๒หน^๒ึง^๒ใน^๒ร^๒ถ^๒ย^๒น^๒ต^๒ร^๒ของ^๒ท่าน ท่าน^๒อาจ^๒ซ^๒อ^๒ตู้^๒ยา^๒ได้^๒จ^๒าก^๒ทาง^๒การ^๒
 ส^๒า^๒ชา^๒ร^๒ณ^๒ส^๒ุ^๒ช



☐ จ^๒ง^๒เก็บ^๒ตู้^๒ยา^๒ให้^๒ส^๒ู^๒ง^๒เก^๒ิน^๒ก^๒ว^๒า^๒ที่^๒เด^๒ก^๒จะ^๒ห^๒ย^๒ิ^๒บ^๒เล^๒น^๒ได้



ระวังการชุกชนของเด็ก อย่างางของอันตรายไว้ใกล้มือเด็ก

ชนิดของการปฐมพยาบาลแบ่งตามสาเหตุ

๑. อวัยวะ
๒. อันตรายต่าง ๆ
๓. โรค
๔. อุบัติเหตุ

อวัยวะ

โรคหัวใจ

ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจมักรู้ตัวก่อนแล้ว มีอาการปวดอย่างรุนแรง บริเวณหน้าอกซ้าย แน่นหน้าอก หายใจไม่ทัน สิ้นหวัง

ผู้ป่วยจะยืนอยู่ไม่ไหว ต้องลงนั่งหรือนอนลง ฉะนั้นจึงช่วยผู้ป่วย ให้นอนในทท่าสบายที่สุด เช่น นอนหงาย บังคับผู้ป่วยอยู่ในท่านั้น อย่าให้ ลุกนั่งหรือเดินเป็นอันขาด พอหายปวดจึงพยายามให้ผู้ป่วยนอนราบ

ขยายเส้นผ่า ขยายเส้นซัด ขาดมหรือยาหอม จะช่วยให้ผู้ป่วย สบายใจขึ้น (แต่ไม่รักษาอาการ)

กระดูกหัก


นอกจากงอหักจนเห็นชัด กระดูกหักเห็นได้ยาก จึงต้องเอกซเรย์ ช่วย ฉะนั้นในรายสงสัยให้ถือไว้ก่อนว่าเป็นกระดูกหัก และจัดการรักษา อย่างกระดูกหัก และถึงแม้ว่าผู้ป่วยนั้นยังเดินได้ กระดูกขาอาจจะหักได้

ถ้ากระดูกหัก แหว่งทะลุออกมานอกผิวหนัง ทำได้เพียงคอยดูห้าม เลือดเท่านั้น อย่าดันกระดูกกลับไป หรืออย่าเช็ดแผล ปลอຍให้เป็นหน้า ทแพทย์

ระวังอย่าทำตนเป็นแพทย์ ดึงกระดูกเข้าที่เสียเอง

ถ้าจำเป็นต้องพาผู้ป่วยไปหาแพทย์ด้วยตนเอง ก็ควรใส่เฝือกเป็น การปฐมพยาบาลชั่วคราว จุดประสงค์ของการเข้าเฝือก คือ เพื่อไม่ให้กระดูก หักนั้นเคลื่อนไหว

เผือกชั่วคราวนั้นใช้อะไรก็ได้ แม้แต่หนังสือพิมพ์หนา ๆ เพื่อพยุง
สำหรับหักทแยง หรือไม้แข็งสำหรับหักทงา เลือกลักษณะเผือกให้ยาวกว่า
แล้วเอาผ้าพันเผือกก่อน รองไว้กันกดเจ็บ



กระดูกเคลื่อน

อย่าพยายามรักษากระดูกเคลื่อนเสียเอง ปลดปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่
แพทย์ ถ้ามีอาการเจ็บ พยายามหนุนไว้ หรือใช้ผ้าคล้องไว้ พยายามอย่าให้
ข้อที่หักนั้นมีการเคลื่อนไหวได้ เพราะจะทำให้เจ็บและดิ่งกลับเข้ายาก ถ้ามี
อาการบวมและเจ็บด้วย ใช้ถุงน้ำแข็งวางไว้เพื่อบรรเทา บ้างครั้งอาจมีกระดูก
หักหักกระดูกเคลื่อนด้วยกัน ท้ายที่สุด คือ นอนราบนิ่งเฉย ๆ รับประทาน
ให้ถึงมือแพทย์โดยเร็ว

คอหัก หลังหัก

อันตรายจากคอหักหรือหลังหัก คือเนื่องจากภายในกระดูกสันหลัง
คอและตอนหลังนั้นมีของสำหรับประสาทไขสันหลัง ถ้ากระดูกหักอาจกด
ประสาทสันหลังเป็นอันตราย ถ้าผู้ป่วยมีอาการอัมพาต กระดูกกระดูกมือไม่
ได้ หรือขาตามแขน กระดูกคออาจหัก ถ้าผู้ป่วยมีอาการอัมพาต หรือขา
ทขา บัสสาวะอุจจาระไหล กระดูกสันหลังอาจหัก ช่วยขยายเนื้อผ้า หรือ
เข็มขัดทรุดออก พยายามให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง อย่าเคลื่อนไหวเพราะรอยหัก
จะกำเริบ

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระดูกหัก กระดูกเคลื่อน คอหัก หลังหัก





ดังทราบแล้วว่า กระตักหัก
กระตักเคลื่อน คอหัก หลังหักเหล่านเป็น
อันตรายต่อชีวิตเพียงใด ดังนั้นอย่าพยายาม
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เว้นแต่จำเป็นจริงๆ
ถ้าจำเป็นจงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีเอาผ้า
รอง แล้วลากทางตัวไปอย่าลากทางข้าง
ถ้าจะอุ้มจงอุ้มทั้งตัว อย่าให้ศีรษะตก ถ้า
ขาหักอย่าให้ขาดก ถ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ไปไกล และไม่มแปล อาจใช้เกาอ่อนนอน
แทนหรือทำแคร่ หรือใช้เกาอ่อน

ควรนึกถึงวิธีทำแคร่ง่าย ๆ โดยใช้ไม้สอดเข้าไปในทางเกงหรือเสื้อ


แผลฉีก

จงทราบไว้ว่า บาดแผลฉีกก็อาจถึงตายได้ถ้ามีโรคแทรก ใช้น้ำ
ต้มแล้วล้างแผลให้สะอาด เทน้ำลงไปตรงกลางแผล ให้น้ำชะออกมา ระวัง
ล้างมือให้สะอาด มือสกปรกของผู้ทำแผลอาจนำเชื้อโรคเข้าไปได้ใช้ทั้งเจอร


ไอโอดีน ๑-๒% ไอโอดีน ๑% เมอคิวโรโครม (ยาแดง) ๒% อากิฟลาวิน (ยาเหลือง) ๐.๑% หรือผงซัลฟา อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ใช้ผ้าสะอาดปิดแผล แลวพันผ้าหรือใช้ผ้ายางปิด ถ้าแผลถลอกนั้นลึกปรกมาก เช่น ลมกลางถนน อาจมเชอบาดทะยกหรือเชอแกดแกงกรนได้ ควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย ว่า ไปล้มที่ไหนมา

แผลฟกช้ำ

แผลฟกช้ำมักไม่เป็นอันตรายมาก ถ้าไม่ลึกถูกอวัยวะภายในควรใช้ ยาบาดแผลทาไว้ แลวเอาผ้าสะอาดปิดไว้ ถ้าผิวหนังถลอกด้วย ควรปฐม



แสดงวิธีพันแผลที่ฝ่ามือ



แสดงวิธีพันแผลที่นิ้ว

พยายามอย่างขาดแคลนออกเพื่อระงับการอักเสบ ใช้น้ำอุ่นประคบให้ยุบเร็ว

แผลถูกฟัน

แผลถูกฟันด้วยของคมคมคมเลือดออก ดูวิธีการ “ห้ามเลือด” ควรระวังความสะอาดในการห้ามเลือด อย่าให้เชื้อโรคเพิ่มเข้าไปอีก ถ้าปากแผลอ้ามากดึงปากแผลให้ชิดกัน เอาผ้าสะอาดปิดแล้วใช้ผ้าพันไว้ ให้ระวังการอักเสบซึ่งจะตามมาภายหลัง เช่น เป็นหนอง ถ้าแผลนั้นลึกปรกมาก เช่น มีดเก่าเป็นสนิม ผูกกลางถนนเข้าไป เช่นนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อป้องกันบาดทะยักหรือแก๊สแกงกรัน ถ้าแผลอ้ามาก ลึกมาก ยาวมาก เลือดออกมาก ถึงแม้จะให้ปฐมพยาบาลแล้วก็ตาม ยังต้องไปหาแพทย์

แผลถูกแทง

โปรดทราบไว้ว่า แผลถูกแทงอาจถึงตายได้ด้วยเลือดตกในหรือโรคแทรก พยายามบีบแผลให้เลือดออกมาข้างนอก ทงนเพื่อช่วยชะล้างสิ่งสกปรกซึ่งอยู่ลึกลงไปออกมาด้วย การใช้ยาไล่แผล เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ๓-๕% เมอคิวโรโครม ๒% อากิฟลาวิน (ยาเหลือง) ผงซัลฟา ควรให้ยาไหลลึกลงไปด้วย แผลถูกแทงลึกเลยผิวหนังควรให้แพทย์ดูเสมอ เพื่อป้องกันโรคแทรก

เสียน้ำ-หนามตำ

ล้างรอยตำและรอบๆ ให้สะอาด ทาด้วยยาไล่แผล เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ๓-๕% เมอคิวโรโครม (ยาแดง) ๒% หรืออากิฟลาวิน (ยาเหลือง) ๐.๑% เอาเข็มทลนไฟจนปลายไหม้ ค่อยๆ เขี่ยออกอย่ารีบร้อน เสร็จแล้วเอายาทาอีกครั้ง เอาผ้ารองไว้จนกว่าแผลแห้ง

ลิว


อย่าบีบลิ้นเป็นอันตราย อันตรายมาก ล้างหน้าให้สะอาดแล้วใช้ยา
ไล่แมลง ถ้าลิ้นกลายเป็นหนอง ใช้ยาแล้วปล่อยให้แห้งเอง โดยเอาผ้า
สะอาดปิดไว้ อย่าบีบ ถ้าเกิดการอักเสบที่หน้าเพราะเรื่องลิ้น แสดงว่าลิ้นเกิด
พิษแล้ว รับประทานยาโดยเร็ว

ผ

อย่าพยายามบีบฝี หรือเจาะก่อนกำหนด เพราะว่ายังไม่สุกก็ไม่มี
หนองออกมากล้นทำให้ชาหนักขึ้น ถ้าฝีแตกเองเพียงเอาผ้าสะอาดปิดไว้ก็
พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องบีบเอาหนองออกมันจะไหลออกมาเอง การประคบ
ด้วยน้ำอุ่นจะบรรเทาความเจ็บได้และทำให้ฝีสุกเร็วขึ้น ถ้ามีไข้ควรปรึกษา
แพทย์

ผิวหนังพอง

ผิวหนังพองเนื่องจาก
ถูกบีบหรือถูกไฟ ทำให้เกิด
ความรำคาญ แต่ไม่เป็นอัน-
ตรายใด ๆ ถึงแม้มองไว้ก็แตก
เอง ถ้าจะบ่งเอาน้ำเหลือง
ออก ให้ทาด้วยยาไล่แมลงเสีย
ก่อน แล้วใช้เข็มสะอาดลง



ไฟจนแดงบ่งให้น้ำเหลืองออก เอายาไล่แมลงทาอีกครั้งแล้วเอาผ้าสะอาดปิด
แล้วพินผ้าไว้ระวังอาการอักเสบ ถ้ากลายเป็นหนองควรปรึกษาแพทย์

ห—นาเข้า


นอนตะแคงข้างทหน้าเข้า บางทหน้าไหลออกเอง ใช้น้ำล้างสะอาดพจน
ปลายไม้สะอาดค่อยเช็ดออก อย่าใช้น้ำมูกหรือสิ่งโดยอุดรจมูกเสียข้างหนึ่ง
การทำเช่นนั้นไม่ช่วยเลย ระวังถามอาการปวดหูหรือมีน้ำหนองออกมา ต้อง
ให้แพทย์ตรวจ

ห—แมลงเข้า

ถ้าเป็นเด็กมักปวดและคันร่น จับเด็กให้อยู่นิ่ง ๆ นอนตะแคงข้างมี
แมลงให้อยู่ด้านบน เอาน้ำสะอาดค่อย ๆ หยดลงไป แมลงทหน้าไม่ได้จะ
หนีขึ้นมาเอง เสร็จแล้วปฏิบัติอย่างน้ำเข้าหู อย่าใช้ไม้แยงแมลงจะหนีลึกลง
ไปอีก อย่าหยอดหูด้วยยาแรง เช่น ยาใส่แผลหรือแอลกอฮอล์ เพราะ
ยาจำพวกนั้นแรงเกินไปสำหรับหู

ตา—ผงเข้า

อย่าขยตา จะทำให้
ต้ออักเสบ จงหลับตาทั้งสอง
ข้างเพื่อให้น้ำตาไหลออก
มาชะผงออก ถ้าผงติดข้าง
ตาบน ดึงหนังตาบนทับ
หนังตาล่าง เพื่อให้ครูดเอา
ผงหลุดออกมา ลืมตาในน้ำ
สะอาด กระพริบตาหลาย ๆ
ครั้ง บางทผงจะหลุดออกมา
ล้างมือก่อนแล้วพลิกหนัง



ตา ค่อย ๆ เชยออกด้วยชายผ้าสะอาด

ตา—กุงยง

กุงยงคือตอมทขนตาอีกเส้น อย่าบีบกุงยง อย่าชยตา จะทำให้อีกเส้น
ยั้งขึ้น ใช้น้ำอุ่นประคบวันละหลาย ๆ ครั้ง กุงยงอาจแตกได้โดยไม่ต้องให้
แพทย์ผ่า ถ้าการอักเสบลุกลามควรปรึกษาแพทย์

ของติดคอ

กระดูกหรือ
อาหารติดคอ อาจผ่าน
ไปได้ โดยไม่เป็นอัน-
ตราย ควรตรวจดูจุด
จากร่องรูกิน ถ้าเป็น
ก้างคางอยู่บนามะนาว
อาจจะช่วยให้ก้างอ่อน
ตัว การล้วงคอให้อา-
เจียน อาจช่วยได้บ้าง
ถ้าเป็นของมีคม ของ
แหลม ควรปรึกษา
แพทย์

ของติดหลอดลม

อาจมี ของ
หลายอย่างติดหลอดลม



ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ในผู้ใหญ่ พันปปลอม เคษอาหาร ฯลฯ พยายามให้
ไอออกมา อย่าเอานิ้วดวง จะทำให้ตกกลงไปอีก ในเด็กก็มีอาหาร สดต่าง
ของเล่น ลูกโป่ง ถ้าเป็นเด็กเล็กหวัดตัวเด็กให้ศีรษะตก ตบตรงหลังให้เด็ก
ล้าลัก ถ้าเป็นเด็กโตให้นอนคว่ำขวางท่อน ให้ศีรษะต่ำ แล้วตบกลางหลัง
ให้ล้าลัก ถ้ายังไม่ออกต้องหาแพทย์

จุมก—เลือดกำเดาออก

อย่าให้ผู้ป่วยกระเทือน ให้ผู้ป่วยนั่งก้มหน้าหายใจทางปาก บีบจุมก
ไว้ประมาณ ๕ นาที อาจทำให้เลือดแข็งตัวหยุดได้ ถ้ายังไม่หยุดเอาสำลีหรือ
ผ้าสะอาดอุดข้างนั้นไว้ ระวังให้เหลือเศษปลายยื่นออกมาเพื่อบีบดึงออกได้
ให้ผู้ป่วยนอนหงาย ศีรษะสูง ใช้น้ำชุบน้ำเย็นดื่บและบีตหน้าไว้

จุมก—ของตกลงไป

ของตกลงไปในจุมก อาจเข้าหลอดลมหรือหลอดอาหารได้ พยายาม
สั่งออกค่อยๆ โดยตะแคงข้างนั้น อย่าสั่งแรงเป็นอันขาด อย่าแยงจุมก จะทำ
ให้ตกกลงไป ถ้าไม่ออก รีบปรึกษาแพทย์

ศีรษะ—แตก

ศีรษะแตกอาจเลือดออก รักษาอย่างบาดแผล คือห้ามเลือดโดยใช้
ของกดไว้ ศีรษะมักได้รับการกระเทือนจนเส้นเลือดในสมองอาจแตก เยื่อ
สมองอาจกระเทือนให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ อย่ากระเทือนต่อไปอีก ถ้ามีอาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้แสดงว่ามีอาการประสาธแล้ว คือปวดศีรษะอย่าง
แรง ตามัว อาเจียน อัมพาต ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

เกตุ

กลามเนื้อหรือเอ็นยึดกระดูกอาจขาดเพราะแรงดึงโดยแรง ให้ผู้ป่วย
นอนนิ่งในท่าที่เจ็บน้อยที่สุด ผู้ป่วยรูเองว่าจะนอนท่าไหนดี ประคบด้วยน้ำ
แข็งหรือน้ำเย็นเพื่อบรรเทาปวดในขั้นต้น ต่อมาจึงใช้ประคบด้วยความร้อน
เพื่อให้เลือดเดินดี ใช้น้ำมันงนวดหรือขมิ้นนวดก็ได้

ฟัน—หัก

ระวังเลือดออกมาก ทำอย่างไร ? โดยมากเลือดออกเล็กน้อยแล้ว
หยุดเอง ถ้ายังไม่หยุดใช้สำลีสะอาดอุดไว้ และคอยระวังอาการเลือดออก
เสมอ

ฟัน—ปวด

ดูให้แน่ว่าปวดที่ฟันหรือที่เหงือก ปวดเหงือกเพราะเหงือกอักเสบ
ใช้น้ำมันกานพลูพั้นปลายสำลีจิ้ม ระวังอย่าให้ถูกลิ้นหรือริมฝีปาก จะแสบ
ปวดฟันเพราะฟันเป็นรู ใช้น้ำมันกานพลูแตะสำลีพั้นปลายไม้จิ้มเข้าไปใน
ซอก ระวังการอักเสบอย่างอื่น เช่น แก้มบวม หน้าบวม การประคบจะช่วย
ให้การปวดบรรเทาลงบ้าง

ปลิงเข้าทวาร

ปลิงเข้าทวารหนัก ช่องคลอด ทางปัสสาวะ ทำให้เลือดออก ถ้ายัง
เห็นปลายหางให้ค่อยๆ ดึงออกมา อย่าดึงแรงตัวปลิงจะขาด ถ้าเอาออกไม่
ได้รีบไปหาแพทย์ ควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้เสมอ

ตะกั่ว

กล้ามเนื้อทำงานมากหรือเกร็ง อาจเป็นตะกั่วได้ ถ้าอยู่ในน้ำเป็น ตะกั่วที่แขวนหรือทำให้พุ้งตัวพอให้เข้าฝั ง บิบนวดสักครู่จะหายไปเอง

สุนัขกัด

ถ้าผู้ใหญ่ แผลสุนัขกัดมักอยู่ตามขาและเป็นแผลลึกลงไป ถ้าเด็ก อาจเป็นที่หน้าและเสียโฉมได้ ใช้น้ำใส่แผล เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ๑-๒% เมอคิวโรโครม (ยาแดง) ๒% หรืออาคริฟลาวิน (ยาเหลือง) ๐.๑% ทาแล้วเอา ผ้าสะอาดปิดไว้ ถ้าแผลสกปรกบีบแผลให้เลือดไหลออกชะล้างสิ่งโสโครกออกมา ห้ามแยงแผลเป็นอันตราย ควรนึกถึงสุนัขบ้าเสมอ ถ้าภายใน ๑๐ วันสุนัขนั้น ไม่มีอาการโรคกลัวน้ำขึ้นมา แสดงว่าไม่มีโรคกลัวน้ำ

ยุงกัด

อันตรายสำคัญจากยุงกัด คือ การนำเชื้อโรค เช่น ไข้มาเลเรีย ไข้ เลือดออกในเด็ก โรคเท้าช้าง การป้องกันจึงมีความสำคัญมาก รอยยุงกัดนั้น ings ไรก็หายเอง สำหรับเด็กเล็กผิวหนังอ่อนอาจเป็นผื่น ทำให้เด็กเกาและ กลายเป็นแผล การใช้น้ำยากันยุงทาผิวหนังควรระวังอย่าให้เกิดโรคผิวหนัง ชันได้

งูกัด

งูเป็นสัตว์ขลาด จะทำร้ายคนเมื่อตกใจหรือถูกเหยียบเท่านั้น พิษงู มีสองชนิด คือ ชนิดทำลายประสาท เช่น พวงงูเห่า กับชนิดทำลายเม็ดเลือด เช่น พวงงูเขียว เมื่อถูกกัดพยายามบีบแผลให้เลือดออกมาก เพื่อชะพิษงู



ออกมา พืชที่ฝังอยู่ในเนื้ออาจเอาปากที่ไม่เป็นแผลดูดออกได้บ้าง ถ้าเลือด
ออกน้อยใช้มดกรดแผลให้ใหญ่ให้เลือดออกมาก ขณะเดียวกันใช้เชือกมัด
เหนือแผลเพื่อกันไม่ให้พืชเล่นชนไป บางแห่งอาจมีเชื้อมะเร็งพืชไว้ ควร
ใช้ด้วยความระมัดระวัง เหตุตายสำคัญ คือ การหายใจหยุด ฉะนั้นช่วยหายใจ
ปอดไว้ รับน้ำส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด

ผงด้อย

ผงด้อยอาจถึงตายได้ เพราะคนนั้นอาจแพ้พิษผงด้อย เหตุตายคือ การ
หายใจหยุด พยายามเอาเหล็กในผงด้อยออกโดยเอายาใส่บาดแผลทาก่อน แล้ว
เอาปลายกัญญ์แทงมรดก เหล็กในจะโผล่ออกแล้วหยิบออกได้ อาการอักเสบ
อาจรุนแรงจนบวมมาก ใช้น้ำอุ่นประคบ ถ้าปวดมากใช้น้ำแข็งใส่ถุงวางทับ
จะบรรเทาความปวดลงได้บ้าง

แมลงด้อย

แมลงต่างๆ เช่น แตน มีอาการคล้ายผงด้อย แมลงป่อง ตะขาบ มีอาการ
บวม ใช้น้ำใส่แผลทาเพื่อกันหนอง ถ้าปวดมากใช้น้ำแข็งวางทับ ถ้าบวม
มากใช้น้ำอุ่นประคบ

ไฟไหม้—น้ำร้อนลวก

ถ้าเป็นน้อย ผิวหนังแดง ใช้ขมิ้นผงทาและใช้ผ้าสะอาดปิด ถ้าผิวหนัง
พองเล็กน้อยบ่งเอน้ำเหลืองออก โดยใช้ยาทาแผลทาก่อน แล้วเอาเข็ม
สะอาดลงไฟบ่งแล้วเอายาทาเอาผ้าสะอาดปิด ถ้ามากเช่น ทงแขน ทงขา ทง
ลำตัว เอาผ้าสะอาดปิดไว้แล้วนำส่งแพทย์ ในรายเช่นนี้ไม่ต้องใส่ยาเพราะ
แพทย์จะต้องทำแผลอีก วิธีเอาเสื้อผ้ามួយที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ใช้วิธี
ตัดออก อย่าถอดออกเพราะจะครูดผิวหนังมួយ ทำให้เจ็บยิ่งขึ้น

ผิวหนังถูกกรดอย่างแรง

ผิวหนังถูกกรด ดัง อย่างแรง มีอาการไหม้เหมือนอย่างไฟไหม้
ใช้น้ำสะอาดราดเพื่อล้างให้กรดหรือด่างจางลงไป ใช้ยาจำพวกขมิ้นผงทา เช่น
วาสลินทสะอาด ถ้าเข้าตาใช้น้ำสะอาดล้าง รีบไปหาแพทย์ ถ้าถูกทหน้า เช่น
ถูกน้ำกรดสดหน้า ระวังเสียโฉม ปรีกษาแพทย์โดยเร็ว

ไฟฟ้า



ไฟฟ้า ระวังตัวเอง หลายรายมาแล้วทช่วยผู้อื่นแล้วตัวตาย เอาไม้แห้ง
 เชยสายออกจากผู้ป่วย หรือดึงผู้ป่วยออกจากสายโดยใช้ผ้าแห้งคล้องออก
 อากาการสำคัญ คือ การหายใจหยุด ช่วยผายปอด ทำซ้ำๆ ประมาณ ๑๒-๒๐
 ครั้งต่อนาที อย่าทำรุนแรงจนซี่โครงหัก ถ้าการหายใจหยุดแล้วใช้วิธีเป่าลม
 เข้าปอดทางปาก (ดูวิธีผายปอด) ถ้าผู้ป่วยหมดสติอย่าเขย่าหรือปลุกผู้ป่วย
 แรงเกินไปจะเป็นอันตราย ปล่ออให้ฟื้นเองขณะปฐมพยาบาล ถ้าผู้ป่วยชัก
 ระวังแขนขาหัก ระวังลื่นหลุดทางหายใจ รีบนำส่งแพทย์

ฟ้าผ่า

ฟ้าผ่าอาจตายทันทีหรือแผลบไปอาจไม่ตายได้ อากาการสำคัญคือการ
 หายใจหยุด ต้องช่วยผายปอด ถ้าการหายใจหยุดแล้วใช้วิธีเป่าลมเข้าปอด
 ทางปาก (ดูวิธีผายปอด) ถ้าหมดสติหรือชักรีบนำส่งแพทย์ ใช้ความระวังการ
 เคลื่อนย้ายเหมือนรายผู้ป่วยขาหัก

เป็นลม

สาเหตุของการเป็นลมอาจมีได้หลายอย่าง เช่น หิวจัด เหนื่อยมาก
 ออกกำลังเกินไป ร้อนจัด ตกใจมาก เสียใจ กลัว ฯลฯ อันอาจเป็นเรื่องราว
 ไม่ถึง จัดให้ผู้ป่วยนอนหงายราบในที่ร่ม อากาศโปร่ง ขยายเข็มขัดและเสื้อ
 ผ่า ให้ยาต้มหรือยาหอมอ่อนๆ อย่าให้จามหรือสำลัก การบีบนิ้วพื้นไม้
 จำเป็น บางทีหมดจนซี่โครงหัก ถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวว่าจะเป็นลม ควรแนะนำ
 ให้นั่งหัวต่ำระหว่างขา หายใจแรงๆ

หัวใจ

โรคหัวใจเป็นเพราะเยื่อบุภายในจมูกมีอาการแพ้ อย่าสั่งน้ำมูกโดย

แรง ถ้าจุ่มคันทงสองข้างเปลี่ยนเป็นหายใจทางปาก ถ้ามีไข้หรืออาการไอ แสดงว่าอาจมีโรคแทรก ควรปรึกษาแพทย์ ยาดม เช่น น้ำมันยูคาลิปตัสอาจ ช่วยได้ ในรายเป็นน้อยอย่ากินยาแก้หวัด ถ้าไม่เคยยาชนิดนั้นอย่าเลี้ยง อันตราย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

สะอึก

อาการสะอึกเล็กน้อยไม่เป็นอันตราย อะไร จงลองหายใจเข้าให้เต็มที แล้วกลืนไวทำสัก ๒-๓ ครั้ง ถ้ายังไม่หายหาถุงกระดาษ ขนาดกลางมาหนึ่งใบ เอา ถูบีตปากและจุ่ม หายใจ ออกและเข้าอยู่ในถุงนั้นสัก ๒-๓ นาที ถ้าไม่หายควร ปรึกษาแพทย์





ลมพิษ

ลมพิษคือการที่ร่างกายแพ้อะไรสักอย่างหนึ่ง โดยมากมาจากอาหาร ทะเล อย่าเกาลมพิษจะกลายเป็นแผลไป ยาระบายอ่อน ๆ จะช่วยให้หายใน วันรุ่งขึ้น อย่ากินยาแก้ลมพิษโดยตนเอง นอกจากจะได้เคยกินมาแล้วและ โดยขนาดเท่าเดิม

ลมบ้าหมู

โรคลมบ้าหมู เป็นโรคประจำตัวของคนนั้น ๆ โดยมีประวัติอยู่แล้ว
ขณะชักอาจตกลงมาจากรถยนต์ ตกจากเรือเมล์ ตกจากม้าแซนซาหัก จึง
ควรระวังเวลาชักไม่ได้สติอาจกลืนตนเอง จับปากอย่าให้กัดลิ้น เมื่อชัก
ชั่วคราวก็หายเองไม่ต้องใช้ยา ระวังเวลาชักอย่าให้เกิดอันตรายเท่านั้น ถ้าชัก
นานมาก ควรให้แพทย์รักษา

เลือดออก



จุดสำคัญสี่จุดที่จะกดห้ามเลือด

จัดให้ผู้ป่วยนอนราบ อย่าให้ตื่นเต้นหรือตกใจ ระวังคนที่ไม่เคยเห็น
เลือดเลยอาจเป็นลมได้ทั้งผู้ป่วยและตัวท่านเอง ใช้ผ้าสะอาดกดลงบนแผลที่

เลือดออก เอามือกดไว้ให้แน่น ถ้าเลือดชุ่มผ้าเอาผ้าทับซ้อนอีกผืน ถ้าเลือด
ยังออกอกไขวชกดเส้นเลือดช่วย คือ เพิ่มการกดหรือรัดต้นแขนต้นขา อย่า
รัดด้วยเชือกหรือสายยางจนขาดเลือดทีเดียว เพราะเป็นโทษมากกว่าคุณ พอ
เลือดหยุดหรือออกน้อยลงรีบนำส่งแพทย์ ควรทราบไว้ว่าเลือดเป็นของสำคัญ
อย่างยิ่งต่อชีวิต เลือดออกประมาณสองลิตรอาจช็อคหรือตายได้

ข้อ

อาการช็อคอาจเกิดขึ้นเมื่อเลือดออกมาก กระดุกหัก ถูกไฟไหม้
สังเกตอาการเหล่านี้ ผิวหนังซีด เหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเบา การหายใจ
แผ่วเบา ให้ผู้ป่วยนอนราบ หัวต่ำ ขยายเสื้อผ้า เข็มขัด เครื่องแต่งกายที่รัด
ต่าง ๆ ออก จัดแจงอย่าให้คนมุง เอาผ้าคลุมตัวไว้ อย่าให้ลมโกรก รีบนำส่ง
โรงพยาบาลโดยเร็ว

จมน้ำ

ก่อนตัดสินใจช่วยอย่างไรรั้น แน่ใจเสียก่อนว่าท่านแข็งแรงพอที่จะ
ช่วยเขาได้โดยไม่จมน้ำไปทั้งคู่ จับผู้ป่วยคว่ำหน้า ยกตอนกลางขึ้นให้น้ำไหล
ออกจากปากจมูกเสียบ้าง ทำการผายปอดโดยเร็ว อย่ามัวไปดูว่าหัวใจหยุด
เต้นหรือหัวใจหยุด ผายปอดไว้มาก่อนแล้วค่อยดูทีหลัง

ผายปอด

จัดให้ผู้ป่วยนอนหงายราบ ให้ศีรษะแขวน ให้ค้างยัด ตรวจดูว่าไม่มี
อะไรค้างอยู่ในจมูก ปาก เอามืออุดจมูก เปิดปากผู้ป่วยออกไปแล้วเอาปาก
ของท่านเบ้าลมเข้าไปในปากของผู้ป่วย เบ้าลมเข้าไปอย่างแรงจนเห็นทรวง



อกขยาย ลมนี้จะเข้าไปในปอด เป็นการหายใจโดยตรงทีเดียว ถอนปากของท่านออกแล้วสังเกตว่าลมออกบ้างหรือไม่ จงเป่าซ้ำอีก ถ้ายังไม่ทำ ทว่าหายใจลองตรวจดูว่ามีอะไรอุดทางเดินหายใจบ้าง เช่น ลิ้นจุก หรือคาง ยิ่งกว่าอยู่ ถ้าเป็นเด็กท่านอาจเป่าเข้าไปทั้งทางปากและจมูกก็ได้ ทำหลายๆ ครั้งเพื่อความสะอาดท่านจะใช้น้ำเช็ดหน้ากันปากของท่านไว้ก็ได้ รับผิดชอบ แพทย์โดยเร็ว

ยาพิษ

ยาพิษมีหลายชนิด และการแก้ต่างกัน สำหรับการปฐมพยาบาล ท่านอาจใช้หลักต่อไปนี้ พยายามเอายาพิษออกจากร่างกาย เช่น ถ้ากินเข้าไปก็ให้อาเจียนออก พยายามแก้อย่างง่ายๆ เช่น กินกรดก้ให้ต่างอย่างอ่อน พยายามไม่ให้ยาพิษถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ โดยเติมของอันเจือปนลง ไป เช่น ให้อินโซขาว ให้อินธาน รีบพาไปโรงพยาบาลโดยเร็ว อนึ่ง การ

บ๊องกันยาพิษนั้นดีกว่าการแก้แน่ ๆ ฉะนั้นจึงเก็บยาพิษไว้ให้หมดขีด เขียน
ฉลากป้ายแดงให้ชัดเจน และจงอ่านฉลากยา สอง ครั้งก่อนรับยาเสมอ

แขวนคอ

รับปลดคนแขวนคอลลงโดยเร็ว โดยอุ้มขึ้นแล้วตดเชือกมายปลดโดย
เร็วที่สุดแบบใดก็ได้ แบบเป่าลมเข้าปากหรือแบบยัดเชือกก็ได้ ระวังตรวจ
ดูอย่าให้หลุดทางหายใจ พยายามมายปลดให้นาน ๆ เพราะอาจฟื้นได้

เมารถ—เมาเรือ

การเมารถ เมาเรือ เป็นเพียงอาการเท่านั้น ไม่ใช่โรคและอาการที่
เกิด ทั้งนี้เป็นเพราะการกระเทือนและการโคลงตัว ผู้ที่เมารถเมาเรือนั้นรู้ตัว
อยู่แล้วว่าตนเมื่อง่าย ฉะนั้นจึงควรเตรียมป้องกัน อย่ากินอาหารแน่นเพราะ
จะอาเจียนออกมาหมด มองออกไปไกล ๆ อย่าได้เสื่อผืนม่าน ขยายเข็ม
ขัดออก เมื่อเริ่มมีอาการควรรอนอนนิ่ง ๆ หายใจยาว ๆ ทำคล้ายกับกลืนลม
ลงไป หรือทำหาว มียาสำหรับป้องกันการเมาคลื่นควรใช้ด้วยความระมัด
ระวังและปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้ง่วงซึม วิช้ง่ายมาก คือ ชนจาก
เรือหรือลงจากรถ พอเทอถึงพन्दนั้นก็หาย



“ปัจจุบันพยาบาล” สำหรับนักศึกษา

โดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุบศรี

“ปัจจุบันพยาบาล” สำหรับนักศึกษา

(First Aid Accidents)

คงมีใช้ปัญหาที่แปลกแต่อย่างใด ที่ว่าเหตุใดในปัจจุบันนี้อุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน จึงมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนการพบเห็นชาวต่าง ๆ แทบว่าจะชินต่อความรู้สึกนึกคิดของเรา ทั้งนี้เพราะบ้านเมืองเจริญขึ้น เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องทันสมัย, ยวดยานพาหนะ, โรงงานอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, พาณิชยกรรม, และเกษตรกรรม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และในบางอาชีพซึ่งทำอย่างเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตนั้นก็มีไม่น้อย

อันตรายจากอุบัติเหตุนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือลงท้ายด้วยทุพพลภาพ เนื่องมาจากการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นมิได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและการปฏิบัติ ฉะนั้น การรักษาในขั้นต้นจึงนับว่ามีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง และนับว่ามีความสำคัญซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาความรู้ วิชาศัลยศาสตร์ “ปัจจุบันพยาบาล” หรือ “ปฐมพยาบาล”

จริงอยู่ การรักษาโรคจากอุบัติเหตุนี้ จำเป็นจะต้องอยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่การรักษาเบื้องต้นย่อมอยู่ในมือของประชาชนผู้ประสบเหตุการณ์ การ “ปัจจุบันพยาบาล” ที่ถูกต้องนั้น ย่อมจะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ปลอดภัย และเหมือนกับว่าโรคนั้นหายไปแล้ว ๕๐ % ฉะนั้น การปฏิบัติการในการรักษาขั้นต้นจึงต้องมหลกเกณฑ์ จึงนับว่าวิชาเป็นวิชา

แขนงหนึ่งในการรักษาโรคด้วย

สมัยก่อน ๆ วิชา^๕นี้จัดอยู่ในวิชาซึ่งพยาบาลและลูกเสื่อจะต้องรู้ แต่ความจริงแล้ววิชานี้มิใช่จำกัดวงแคบเพียงแค่นั้น แต่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งที่ประชาชนทั่วไปก็จะต้องรู้ไว้ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง การสร้างความเมตตาปรานีให้แก่ผู้ป่วยอย่างถูกหลักวิชา ผลบุญย่อมสั่งเสริมมากกว่าการเมตตาปรานีแต่เพียงจิตใจแต่ขาดการปฏิบัติไปด้วยอย่างแน่นนอน และผู้ปฏิบัติการรักษาอย่างถูกต้องในชนตนเอง คือผู้ให้ความสะดวกใจ และให้ความหวังในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ในชั้นต่อไป

“ปัจจุบันพยาบาล” คืออะไร

ปัจจุบันพยาบาล — เป็นวิชาประกอบโรคศิลป์แขนงหนึ่ง เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุโดยกะทันหัน ซึ่งกล่าวถึงการบริหารเป็นพิเศษ ก่อนที่จะปรึกษาหารือแพทย์ หรือนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นอันตรายหรือลดอันตรายให้น้อยลง ก่อนที่แพทย์จะรักษาในชั้นต่อไป

หลักทั่วไปในการปัจจุบันพยาบาล

๑. ในสถานที่^๕นั้น ๆ เมื่อมีผู้^๕ได้รับอุบัติเหตุ ต้องคอยห้ามมิให้คนมุงดูแน่น ควรเป็น^๕ที่^๕ท^๕ม^๕อากาศโปร่งลมพัดเย็นสบาย และมีแสงสว่างพอเพียงที่จะทำการพยาบาลได้สะดวก

๒. ให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่ง ๆ ในท่าที่สบายที่สุด หรือในท่าที่ถูกต้องต่อการพยาบาลแต่ละชนิดของโรค

๓. คอยสังเกตอาการ, ชีพจร และการหายใจไว้ตลอดเวลา และถ้าเห็นสมควรควรบันทึกไว้

๔. การจะนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล หรือไปปรึกษาหารือแพทย์หรือจะทำการเคลื่อนที่เพื่อเหตุผลใดก็ตาม ผู้ป่วยควรได้รับการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

๕. การนำส่งหรือการเคลื่อนที่ ควรกำหนดให้ถูกต้องว่าจะนำส่งโดยลักษณะใด เช่น พยุง—แบก—อุ้ม หรือหามด้วยเปล และนำส่งในท่าที่ถูกต้องอย่างไร (ซึ่งจะกล่าวถึงในการปัจจุบันพยาบาลของแต่ละโรคต่อไป)

๖. ในการตามแพทย์หรือส่งโรงพยาบาล ควรมียางนาร่องราวของผู้ป่วยเกี่ยวกับเหตุการณ์, อาการต่าง ๆ และการพยาบาลที่ให้มาก่อน จะเป็นด้วยวาจา (คือเล่าให้แพทย์ฟังด้วยตนเอง) หรือโดยทางจดหมายก็ตาม ทั้งนี้เป็นการช่วยให้แพทย์ได้รับความสะดวก และจัดการให้การรักษาในชั้นต่อไปได้ถูกต้อง

๗. รายการใดที่เกิดขึ้นเหตุอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดี ผู้ที่ประสพอุบัติเหตุและทำปัจจุบันพยาบาลนั้น ควรจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ, สถานที่เกิดเหตุ, เวลาเกิดเหตุ, อาการ, ตลอดจนการปัจจุบันพยาบาลที่ตนกระทำไปนั้นเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อช่วยเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในชั้นต่อไป ในเมื่อต้องเป็นพยานศาล

๘. อย่ารักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบางอย่างต้องการการรักษาอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ควรปรึกษาแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลด่วน เมื่อให้การปัจจุบันพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

บทที่ ๑

“การตกเลือด” (HAEMORRHAGE)

คำจำกัดความ :—

การตกเลือด หมายถึง “การมีเลือดไหลออกมาจากเส้นโลหิต เมื่อเส้นโลหิตนั้นถูกทำลายหรือถูกตัดให้ขาดออกโดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม”

เลือดอาจหยุดออกเองได้

ตามธรรมชาติของร่างกาย ร่างกายมีวิธีทำให้เลือดหยุดออกไปเองได้ โดย

๑) เลือดมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งเมื่อออกมาอยู่นอกเส้นโลหิตแล้วอาจแข็งตัวได้ (CLOT) และการแข็งตัวของเลือดนี้เอง จะอุดช่องทางตรงที่เลือดออกเสียได้

๒) ความดันโลหิตจะลดต่ำลงเองเมื่อร่างกายมีการตกเลือด ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทำให้กระแสโลหิตไหลอ่อนเข้า ทำให้เลือดมีโอกาสแข็งตัวเองเปิดช่องทางที่เลือดออกได้ง่ายขึ้น (และเนื่องจากความดันโลหิตต่ำลงนี้เอง ผู้ป่วยจึงมีอาการหน้ามืดเป็นลม ดังจะได้กล่าวไว้ต่อไป)

๓) เส้นโลหิตส่วนนั้นจะคับตัวเล็กน้อยได้ เลือดก็จะออกน้อยเข้า

ถึงแม้เลือดจะหยุดเองได้ก็จริง แต่ถ้าเป็นเส้นโลหิตโตๆ เลือดก็ไม่

อาจหยุดเองได้ จึงจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาห้ามเลือดเสียแต่ต้น เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสียเลือดมากจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต

การตกเลือดมีข้อเฉพาะเรียกต่าง ๆ กัน

๑. เรียกตามตำแหน่งที่เลือดออก—

ก) ตกเลือดภายใน—(Internal หรือ Concealed Haemorrhage)

หรือที่เราเรียกกันว่า “เลือดตกใน” คือเลือดออกภายในร่างกาย ไม่ออกมา

ภายนอกให้เราเห็นได้ อาจเนื่องจากแผลภายในทรวงอก เช่น แผลที่ปอด,

หัวใจ, แผลในช่องท้อง เช่น เลือดจากแผลในกระเพาะอาหาร, ลำไส้, ตับ,

ม้าม หรือแผลที่ไต ฯลฯ แม้ว่าจะไม่มีเลือดออกมาให้เห็นภายนอกได้ก็อาจ

มีอาการปรากฏโดยเฉพาะให้ตรวจทราบได้ (ดังจะได้กล่าวไว้ในเรื่องอาการ

ของการตกเลือด)

ข) ตกเลือดออกมาภายนอก — (External Haemorrhage) คือ

เลือดออกมาภายนอกให้เราเห็นได้ การตกเลือดภายนอกนั้นบางครั้งอาจเรียก

ชื่อย่อๆ จำแนกออกไป แล้วแต่ว่ามีการทำลายเส้นโลหิตชนิดใด ดังต่อไปนี้

นี้ :—

(๑) จากเส้นเลือดแดง — (Arterial Haemorrhage) เลือดที่ออก

มาจากเส้นเลือดแดง จะสังเกตได้โดยมีสีแดงเข้มจัดพุ่งออกมาแรงมาก และ

พุ่งแรงตามจังหวะของการเต้นของหัวใจอันตรายมีมาก เพราะถ้าไม่หยุดหรือ

ไม่ได้ห้ามเลือดผู้ป่วยอาจตายได้ภายในเวลา ๓-๔ นาที

(๒) จากเส้นเลือดดำ — (Venous Haemorrhage) เลือดที่ออกมาจากเส้นเลือดดำ จะสังเกตเห็นได้โดยมีสีค่อนข้างดำไหลริน ๆ หรือถ้าเส้นโต ๆ อาจพุ่งแต่ไม่แรงนัก (เพราะความดันโลหิตในเส้นเลือดดำค่อนข้างต่ำ) การไหลพุ่งไม่เป็นไปตามจังหวะของการเต้นของหัวใจ ส่วนเลือดดำที่ออกมาจากเส้นเลือดดำบริเวณคอหรือรักแร้ อาจพุ่งออกมาตามจังหวะของการหายใจ

(๓) จากเส้นเลือดฝอย — (Capillary Haemorrhage) เลือดที่ออกมาจะไหลซึม ๆ ออกมา (Oozing) และพวกนี้มักจะหยุดไปเองได้ง่าย

๒. เรียกชื่อตามระยะเวลาที่มีการตกเลือด

(ก) Primary Haemorrhage คือ การมีเลือดออกทันทีในขณะที่เส้นเลือดนั้นถูกตัดหรือทำลาย

(ข) Reactionary Haemorrhage — คือเลือดนั้นจะออกมาภายหลังจากที่เส้นเลือดนั้นถูกตัดหรือทำลายมาเป็นเวลานานแล้ว ตัวอย่างเช่น ในการผ่าตัด ในระหว่างที่ทำการผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการช็อค ความดันโลหิตลดต่ำลงทำให้เลือดไม่ออก ผู้ผ่าตัดจึงมิได้จับผูกเส้นเลือด พอผ่าตัดแล้วผู้ป่วยฟื้นขึ้นความดันโลหิตกลับสูงขึ้นมาก เลือดจึงกลับออกได้ออก (นั่นคือหลังจากเส้นเลือดคนนั้นถูกตัดมานานแล้ว ตั้งแต่เวลาทำการผ่าตัด)

(ค) Secondary Haemorrhage — คือ การมีเลือดออกเนื่องจากการทำลายเส้นเลือด โดยมีสาเหตุหรือโรคอื่นแทรกอยู่ เช่น บาดแผลลึกปรกซึมเชื้อแบคทีเรียตกลงไป และแบคทีเรียอาจทำให้แผลลุกลามและทำลาย

เส้นเลือด หรือพวกมะเร็ง ๆ ที่ลุกลามไปทำลายเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดแตกและมีเลือดออกได้

อาการของการตกเลือด จะแบ่งง่าย ๆ ออกเป็น ๒ อย่างคือ

อาการเฉพาะตำแหน่งที่เลือดออก และอาการทั่วไปของผู้ป่วย

(ก) อาการเฉพาะที่ — ถ้าเป็นตกเลือดภายนอกเราก็มองเห็นเลือดออกมาได้ง่าย หรือเมื่อแผลนั้นถูกพันผ้าแล้วเราก็มองเห็นรอยเลือดอยู่บนผ้านั้นได้ ส่วนเลือดตกใน อาการเฉพาะที่ไม่อาจเห็นได้ชัดเราอาศัยอาการทั่วไปเป็นสำคัญ

(ข) อาการทั่วไป — อาการทั่วไปนั้นจะมากหรือน้อยก็ย่อมแล้วแต่ความการเสียเลือดไปจำนวนมากหรือน้อย ถ้าเลือดออกเกินกว่า ๓๐๐—๕๐๐ ค.บ. ซ.ม. อาจมีอาการชดช่น ถ้าออกมากถึง ๒๐๐๐ ค.บ. ซ.ม. ขึ้นไปผู้ป่วยจะมีอันตรายมาก อาจไม่หวังฟื้นถ้าการรักษาไม่ทันท่วงที และถ้าเลือดออกเร็วอาการก็ยิ่งมากขึ้นเพราะร่างกายไม่อาจจะแก้ไขตัวทัน แต่ถ้าออกช้า ๆ ร่างกายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมต่อการเสียเลือดได้ ในเด็ก ๆ จะทนต่อการตกเลือดได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่ถ้าแก้ไขทันจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ อาการทั่วไปที่เราจะสังเกตเห็นได้ดังนี้ :—

๑. ชดลง — อาการชดลงเราจะสังเกตได้จากผิวหนัง กระพุ้งแก้มในปาก ริมฝีปากหรือเล็บ แต่จะเห็นได้ชัดเจนที่เปลือกตาภายใน (Conjunctive) โดยการเลิกเปลือกตาล่างดูจะเห็นความสัซชด

๒. มีอาการหนาวมด, เป็นลม, ตามัว, หูอ

๓. เหงาออก และบางรายอาจมีอาการหนาวสั่น มีเทาเย็นซด

๔. หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรจะเร็วแต่เบา ถ้าตกเลือดมากๆ ต่อมาชีพจรจะเบาลงมาก และระยะการเต้นของชีพจรจะไม่สม่ำเสมอ ในที่สุดจะคลำชีพจรไม่พบ

๕. การหายใจจะเร็ว และหอบตื้นๆ

๖. กระหายน้ำมาก

๗. กระสับกระส่าย ตันรน

๘. ม่านตาขยาย

๙. หหมดสติ และในที่สุดตาย

ในการปฏิบัติการปัจจุบันพยายามเลี่ยงแก่การตกเลือดนี้ ความสำคัญอยู่ที่การทำให้เลือดหยุดออกเสียก่อน ซึ่งเราเรียกกันว่า “การห้ามเลือด” การห้ามเลือดนั้นอาจทำได้หลายวิธีด้วยกัน แล้วแต่ตำแหน่งหรือการตกเลือดนั้นมามากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยวิธีการทำการห้ามเลือดให้เลือดหยุดต่าง ๆ กันไปได้

การห้ามเลือด :-

การห้ามเลือดอาจทำได้หลายวิธีด้วยกัน คือ

๑. ใช้นิ้วมือกดลงบนแผล (มือที่ใช้กดแผลควรจะสะอาดด้วยการล้างมือและฟอกสบู่ ถ้าหากว่าทำได้) หรือตรงจุดที่เราเห็นว่ามีเลือดออก ใช้นิ้วเป็นแผลเล็ก ๆ เลือดก็มักจะหยุดออกได้

๒. ให้ผู้ป่วยนอน และยกส่วนนั้นให้สูงๆไว้ วิธีนี้ใช้ได้สำหรับการตกเลือดเนื่องจากบาดแผลแถวแขนหรือขา การปฏิบัติเช่นนี้มักพอเป็นการ

ให้เลือดมาสู่บริเวณนั้นน้อยเข้าและไหลช้าเข้า วิชานี้จะได้ผลติดต่อกับเมื่อแผล
นั้นเล็ก และใช้วิธีเช่นประกอบด้วย

๓. ใช้ผ้าหรือสาลี่ทึบสีดำหนา ๆ วางลงบนบาดแผลนั้นแล้วพันผ้า
รัดให้แน่น ด้วยวิธีนี้อาศัยความแน่นของผ้าที่เราพัน จะเป็นตัวช่วยกดลง
บนจุดที่มเลือดออก และจะทำให้เลือดนั้นแข็งตัวอุดปลายเส้นโลหิตที่แตก
ออกนั้นได้

๔. อาจใช้วิธีกดลงบนเส้นโลหิตแดงใหญ่ๆซึ่งมาสู่บริเวณนั้น เป็น
การห้ามไม่ให้เลือดไหลมาสู่บริเวณเส้นเลือดที่ถูกทำลาย เลือดที่ไหลออก
ในตอนแรก ๆ ก็มีโอกาสดังจะแข็งตัว ของมันเองตรงจุดเส้นเลือดตอนที่ถูก
ทำลายนั้นได้

๕. ใช้ยาบางอย่างที่พอจะหาได้ในการห้ามเลือด เช่น น้ำร้อนๆ ๕๐
—๕๕ ดีกรี เซนต์เกรท ความร้อนจะช่วยให้เลือดนั้นแข็งตัวได้เร็ว หรือใช้
น้ำแข็งวางลงบริเวณแผล ซึ่งจะช่วยให้เส้นเลือดตีบตัวลงเนื่องจากความเย็น
และเลือดที่ออกมาอาจแข็งตัวมันเองได้

๖. ใช้ทูนิเกต (Tourniquet) เครื่องรัดเส้นโลหิตรัดท่อนเหนือแผล
เพื่อเป็นการห้ามไม่ให้เลือดไปสู่บริเวณแผลนั้น

๗. ถ้าการตกเลือดมีขึ้นจากบาดแผล ซึ่งเกิดขึ้นที่ระดับต่ำลงไปกว่า
ข้อพับของข้อศอกหรือข้อเข่า คือตอนปลายแขนหรือขาให้ใช้ผ้าหรือสาลี่
ม้วนให้กลมและแน่นวางทาบข้อพับของข้อศอกและข้อเข่า แล้วพันข้อศอกและ
ข้อเขานั้นไว้ แล้วจึงใช้ผ้าพันรอบ ๆ ข้อพับนั้นไว้ให้แน่น ทิ้ง ๆ ทาบพัน
นั้นยังพันอยู่ (วิชานี้จะเรียกว่า “วิธีใช้ Pad and Bandage และพันข้อ”)

Tourniquet คืออะไร ?

ทวนเกิด คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช้รัดรอบแขนหรือขาให้แน่นเพื่อการห้ามเลือด ซึ่งวัตถุนั้นอาจเป็นเชือก, บานปอ, ผ้าเช็ดหน้า, ลวด, สายยาง, เข็มขัดหรือเถาวัลย์ ฯลฯ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

วิธีใช้ :—

ใช้รัดเหนือบาดแผลนั้น แล้วผูกให้แน่นอย่างธรรมดา หรือโดยวิธีการขันชะเนาะ

กฎการใช้ทวนเกิด

๑. อย่ารัดให้แน่นหรือหลวมจนเกินไป เพราะการรัดหลวมเกินไปจะทำให้เลือดยังคงออกได้ การรัดแน่นเกินไปทำให้ไม่มีเลือดผ่านไปเลี้ยงส่วนที่ต่ำลงมาจากแนวตอกรัด เลยเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนล่าง ทำให้เซลล์ขาดอาหารและทำให้เนื้อส่วนนั้นตายได้ (Gangrene)

๒. อย่ารัดทิ้งไว้นานเกินกว่า ๒ ชั่วโมง เพราะอวัยวะส่วนนั้นอาจตายลงโดยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ฉะนั้น ควรจับเวลาที่เริ่มตอกรัดทวนเกิดไว้ด้วย (ถ้าไม่มีนาฬิกาใช้กะเวลาเอา) เมื่อรัดไว้ครบ ๒ ชั่วโมงแล้วควรคลายทวนเกิดเสียพักหนึ่งพอให้เลือดผ่านลงไปเลี้ยงส่วนล่างได้บ้าง ถ้าเลือดยังไม่หยุดจึงค่อยรัดทวนเกิดนั้นใหม่

๓. อาจคลายทวนเกิดนั้นได้ทุก ๑๕ นาที ว่าเลือดนั้นหยุดไปเองได้บ้างหรือไม่ ถ้าไม่หยุดก็รัดกระชับเข้าไปใหม่ได้

๔. อย่ารัดทวนเกิดลงไปบนอวัยวะส่วนนั้น ๆ โดยตรง ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าลินินหรือผ้าส่วนที่จะรัดเสียก่อนแล้วจึงรัดทวนเกิด การ

รัดทูนีเกิดลงไปกดบนผิวหนังโดยตรงจะทำให้เกิดความเจ็บปวด และถ้าหากการรัดทูนีไว้นาน ๆ ส่วนนั้นอาจเกิดแผลบนผิวหนังได้

๕. ถ้าไม่มีความจำเป็นอย่างใด ก็ไม่ควรรัดทูนีเกิดนั้นออกจนกว่าแพทย์จะมาถึงหรือแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเย็บบาดแผล หรือห้ามเลือดให้ผู้ช่วยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเรียบร้อยแล้ว

การกดเส้นเลือดแดงใหญ่ ๆ เพื่อการห้ามเลือด

ตามการปฏิบัติแล้ว การห้ามเลือดวิธีนี้นักจะไม่ค่อยได้ใช้ จะใช้ได้ก็เพียงชั่วคราว ซึ่งหาวิธีที่จะห้ามเลือดโดยวิธีอื่น ๆ ยังไม่ได้และบางตำแหน่งแรงจากการใช้มือกดอาจไม่แรงพอให้เลือดหยุดได้ และการกดถ้าจะต้องใช้ระยะเวลานาน ๆ ก็มีความลำบากต่อผู้พยาบาลมาก

การห้ามเลือดโดยวิธีนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีกระดูกอยู่ที่ด้านหลัง (หรือด้านล่าง) ของเส้นโลหิตส่วนนั้น ฉะนั้นแรงที่กดจากนิ้วมือจะกดลงบนตัวเส้นโลหิตและกดให้แบนลงไปกับตัวกระดูกนั้น และการกระทำก็ควรมีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของเส้นโลหิตแดงนั้นๆ ไว้ด้วย

๑. บริเวณคอ — บริเวณนี้มีเส้นโลหิตแดงใหญ่ คือ Common Carotid Artery ซึ่งถ้าคลำดูด้านข้างของคอจะเห็นว่าเด่นอยู่ทั้ง ๒ ข้าง

การกดลงบนเส้นโลหิตเส้นนี้ ต้องให้ผู้ช่วยเอียงหน้าไปในด้านตรงกันข้ามเสียก่อน เช่น จะกดบนเส้นที่คอขวา ก็เอียงหน้าไปทางซ้าย กดเส้นโลหิตนั้นจนระดับใต้และด้านข้างของลูกกระเดือกเล็กน้อย กดลงไปที่ด้านกระดูกต้นคอ การกดเส้นโลหิตนั้นห้ามกดพร้อม ๆ กันทั้งสองข้าง เพราะจะทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงสมองและกดไว้นาน ๆ อาจตายได้

เส้นโลหิตใหญ่เส้นนี้ยังมีแขนงเล็ก ๆ ซึ่งเราอาจกดได้ เช่น บริเวณ
ตอนใต้คาง คือ Facial Artery, ทขมับคือ Temporal Artery ตอนต้นคอ คือ
Occipital Artery

สำหรับบริเวณหนังศีรษะจะมีเส้นเลือดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เลือด
มักจะหยุดได้ดัดเพียงแต่ใช้ผ้าหนา ๆ บีดที่แผลแล้วพันผ้ารัดให้แน่น (Pad and
Bandage)

๒. บริเวณแขน -

(ก) Subclavian Artery เป็นเส้นโลหิตแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงบริเวณ
แขนอยู่บริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า การกดเส้นโลหิตเส้นนี้ให้ผู้ป่วยนั่ง
ตรง ผู้พยาบาลยืนอยู่หลังผู้ป่วยไขว่ขว้างแขนขวาแล้วกดลงตรงเหนือกระดูกไห
ปลาร้า และกดเส้นเลือดลงบนกระดูกซี่โครงซี่ที่ ๑ ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของร่อง
ไหปลาร้า

(ข) Axillary Artery— คือเส้นเลือดที่ต่อมาจาก Subclavian Artery
แต่มาอยู่บริเวณแขนท่อนบนและใต้รักแร้ (จึงเปลี่ยนเรียกชื่อใหม่) ให้กด
ลงที่ด้านในของท่อนแขนท่อนบนลงไปทึกระดูกต้นแขน (Humerus)

(ค) Brachial Artery — คือเส้นโลหิตแดงที่ต่อลงมาจาก Axillary
Artery มาอยู่บริเวณต้นแขน (จึงเปลี่ยนเรียกชื่อเสียใหม่) ไขว่กดลงที่ต้นแขน
ด้านในหรือข้อศอก แต่อาจใช้ริ้วผ้าม้วนมาหรือก้อนผ้าวางที่ข้อพับ ให้
พันข้อศอกแล้วพันผ้าไว้

๓. บริเวณขา -

(ก) Femoral Artery ให้กดลงตรงกึ่งกลางของขาหนีบเมื่อเหยียด
หรือเมื่อยม่อ ก็ให้ผู้ป่วยกอดข้อ

(ข) บริเวณขาที่บนเส้นเลือดอยู่ลึก ใช้กดไม่ได้ผลควรใช้ทุนิเกตจะได้ผลดีกว่า

(ค) Popliteal Artery — เป็นเส้นโลหิตแดงของขาที่มาอยู่บริเวณข้อพับเข่า ควรใช้วิธี Pad and Bandage ทิ้งที่ข้อพับอยู่

สรุปการห้ามเลือดในตำแหน่งต่าง ๆ :—

๑. ศีรษะ — ใช้วางผ้าหรือผ้าลินิน ๆ ลงบนแผลแล้วใช้ผ้าพันทับแผลให้แน่น

๒. ริมฝีปากหรือลิ้น — ใช้บดด้วยแรงของหัวแม่มือและนิ้วชี้ ๒ ข้างของบาดแผลนั้น

๓. บริเวณคอ — บาดแผลจากการถูกเชือดคอ มักหาเส้นเลือดได้ยาก อาจใช้นิ้วมือกดลงที่เส้นโลหิตหรือบาดแผลเท่าที่จะทำได้ จนกว่าจะนำผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาล

๔. ต้นแขน —

ก) ยกแขนให้สูงขึ้น

ข) Pad and Bandage

หรือ ค) ทุนิเกต

๕. ปลายแขน — กระทำดังต้นแขนหรือ Pad and Bandage ขณะพับข้อศอก

๖. ข้อมือ — ใช้นิ้วกด หรือทุนิเกต

๗. ฝ่ามือ — ให้ม้วนผ้าให้กลมและแน่น วางลงบนฝ่ามือ แล้วให้ผู้ป่วยกำผ้าให้แน่น และพันผารอบมือทักไว้

(การมีแผลบริเวณแขนเหล่านี้ควรให้ใช้ผ้าคล้องคอห้อยแขนเอาไว้ด้วย หลังห้ามเลือดแล้ว)

๘. ต้นขา —

ก) ใช้มือกด

ข) Pad and Bandage

ค) ทูนิเกต

ง) ยกขาเอาไว้ให้สูง ๆ

๙. ตะโพก — ใช้ Pad and Bandage แล้วให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนทับบนตะโพกข้างนั้น

๑๐. ขา —

ก) ใช้มือกด

ข) Pad and Bandage

ค) Pad and Bandage พร้อมกับพับข้อเข่าแล้วพันผ้า

ง) ทูนิเกต

๑๑. เท้า —

ก) ยกเท้าให้สูงขึ้น

ข) Pad and Bandage

หมายเหตุ — ในการห้ามเลือดนี้ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนเสมอ

การตกเลือดภายใน (Internal Haemorrhage)

เรื่องตกลงมาข้างต้นในการห้ามเลือด เป็นเรื่องเกี่ยวกับตกเลือดภายนอกทั้งสิ้น สำหรับการตกเลือดภายในนั้นอาการมักจะรุนแรงมาก ต้อง

การรักษาอย่างทันทีว่งท ซึ่งจำเป็นและสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรับนำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

การนำส่งโรงพยาบาลควรให้นอนเปลหาม

ระหว่างการเดินทาง ให้การปัจจุบันพยาบาลไปพร้อมด้วยดังนี้ :-

๑. ห้ามดื่ม น้ำ จะให้มกก่อนน้ำแข็งเล็ก ๆ ได้บ้างเล็กน้อย
๒. คลุมผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
๓. ห้ามดื่มเหล้า (หรือยาใด ๆ ก็ตามที่มีผลเป็นกระส่าย)
๔. แพทย์อาจสั่งให้ฉีดยาแก้พิษหรือยาแก้ปวด

นอกจากนี้แล้ว การปัจจุบันพยาบาลคงดำเนินตามวิธีโดยทั่วไป ซึ่ง
จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้

ศัพท์บางคำในการตกเลือดภายใน :-

การตกเลือดภายในมีศัพท์เฉพาะบางคำที่ควรรูไว้ดังนี้ :-

Haemoptysis - คือมีเลือดออกมาจากปอด (มักจะไอออกมา) เลือด
มีสีแดงสด และเป็นฟอง

Haematemesis - เลือดออกจากกระเพาะอาหารมีสีดำ (มักอาเจียน
ออกมา)

Malacena - เลือดออกมากับอุจจาระ มีสีดำจัดตั้งสีน้ำตาลปน เนื่อง
จากมีธาตุเหล็กในกระเพาะอาหารหรือลำไส้

Haematuria - ปัสสาวะออกมาเป็นเลือด (อาจแดงจัดตั้งเลือดสด ๆ
หรือน้ำปัสสาวะมีสีน้ำตาลปนออกมา)

Epistaxis — เลือดออกมาจากเยอบุของช่องจมูก คือที่เราเรียกว่า เลือดกำเดา

Haemothorax — การมีเลือดตกเข้าไปอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด

Haemoperitoneum — การมีเลือดตกลงไปซึ่งอยู่ในช่องท้อง

Haemopericardium — การมีเลือดอยู่ในเยื่อหุ้มหัวใจ

การบ่งชี้บ่งชี้พยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการตกเลือด

ในเมื่อพบผู้ป่วยประสพอุบัติเหตุตกเลือด เราควรให้การบ่งชี้บ่งชี้พยาบาลตามหลักต่อไปนี้:—

๑) รับปรึกษาแพทย์ใกล้เคียง หรือเตรียมนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เตรียมเปล แคร่ แผ่นกระดาน หรือเตียงผ้าใบในการให้ผู้ป่วยนอนและการนำส่ง

๒) ให้รีบทำการห้ามเลือดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด (ดังกล่าวนำข้างต้น)

๓) ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ที่สุด

๔) ให้ผู้ป่วยนอนศีรษะต่ำ ๆ ยกปลายเท้าหรือยกปลายเตียงขึ้นนอนอยู่ให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันหรือแก้อาการช็อค การกระทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณสมองให้มากที่สุด

๕) เมื่อเลือดหยุดควรจะล้างบาดแผลให้สะอาด เลือดที่แข็งตัวออกบาดแผลอยู่อย่าดึงออก แล้วแล้วพ่นผ้าทาบาดแผลนั้นไว้ (ดูในเรื่องการบ่งชี้บ่งชี้พยาบาล “บาดแผล” ซึ่งจะกล่าวในเรื่องต่อไป)

๖) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายผู้ป่วยโดยการคลุมผ้าหนา ๆ หรือวางกระเป๋าร้อนหรือน้ำร้อนตามบริเวณมือและเท้าเท่าที่จะจัดหาได้

๗) คอยสังเกต น้ขี้พจร และการหายใจอยู่ตลอดเวลา

๘) ถ้าขี้พจรเบามาก อาจใช้ยาบำรุงหัวใจ (สำหรับผู้ที่มีความรู้ในการใช้ยา หรือจากคำสั่งของแพทย์ท่านนั้น) แต่ถ้าไม่จำเป็นห้ามใช้โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น เลือดอาจออกได้ออก

๙) แพทย์อาจสั่ง นิด มอร์ฟีน เพื่อบรรเทาอาการ กระวนกระวายหรืออาการดิรน ซึ่งสาเหตุให้เลือดออกมากยิ่งขึ้นและเป็นการระงับความปวดเจ็บจากบาดแผล (ควรให้อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์ท่านนั้น)

๑๐) แผลที่พ่นผ้าไว้แล้วไม่ควรจะแก่ออก ถ้ามีเลือดออกมากอยู่เรื่อยๆ (ซึ่งสังเกตเห็นเลือดเปื้อนซึมออกมานอกผ้าพันแผลนั้นแผ้วถางขึ้นทุกที่ๆ) ควรใช้ผ้าหรือผ้าวางทับบริเวณที่พ่นบาดแผลนั้นลงไปอีก แล้วพ่นผ้าทับลงไปให้แน่นจนกว่าจะนำส่งถึงโรงพยาบาล

๑๑) ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ทำการผายปอด (ดูวิธีการผายปอดซึ่งจะกล่าวต่อไป)

การปฐมพยาบาลการตกเลือดบางชนิด —

๑) เลือดกำเดา — เลือดกำเดาเกิดขึ้นจากเส้นเลือดฝอยเล็กๆของเยื่อจมูกแตก โดยมีโรคของจมูกอยู่ เช่น เยื่อจมูกอักเสบหรือพบได้ในผู้ที่มีแรงดันโลหิตสูง มักออกเพียงข้างเดียวแต่อาจออกทั้งสองข้างของจมูกได้

การพยาบาล — ให้ผู้ป่วยนั่ง (หรือนอน) เงยหน้าขึ้น ใช้มือกดบีบจมูกทั้ง ๒ ข้างไว้ หายใจลึกๆ ยาวๆ ทางปากชั่วคราว ถ้าออกเพียงข้างเดียว ใช้สำลีเย็บๆ ดูปหรือใช้ก้อนน้ำแข็งวางบริเวณหน้าผาก ใบหน้า คอ และสันจมูก เลือดกำเดาก็มักจะหยุดไปตัวเอง

ถ้าออกมาก ๆ การพยาบาลดังกล่าวแล้วไม่ได้ผล อาจใช้ยา Adrenalin ขนาด ๑:๑๐๐๐ หยอดรูจมูกข้างนั้นหรือไซมาชนเล็ก ๆ ชุบยานให้ชุ่ม สอดเข้าในรูจมูกข้างนั้นยัดไว้ให้แน่น ยานจะทำให้เส้นเลือดตีบตัวลงและเลือดหยุดไปได้

๒) เลือดออกภายหลังถอนฟัน — บางครั้งหลังการถอนฟัน ในบางคนเลือดออกไม่หยุด เราจะต้องการให้พยาบาลด้วย

การพยาบาล — ๑. อย่าบ้วนปาก—เพราะการบ้วนปากแรง ๆ นั้น ทำให้เลือดแข็งตัวและอุดเบาฟันที่เหงือกนั้นหลุดออกมาได้ ทำให้เลือดออกมากอก

๒. อาจใช้ก้อนน้ำแข็งเล็ก ๆ อมไว้

๓. ม้วนผ้าสะอาดหนาให้กลม วางลงบนเหงือกตรงที่ถอนฟันออก แล้วกดม้วนผ้าให้แน่น เป็นการกดลงบนแผลเพื่อกันการห้ามเลือด

๔. ถ้าเลือดออกไม่หยุด ก็อย่าปล่อยให้เลือดออกอยู่นาน ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์เสียโดยเร็ว

๓) ใ้เป็นเลือด (Haematamesis)

การใ้เป็นเลือดมักเนื่องมาจากมีโรคอยู่ที่ปอด เช่น วัณโรคที่ปอด หรือถูกแทงที่ปอด สำหรับในทันเราหมายถึงเฉพาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเท่านั้น

การพยาบาล — ๑. ให้คนไข้นอนบนเปลหาม รีบนำส่งโรงพยาบาล

๒. วางถุงน้ำแข็งบนทรวงอกทั่ว ๆ ไป เมื่อเย็นจนทนไม่ได้ก็ยกถุงน้ำแข็งขึ้นชั่วคราว แล้ววางใหม่

๓. รักษาพยาบาลดังการปัจจุบันพยาบาลทั่ว ๆ ไป

๔) อาเจียนเป็นเลือด (Haemoptysis)

รับนำส่งโรงพยาบาลด่วน และขณะเดินทางให้ปฏิบัติดังเช่นการตกเลือดภายใน

๕) ปัสสาวะเป็นเลือด (Haematuria)

ปัสสาวะเป็นเลือดที่เนื่องมาแต่อุบัติเหตุ มักจะเกิดเนื่องมาแต่ไตแตก กระเพาะปัสสาวะแตก หรือท่อปัสสาวะแตก

การพยาบาล — ๑. รับนำส่งโรงพยาบาลด่วน

๒. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ที่สุด

๓. ใช้ผ้าหอก่อนน้ำแข็งวางไว้ในบริเวณที่ถูกอันตราย เช่น ที่ไต วางในบริเวณส้นขาหรือบนเอว กระเพาะปัสสาวะ วางไว้ในบริเวณเหนือหัว หน้า และท่อปัสสาวะแตก วางในบริเวณฝีเย็บ

๔. ถ้ามึนบาดแผลอยู่ด้วยควรชะล้างให้สะอาดและพันผ้าไว้

๕. ระหว่างทางให้การรักษาย่างการตกเลือดภายในที่กล่าวมาแล้ว

๖) อุจจาระมีเลือด

เลือดอาจออกมาสด ๆ หรือออกเคล้ามาพร้อมกับอุจจาระมีสีดำจัด อาการ เช่น นี้ เป็น อาการ ที่ควร รับ นำ ผู้ บัวย ปรีกษาแพทย หรือนำส่งโรงพยาบาล

บทที่ ๒

บาดแผล (WOUNDS)

คำจำกัดความ บาดแผล คือ “ผลเนื่องมาจากการถูกทำลายของผิวหนังหรือเยื่อเมือก (Mucous Membrane) และส่วนที่ลึกลงไปกว่าชั้นผิวหนัง ทำให้แยกออกจากกัน โดยสาเหตุใดก็ตาม”

บาดแผล - เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ และตัวมันเองเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดอาการต่าง ๆ แทรกซ้อนขึ้นต่อไปอย่างมากมาย เช่น การตกเลือด, ช็อค, เกิดเป็นหนองขึ้น, เลือดเป็นพิษ (เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเล็ดลอดเข้าสู่กระแสโลหิตได้), บาดทะยัก, การเน่าเปื่อยเนื่องจากแบคทีเรียทำให้เกิดแก๊ส (Gas Gangrene) ฯลฯ ฉะนั้นจึงนับเป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญในด้านปัจจุบันพยาบาลอยู่มาก

ลักษณะของบาดแผล

ลักษณะของบาดแผลซึ่งเนื่องจากอุบัติเหตุ อาจแบ่งได้ง่าย ๆ เป็น ๕ ชนิดด้วยกัน ดังนี้ :-

๑) แผลตัด - (Incised Wound หรือ Cut Wound) เกิดจากเครื่องมือหรืออาวุธทิ่มคม เช่น มีด ขวาน ฯลฯ ขอบของแผลมักเรียบและชิดกัน แผลแคบแต่ยาวมักมีการตกเลือดได้มาก ถ้าเส้นเลือดที่อยู่ส่วนล่างของบาด

แผลนั้นถูกทำลายหรือถูกตัดขาด แต่แผลชนิดนี้ถ้าเป็นแผลสะเก็ดมักหายเร็ว เนื่องจากขอบแผลนั้นอยู่ชิดกัน

๒) แผลช้ำ (Contused Wound)

เกิดจากอาวุธหรือเครื่องมือที่ไม่คมตกลงมาบนผิวหนัง หนึ่งชั้นผิวหนังจะมั่วบาดแผลไม่โตนัก ส่วนตอนใต้ผิวหนังลงไปจะชอกช้ำมาก มักมีเลือดออกเพียงเล็กน้อย

๓) แผลถูกแทง (Punctured Wound)

เป็นแผลที่เกิดจากถูกของแหลมตำหรือแทงเข้าไป ปากแผลมักเล็กแต่ลึก บาดแผลจำพวกนี้อาจมีอันตรายมาก ถ้าลึกลงไปถูกอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น ปอด, หัวใจ, ตับ, ไต, กระเพาะอาหาร ฯลฯ เป็นสาเหตุให้เกิดการตกเลือดภายในได้มาก ๆ และบางครั้งอาวุธนั้น ๆ อาจหักคาอยู่ภายในแผลได้

๔) แผลฉีกขาด (Lacerated Wound)

แผลพวกนี้เกิดจากแรงกระแทกหรืออาวุธที่ไม่คม ขอบแผลมักฉีกขาดกระรุ่งกระริ่ง เนื้อหรือผิวหนังรอบ ๆ แผลจะชอกช้ำมาก บางตอนต้นบางตอนลึก ตัวอย่างเช่น ถูกตี, ถูกเครื่องจักร ฯลฯ

๕) แผลถลอก (Abrasion)

บาดแผลตื้นเพียงผิวหนังถลอกหรือถูกข่วนไปเท่านั้นมีเลือดออกน้อย

๖) แผลถูกยิง (Gunshot Wound)

แผลพวกนี้อาจลึกไปมาก และอาจตรวจพบรอยทางเข้าและทางออกของกระสุนปืน แต่บางครั้งอาจมีกระสุนฝังในมักจะเกิดมีหนองขึ้น เพราะ

กระสุนมักผ่านทะลุเสื้อผ้านำเอาแบคทีเรียเข้าไปทางบาดแผล และอาจมี
อาการของเลือดตกใน ถ้าหากว่ากระสุนปืนทะลุเข้าไปในอวัยวะภายในที่
สำคัญๆ

เครื่องใช้ในการปัจจุบันพยาบาลบาดแผล

ชนชื่อว่า “บาดแผล” แล้ว ความสำคัญอยู่ที่การติดเชื้อมีแบคทีเรีย
ทำให้เกิดอันตรายต่อบาดแผลย่อมมีอยู่ทั่วๆ ไปทุกหนทุกแห่ง และเมื่อมี
บาดแผลขึ้นก็เป็นโอกาสที่แบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายได้

ฉะนั้น ความจำเป็นจึงอยู่ที่การป้องกันและการทำลายเชื้อโรคซึ่งเป็น
หลักสำคัญ (และเป็นหลักเบื้องต้นของวิชาศัลยศาสตร์)

เครื่องมือเครื่องใช้ในการปัจจุบันพยาบาลบาดแผล ควรจะต้องสะอาด
และได้รับการฆ่าเชื้อโรคแล้ว จากการนี้, การใช้ยาฆ่าเชื้อโรคหรือจากการ
ต้ม แต่ถ้าจำเป็นหาเครื่องมือที่สะอาดเช่นกล่าวมาได้ ก็ควรใช้ยาบางชนิดใน
การฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อที่อาจหาได้ง่ายๆ เสียก่อน เช่น แอลกอฮอล์
ทิงค์เจอร์ไอโอดีน ฯลฯ ความสะอาดเหล่านี้ถ้ามีได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นการ
ช่วยให้ผู้ป่วยพ้นอันตรายลงได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

หลักสำคัญในการปัจจุบันพยาบาลบาดแผลโดยทั่วไป

- ๑) ถ้ามีการตกเลือดจะต้องห้ามเลือดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังได้กล่าว
มาตั้งแต่บทแรกแล้ว
- ๒) ถ้ามีอาการช็อคหรือเป็นลม ควรรักษาอาการช็อคหรือเป็นลม

เสียก่อน (จะกล่าวในบทต่อไปเกี่ยวกับเรื่องข้อค)

๓) เมื่อเลือดหยุดแล้วทำความสะอาดแผล

ควรล้างมือให้สะอาด และใช้เครื่องมือที่สะอาดในการแต่งบาดแผล ดังกล่าวมาข้างต้น บางแผลที่มีเลือดแข็งตัว (Clot) อุดปากแผลอยู่ย่ำติ่ง หรือเกาะออก เพราะอาจทำให้เกิดการเลือดตกได้อีก น้ำยาที่ใช้ชะล้างบาดแผลอาจใช้ทำได้ง่าย ๆ เช่น น้ำต้ม, น้ำเกลือ, น้ำยาด่างทับทิม หรือแอลกอฮอล์ เมื่อชะล้างบาดแผลสะอาดแล้วใช้ผ้า—ผ้ากอสม์—หรือสำลีที่สะอาด ปิดแผล แล้วพันผ้าเอาไว้

๔) ขณะที่ทำความสะอาดแผล ควรตรวจบาดแผลไปด้วย

การตรวจบาดแผลนั้น เราต้องดูว่าบาดแผลมีลักษณะเป็นชนิดใด ความกว้าง—ยาวหรือลึกเท่าใด มีสิ่งใดหักคาอยู่หรือไม่ ถ้าสมควรเอาออกเสีย ถ้าเป็นแผลถูกยิงตรวจดูลักษณะบาดแผลและทางเข้าออกของกระสุนปืน

๕) ถ้าบาดแผลเกิดชนบริเวณแขน—ขา ควรให้ส่วนนั้นได้พักอยู่ นิ่ง โดยการเข้าเฝือกไม้ภายหลังที่แต่งบาดแผลเรียบร้อยแล้ว และถ้าเป็นบริเวณแขนเมื่อเข้าเฝือกไม่ว่างแล้ว ควรจะให้ใช้ผ้าคล้องคอห้อยแขนนั้นไว้

๖) ถ้าจำเป็นควรส่งโรงพยาบาลโดยด่วน และนำส่งโดยใช้เปลหาม

๗) ควรบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราว ตลอดจนการรักษาบาดแผลไว้แล้วนั้นเอาไว้ด้วย เพื่อง่ายจะเป็นการให้ความสะดวกแก่แพทย์ หรือการประกอบรูปคดี ถ้าหากว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับคดี

๘) ควรนวดยักนวดทะยัก (หรือแนะนำให้ไปนวด) เสียด้วยทุกรายไป (ขนาดยาบ่งกันบาดทะยักใช้ขนาด ๓๕๐๐ หน่วยสากล) นวดเขากลามเนื้อ

การปัจจุบันพยาบาลบาดแผล

การแต่งบาดแผลแต่ละชนิดคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีแตกต่างไปบ้าง ดังนี้ :—

๑) แผลตัด

ตอนแรก ๆ ควรปล่อยให้เลือดไหลออกเสียบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เลือดที่ออกมานั้นชะล้างสิ่งสกปรกในบาดแผลออกมาเสียบ้าง แล้วทำการห้ามเลือด เมื่อเลือดหยุดแล้วจึงทำการชะล้างบาดแผล ด้วยการชะล้างควรล้างรอบ ๆ นอกของบาดแผลเสียก่อน เพื่อให้รอบบาดแผลนั้นสะอาดแล้วจึงชะล้างบาดแผล เมื่อสะอาดดีแล้วจึงใช้ผ้ากอสหรือผ้าดิบปิดแผลพันผ้าไว้

๒) แผลชำ

ชะล้างบาดแผลตามธรรมดา เมื่อปิดแผลด้วยผ้าดิบและพันผ้าแล้วอาจใช้วางกระเป๋าร้อนหรือขวดน้ำร้อนไว้เหนือบริเวณแผล เป็นการประคบให้อาการชอกช้ำทุเลาลง

๓) แผลแทง

ก) ถ้ามึนสิ่งใดหักคา พยายามดึงออก

ข) ให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ รับรักษาแพทย์ใกล้เคียง หรือนำส่งโรงพยาบาลโดยการใส่เปลหาม

ค) ชะล้างบาดแผลอย่างธรรมดา แต่อย่าล้างเข้าไปในบาดแผล เพราะอาจนำเชื้อแบคทีเรียลงสู่บาดแผลหรืออวัยวะที่ติดลงไปได้ เป็นการเพิ่มอันตรายยิ่งขึ้น

ง) ทำการพยาบาลเช่นการตกเลือดภายใน

๔) แผลฉีกขาด

รักษาบาดแผลอย่างธรรมดา

๕) แผลถูกยิง

ควรทำรอบ ๆ แผลด้วยทิงค์เจอร์ไอโอดีนขนาด ๒% ปิดแผลแล้วรีบ
นำส่งโรงพยาบาลด่วน

บาดแผลที่มีพิษ (Poisoned Wounds)

เป็นบาดแผลพิเศษที่ผิดกับบาดแผลทั่วๆ มาแล้ว และบาดแผลนี้มีพิษซึ่งอาจจะปรากฏอาการเฉพาะที่หรืออาการทั่วๆ ไปได้ เช่น บาดแผลที่เกิดจากคนกัด, งูกัด, สุนัขกัด, แมลงต่อย, ถูกแมงกะพรุนไฟหรือถูกเงี่ยงปลาอีกเป็นต้น บาดแผลเหล่านี้จำเป็นต้องมีการบำบัดรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ นอกเหนือไปกว่าบาดแผลธรรมดาทั่วๆ มาแล้วนั้น

แผลถูกคนกัด

ในปากคนมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อโรคสำคัญและร้ายแรงอยู่หลายชนิดด้วยกัน บางชนิดทำให้เกิดหนอง บางชนิดอาจเข้าสู่กระแสโลหิตเกิดเป็นพิษ (Septicaemia) คนที่เป็นกามโรคอยู่ เชื้อกามโรคอาจผ่านเข้าสู่บาดแผลได้

การบำบัดรักษาพยาบาล—

ล้างบาดแผลให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์, ทิงค์เจอร์ไอโอดีน ๒% น้ำปรอท ๑:๑๐๐๐ แล้วชุบน้ำยาโซดาไบคาร์บอเนต ๒% ปิดแผลนั้นไว้

แมลงต่อย

แมลงที่ต่อยทรมานเหลือเกิน เช่น ผึ้ง, แตน, ต่อ, เมื่อต่อยแล้วเหลือเกิน

จะคาอยู่ พืชของพวกนมกมฤทธกรรต แผลที่ถูกต่อยจะบวม คัน และปวด ไม่
 ยอมอันตรายนานนัก แต่ถาถูกต่อยบริเวณหน้าหรือคอมาก ๆ ทำให้คอ
 บวมจนอาจหายใจไม่ออก ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือด่วน

การปัจจุบันพยาบาล—

๑. ต้องพยายามเอาเหล็กในนั้นออกเสีย โดยใช้ลูกกุกญแจชนิดที่มี
 รูตรงปลายลูกกุกญแจกดลงที่ตรงแผลนั้น เหล็กในก็จะไ้ลื่นขึ้นมาให้คืบออกได้

๒. เมื่อเหล็กในออกแล้ว ใช้สาลิชุบน้ำยาที่เป็นด่างอ่อน ๆ เช่น
 น้ำแอมโมเนีย, น้ำแอมโมเนียหอม, น้ำโซดาไบคาร์บอเนต, น้ำปูนใสหรือ
 น้ำเกลือชุบปิดแผลไว้

๓. อาการปวดเจ็บอาจให้รับประทานยาระงับปวด เช่น แอสไพริน

๔. ถาถูกแมลงต่อยบริเวณคอหรือหน้า ทำให้บวมจนหายใจไม่
 ออกควรรีบนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือโดยวิธีการผ่าตัดเจาะ
 หลอดลมที่บริเวณคอ เพื่อให้หายใจสะดวก (Tracheotomy)

แผลถูกแมลงบ่งตอย, ตะขาบหรือแมลงมุกกัด

บาดแผลพวกนี้จะทำให้เกิดอาการอย่างพวกแมลงตอยทกกล่าวข้างต้น
 แต่จะบวมและปวดมาก บางคนอาจแพ้พิษมาก มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน ทง
 นเนื่องจากพิษของมันถูกดูดซึมซาบเข้าสู่กระแสโลหิต

การปัจจุบันพยาบาล

๑) ใช้เชือกหรือทูนิกเกอร์รัดเหนือบาดแผล เพื่อกันไม่ให้พิษถูกดูด
 ซึมซาบไปทั่วกระแสโลหิต

- ๒) ใช้ปากสะอาดดูดทาบแผลแล้วบ้วนทิ้ง เพื่อดูดเอาพิษออก
- ๓) อาจผ่าหรือกรีดบาดแผลนั้นให้กว้าง แล้วใช้เกล็ดต่างทาบทึบมิดเข้าไปในแผล
- ๔) อาจใช้เหล็กเผาไฟแล้วจลงทแผล เพื่อทำลายพิษนั้น
- ๕) ทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน ๒%
- ๖) ถ้าบริเวณนั้นบวมมาก อาจใช้วางก้อนหรือถุงน้ำแข็งเพื่อเป็นการประคบ ทำให้การบวมยุบเร็วขึ้น
- ๗) ในบางรายซึ่งพบบ่อย ถ้าจำเป็นอาจจะต้องให้ยาบำรุงหัวใจ

งูกัด

ต่อมาพิษงูเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากต่อมน้ำลาย พิษจะมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิดของงู เขี้ยวอาจอยู่ด้านหน้าหรือตอนสุดมุมปาก จะมีพิษนำพิษมาจากต่อมน้ำพิษมาเบียดทเขี้ยว เวลาทงูกัดต่อมน้ำพิษจะขับน้ำพิษออกมาลงสู่บาดแผลทุกคืนวัน งูซึ่งกัดครั้งแรก ๆ อาจมีน้ำพิษออกมาราว ๆ ๐.๖—๑.๐ ค.บ.ซ.ม. แต่ในการกัดตอนหลัง ๆ น้ำพิษจะลดน้อยลงไปทุกที

การพยาบาล

- ๑) ต้องตรวจดูรอยเขี้ยว แล้วใช้เชือกหรือท่อนึงรัดตอนเหนือแผลนั้น เพื่อกันไม่ให้พิษนั้นซึมซาบเข้ากระแสโลหิต (พิษที่ซึมซาบเข้าไปได้นั้น มีฤทธิ์จะทำให้หม่อมพาดต่อเส้นประสาททเกี่ยวข้องกับการหายใจ ผู้ป่วยจะตายก็เนื่องจากการหายใจหยุด และพิษของมันอาจทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงได้มาก ๆ จนอาจตายได้)

๒) ใช้ปากสะอาด ๆ ดูดที่บาดแผลแล้วบนทง เพื่อเป็นการดูดเอาพิษออกจากบาดแผลนั้น

๓) ล้างแผลด้วยน้ำยาต่าง ๆ กัน หรือใช้เกลือต่าง ๆ กันยัดแผลนั้น

๔) ให้ยาบำรุงหัวใจ หรือยาที่เพิ่มความดันโลหิต ถ้าหาหาไม่ได้ จะให้ดื่มเบรนต์หรือวีสกีสก็เล็กน้อยก็ได้

๕) นัดเซรุ่มเพื่อทำลายพิษ (ซึ่งจะต้องปรึกษาแพทย์ หรือรับนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง)

เซรุ่มทำลายพิษที่ใช้ฉีด มักเป็นชนิดที่ทำลายพิษหลาย ๆ ชนิดรวมกัน เพราะส่วนมากแล้วไม่ทราบว่าจะกัดคนนั้นเป็นชนิดใด ฉะนั้น ถ้าได้ตัวที่กัดนั้นเป็นงูอะไร อาจใช้เซรุ่มทำลายพิษเฉพาะงูนั้น ๆ ได้

สุนัขบ้ากัด

เมื่อถูกสุนัขบ้ากัด ผู้ป่วยจะเกิดอาการของโรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้เกิดโรคกลัวน้ำเป็นเชื้อจำพวกไวรัสที่จะมอยู่ในน้ำลายของสุนัขที่เป็นโรคกลัวน้ำ เชื้อไวรัสจะเข้าสู่บาดแผลที่ถูกกัดแล้วไปสู่สมอง

ระยะฟักตัวของโรค (คือเวลาตั้งแต่เชื้อไวรัสโรคกลัวน้ำเข้าสู่บาดแผลไปจนถึงเวลาที่ผู้ป่วยเกิดอาการของโรคกลัวน้ำขึ้น) ไม่ค่อยแน่นอน อาจเกิดภายใน ๗ วันจนถึงหลาย ๆ เดือน เฉลี่ยแล้วราว ๆ ๓ เดือน

สัตว์ที่อาจเกิดโรคกลัวน้ำได้นั้นได้แก่พวกสุนัข, วัว, ม้า, แพะ, แกะ, แมว หรือสัตว์เลื้อยคลานด้วยนม

ลักษณะของสุนัขบ้า

สุนัขบ้าอาจมีอาการเป็น ๒ จำพวกด้วยกัน

จำพวกที่ ๑ “ชนิดอาละวาด”

สุนัขพวกนี้จะดุ ตื่นตกใจง่าย กระสับกระส่าย วิ่งตลอดเวลา ถ้าพบสิ่งใดขวางหน้าจะกัดไม่เลือก ไม่กินอาหาร ลั่นแหล่หอย น้ำลายไหล หางตก ตม้น้ำไม่ได้ (อาการกลัวนานเนื่องจากมีอัมพาตของหลอดอาหาร จึงกลืนน้ำลงไปไม่ได้ ทำให้มีอาการคล้าย ๆ กับกลัวน้ำในขณะที่ตม้น้ำหรือกลืนอาหาร) ตอนสุดท้ายจะมีอัมพาตเดินไม่ได้ และในที่สุด—ตาย

จำพวกที่ ๒ “ชนิดอัมพาต”

สุนัขพวกนี้ พอเริ่มเป็นโรคก็เป็นอัมพาต จะนอนนิ่งไม่กินอาหาร หรือตม้น้ำ มขยอนหรืออาเจียน ลั่นแหล่หอย ลั่นสั้น น้ำลายไหล ระยะสุดท้ายหายใจขัดและตาย

อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัวน้ำ

ผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัด เมื่อเกิดอาการโรคกลัวน้ำชนมกมีอาการคล้ายกับสุนัขอย่างพวกแรก ถ้าตรวจบาดแผลมักจะเห็นว่าแผลหายไปแล้วหรือถายงคมแผลหาย แผลที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเจ็บแฉะและบวมเพียงเล็กน้อย

เมื่อเริ่มมีอาการ จะปวดศีรษะกระสับกระส่าย คอจะบิดเอี้ยวไปมา หายใจขัด ลั่นแฉะ ระบายน้ำมาก แต่ไม่อาจกลืนอาหารหรือตม้น้ำได้ ในระยะหลังจะมีการชักกระตุก หายใจขัดมากขึ้น หมดความรู้สึกและตาย

การปัจจุบันพยาบาล

เมื่อถูกสุนัขกัด (หรือสงสัยว่าสุนัขนั้นเป็นบ้า)

- ๑) ใช้เชือกหรือท่อนีเกตรัดเหนือตำแหน่งที่ถูกกัด
- ๒) ให้ตัวผู้ป่วยเองดูดทาบดแผลแล้วบ้วนทิ้ง
- ๓) สะล้างบาดแผลด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำปรอท ๑:๑๐๐๐ แล้ว ทาแผลด้วยทิงค์เจอร์ไอโอดีน ๒ ๑/๒
- ๔) อาจใช้เหล็กเผาไฟจลบบาดแผลเพื่อทำลายเชื้อ หรือใช้กรดคาร์บอริกหรือซิลเวอร์ไนเตรต (เกลือเงิน) จลบบนบาดแผล
- ๕) แนะนำฉีดวัคซีนกันโรคกลัวน้ำ

แมงกระพรุนไฟ

เมื่อถูกแมงกระพรุนไฟ ผิวหนังจะไหม้ และมีอาการปวดแสบปวดร้อน ในตอนหลังจะพอง แดง และแผลหายช้า

ปัจจุบันพยาบาล

เมื่อถูกตอนแรก ใช้ทรายตามชายหาดนั้นถูบนผิวหนังเพื่อขัดเอาน้ำเมือก ๆ จากตัวแมงกระพรุนไฟบนผิวหนังออก

ต่อมาใช้พวกต่างอ่อน ๆ เช่น น้ำแอมโมเนีย, น้ำแอมโมเนียหอม หรือน้ำยาโซดาไบคาร์บอเนต ๓% ชุบปิดแผลนั้นไว้

แผลปลาปัก

แผลปลาปัก อาจเนื่องจากถูกส่วนแหลมที่แข็ง, ครีบ หรือหางของปลา ทำให้เกิดอาการอักเสบ ปวด บวม และมีไข้ได้ ปลาบางชนิด เช่น ปลาดุกทะเล ถ้าถูกเงี่ยงปลาพวกนี้เขาจะเกิดพิษมาก ปวดบวมและมีไข้สูง อาจมีอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนได้

การจับขึ้นพยาบาล

ถ้ามีสิ่งใด เช่นเงยงกคากอยู่จะต้องดึงออกเสีย ถ้าแผลแคบอาจใช้
มดกรดให้กว้างและชะล้างบาดแผลด้วยน้ำยาต่างที่บทมละลายแก่ ๆ

อย่าลืม

เมื่อพบผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุมีบาดแผลชน ย่อมเป็นกฎตายตัวที่จะ
ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยได้รับการฉดยาป้องกันบาดทะยักทุกรายไป

บทที่ ๓

ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burns and Scalds)

ไฟไหม้ (BURNS)

หมายถึงการทำลายผิวหนังหรือเนื้อ เนื่องมาจากถูกความร้อนซึ่งอาจเกิดไฟ, พม่า, กระแสไฟฟ้า รังสีเร็นต์เจนต์ (X-ray), รังสีอัลตราไวโอเล็ตของแสงแดด (และทั้งนี้อาจรวมหมายถึงการถูกเคมีวัตถุจำพวกกรดและด่างรวมเข้าไปด้วย)

น้ำร้อนลวก (SCALDS)

หมายถึงการทำลายผิวหนังหรือเนื้อ เนื่องจากถูกความร้อนชนิดเปียก เช่น น้ำเดือด, ไอน้ำ น้ำมันร้อนๆ เป็นต้น

การจำแนกชนิด :— ไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนั้นอาจจำแนกออกได้ตามความลึกของชั้นเนื้อที่ถูกทำลาย และเราเรียกชนิดนี้เป็น “ดีกรี” (Degree) ซึ่งมีได้เป็น ๒ ดีกรีดด้วยกัน

ดีกรี ๑. (First Degree) คือผิวหนังนูนสีแดง ซึ่งในตอนหลังก็จะค่อยจางหายหรือลอกไปเอง

ดีกรี ๒. (Second Degree) ผิวหนังตื้นๆ เกิดพองใสขึ้น และถ้า

แตกออกก็จะมึนน้ำใสๆแตกออกมา พวกนี้จะมีการทำลายของชั้นหนึ่งกำพรา
ตอนผิว ๆ เท่านั้น

ดีกรีที่ ๓. (Third Degree) ผิวหนึ่งกำพราถูกทำลายไปหมด

ดีกรีที่ ๔. (Fourth Degree) ผิวหนึ่งกำพราและหนังแท้ถูกทำลายจน
ถึงชั้นใต้ผิวหนัง

ดีกรีที่ ๕. (Fifth Degree) ผิวหนึ่งถูกทำลายจนถึงชั้นกล้ามเนื้อถูก
ทำลาย

ดีกรีที่ ๖. (Sixth Degree) การทำลายมีจนถึงชั้นกระดูกก็ไหม้ไป
ด้วย

การแบ่งเช่นนี้เพื่อให้รู้ถึงขนาดความลึกของบาดแผลนั้น และเป็น
การง่ายที่จะเข้าใจกันได้ในเรื่องผู้ทรมานความรู้ เช่นจะบอกว่า “ผู้ช่วยถูกไฟ
ไหม้อย่างดีกรีที่ ๒” (Burns Second Degree) ก็ทำให้รู้และนึกเห็นได้ว่า ผิว
หนังที่ไหม้จะพองขึ้นและผิวหนังตอนผิว ๆ เท่านั้นที่ถูกทำลายลง

การพยากรณ์โรค

ไฟไหม้และนารอนลวกนั้น ถ้าถูกเพียงเล็กน้อยไม่อันตรายร้าย
แรงแต่อย่างใด แต่ถ้าถูกมาก ๆ อันตรายจะเกิดขึ้นได้มากตามที่จะได้เล่าถึง
อาการของโรคต่อไป ซึ่งผู้ช่วยอาจถึงตายได้

การพยากรณ์ว่าจะดีหรือเลวเพียงใดนั้น แล้วแต่สาเหตุหลายอย่าง
เช่น

๑) ถ้าผู้ช่วยเป็นเด็กการพยากรณ์โรคก็เลว เพราะเด็กไม่อาจทนต่อ
บาดแผลได้เท่าผู้ใหญ่

๒) เนื้อของร่างกายที่ถูกไหม้ ถ้าหากว่าถูกไหม้ถึง ๑ ใน ๓ ของเนื้อของร่างกาย การพยากรณ์ก็เลวมาก ในเด็ก ๆ เพียง ๑ ใน ๘ ก็นับว่ามอันตรายมาก

๓) บริเวณหน้าอกหรือหน้าท้อง ถ้าถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก อันตรายมักสูงชันกว่าถูกบริเวณอื่น

๔) การปัจจุบันพยาบาลและการรักษาทำได้ถูกต้องและดีเพียงใด

อาการ, อันตราย และโรคแทรกซ้อน

อาการและอันตรายเนื่องจากการถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนั้น จะมากหรือน้อยก็ย่อมแล้วแต่เนื้อของผิวหนังที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก และแล้วแต่ว่าการรักษาได้รับถูกต้องอย่างไร มีการติดเชื้อ (Infection) ของบาดแผลมากน้อยเพียงใด

อาการและโรคแทรกซ้อนนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๔ ระยะด้วยกัน ซึ่งแต่ละระยะก็อาจทำให้มอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนั้น และระยะทั้ง ๔ นี้จะปรากฏอาการเป็นระยะชัดเจนต่อเมื่อไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกเป็นเนื้อทกวาง ๆ

ระยะที่ ๑ “ระยะช็อคขั้นต้น (Primary Shock)”

ผู้ป่วยจะมีอาการช็อคปรากฏทันทีเมื่อถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนั้น (อาการของช็อคจะกล่าวออกไปในบทที่ ๕ ซึ่งจะกล่าวไว้ในเรื่องช็อค) ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัว หหมดสติ ชีพจรเบาแต่เร็วมาก กระสับกระส่าย กระหายน้ำ เหงื่อออกตัวเย็น ในระยะหลังอาจสิ้นสติและความรู้สึก (Coma) และตาย

อาการช็อคที่เกิดขึ้นในระยะนี้ เชื่อว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความเจ็บปวดอย่างมากมาขยทได้รับการถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนั้น ถ้าผู้ป่วยไม่ตายในระยะนี้อาการกลับคืนขึ้น แล้วผ่านเข้าสู่ระยะที่ ๒ ต่อไป

ระยะที่ ๒ “ระยะช็อคชนท ๒” (Secondary Shock)

อาการช็อคในชนทจะเกิดขึ้นภายหลังจากถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
แล้วเป็นเวลาตั้งแต่ ๒—๒๔ ชั่วโมง อาการช็อคระยะนี้มักคล้ายกับช็อคชนท
แต่ค่อนข้างรุนแรงกว่า สาเหตุที่ทำให้ช็อคในระยะนี้เข้าใจกันว่าเนื่องจาก
เหตุ ๒ ประการ คือการเสียน้ำจากร่างกายไปมากโดยถูกไฟเผา, เหนือออก,
และจากการเสียน้ำเหลืองไปเป็นส่วนหนึ่งของประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็
เพราะการที่เนื้อถูกทำลายนั้น ทำให้เนื้อนั้นตายเกิดเป็นวัตถุพิษชนิดหนึ่ง
เราเรียกกันว่า (Histamine-like Substance) ซึ่งพิษนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสโลหิต เป็นพิษที่ทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลง

ระยะที่ ๓ “ระยะเกิดพิษ” (Septic Toxaemia)

การเกิดเป็นพิษชนิดนี้เนื่องจากการติดเชื้อ (Infection) โดยทแบค-
ทีเรียชนิดที่ทำให้เกิดหนองต่าง ๆ นั้นเข้าสู่บาดแผล ทำให้เกิดอันตรายชน
ท (เช่นแบคทีเรียพวก Streptococci, Staphylococci หรือ Gas Bacilli เป็น
ต้น) อาการของระยะนี้จะปรากฏขึ้นภายหลังจากถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกมา
แล้ว ๔๘—๗๒ ชั่วโมง

ที่บาดแผลเราจะพบว่าการอักเสบ มีหนองเกิดขึ้น หนองอาจมีกลิ่น
เหม็นเน่า ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ชีพจรเร็ว ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เบื่อ
อาหาร นอนไม่หลับ อาจมีอาการหนาวสั่น บัสสาวะเข้มเหลืองจัด เพื่อ ไม่
ค่อยได้สติ ในระยะสุดท้ายอาจหมดสติและความรู้สึกและตาย

อาการในระยะนี้ยังจะรุนแรงและมีอันตรายยิ่งขึ้น ถ้าหากเชื้อโรค
เล็ดลอดเข้าสู่กระแสโลหิตได้ แล้วเพิ่มตัวของมันขึ้นอย่างมากมาย และ

ปล่อยพิษของมันลงในกระแสโลหิตซาบซ่านไปทั่วร่างกาย (โรคนี้เราเรียกว่า Septicaemia)

ถ้าหากว่าพ้นจากระยะนี้ไปได้ ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะที่ ๔

ระยะที่ ๔ “ระยะหายหรือเกิดแผลเป็น” (Scar Formation)

เมื่อหายมักเกิดแผลเป็นขึ้น แผลเป็นจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยย่อมแล้วแต่การรักษาซึ่งได้รับมาถูกต้องเพียงใด การใช้ยาป้องกันและทำลายเชื้อโรคซึ่งเกิดขึ้นกับบาดแผลนั้นถูกต้องหรือเพียงพอแค่นี้ และไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนั้นทำลายเนื้อลงไปมีความลึกถึงชั้นไหน ยิ่งแผลลึกมากแผลเป็นก็เกิดมาก

แผลเป็นนั้นถ้าเกิดขึ้นบริเวณข้อพับต่าง ๆ เช่น ข้อศอก, ข้อเข่า, บริเวณนวมมือ ฯลฯ แล้ว ในตอนหลังๆ แผลเป็นมักหดตัว ดึงรั้งให้ข้อนั้นหดพับตัวเข้า เป็นเหตุให้เหยียดข้อนั้นไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะน่าเกลียด ทพพลภาพ และถ้าเป็นแผลเป็นบริเวณหน้าจะทำให้ใบหน้าน่าเกลียดเสียโฉม เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดปมด้อยอยู่ในใจ และแม้ว่าจะพ้นอันตรายมาถึง ๓ ระยะจนแผลหายแล้วเช่นนี้ผู้ป่วยก็ยังไม่พ้นที่จะตายได้เหมือนกัน โดยการฆ่าตัวตาย

ดังได้กล่าวมาแล้วเช่นนี้ช่วยให้เห็นได้ว่าการถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกย่อมมีความร้ายแรงและมอันตรายถึงชีวิตได้ การปัจจุบันพยายามลดเรื่องนี้นับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งจะต้องให้การเอาใจใส่เป็นพิเศษ และด้วยเหตุนี้

การปัจจุบันพยายาม

๑) ควรรักษาข้อศอกด้วย

ถ้าผู้ป่วยมีอาการช็อค จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือให้พ้นระยะ
นี้ ก่อนทำการพยาบาลในขั้นต่อไป โดย

(ก) ยกปลายเท้า (หรือปลายเตียงที่นอน) ให้สูงขึ้น ให้ศีรษะต่ำ
ลง ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มเติมขึ้น

(ข) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยการคลุมผ้าห่มหรือวางขวดน้ำ
ร้อนตามร่างกายและมือเท้า

(ค) ให้ยาระงับอาการปวดเจ็บ

(ง) แพทย์อาจสั่งฉีดมอร์ฟีน

(จ) ให้ยาบำรุงหัวใจ

(ฉ) อาจต้องให้น้ำเกลือ (เมื่อถึงโรงพยาบาลแล้ว)

(ช) ถ้าหยุดหายใจ ทำการผายปอด

(อ่านวิธีปฏิบัติโดยละเอียดในเรื่องรักษาช็อค)

๒) ควรปรึกษาแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาลด่วน ซึ่งถ้าอาการ
หนักนำส่งโดยเปลหาม

๓) ทำการแต่งบาดแผล :—

(ก) ตัดเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้ออกทิ้งให้หาย

(ข) ผีวหนึ่งตอนใดพออง ให้ตัดผิวนึ่งส่วนที่พองนั้นทิ้งจนเหลือแต่
เนื้อแผลซึ่งเราจะเห็นมัสแดง การปล่อยให้ส่วนพองนั้นยังคงอยู่อาจทำให้
การพองลุกลามต่อไปหรือเกิดเป็นหนองขึ้นในน้ำที่อยู่ในส่วนพองนั้น และ
ทำให้การไชยาหาไม่ได้ถึงตัวบาดแผล

(ค) ล้างแผลด้วยน้ำอุ่น, น้ำด่างทับทิม, น้ำเกลือ, หรือน้ำยาโซดา
ไบคาร์บอเนต, น้ำปูนใส, แล้วแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเกลือปิดไว้แล้วพันผ้า

๔) แผลอาจใช้ยาต่อไปนี้ได้ผลดี

(ก) น้ำมันลูกไม้ต่าง ๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันมะกอกหรือพาราฟิน (สำหรับในสถานที่ที่ไม่อาจหายาทดก่วนได้) หรือหาสิ่งใดไม่ได้จริง ๆ จะใช้ไขขาวของไขเบ็ดหรือไก่อก็ได้

(ข) น้ำมันวาสลิน

(ค) กรดแทนนิก (Tannic Acid) ละลายในน้ำขนาด ๕—๑๐% ละลายใหม่ ๆ แล้วใช้

(ง) กรดพิคริก (Picric Acid) ละลายในน้ำขนาด ๒% ละลายใหม่ ๆ

(จ) ขมยูกาลิปตัส (Unguentum Eucalyptus)

(ฉ) ขมซัลฟา (Sulfanilamide Paste)

จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เมื่อทาแผลแล้วใช้ผ้าพันไว้เพื่อบ่งกันความสกปรกต่อไป

๕) บริเวณใดที่เป็นข้อพับ เมื่อถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกและได้รับการแต่งบาดแผลเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะในบริเวณแขนหรือขาควรจะได้ผูกไม้ให้แขนหรือนอนอยู่ในท่าเหยียดตรงเอาไว้ เพื่อบ่งกันการหดของแผลเป็นเมือหาย และช่วยให้บริเวณนั้นได้พักนิ่ง

๖) อาจให้ยาฉีดป้องกันบาดทะยักไว้ก่อนด้วย

๗) ถ้าไฟไหม้บริเวณคอ หรือน้ำร้อนลวกในลำคอ อาจทำให้ผู้ป่วยหายใจไม่ออก ควรรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุด เพราะอาจต้องทำการผ่าตัดเจาะหลอดลมทรวงอกของผู้ป่วย (Tracheotomy) เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก

บาดแผลถลอกกรด

บาดแผลถลอกกรดจะมีลักษณะเหมือนกับไฟไหม้ (และอาการต่างๆ
ก็คล้ายคลึงกัน ถ้าถูกเป็นเนื้อมากๆ)

ควรล้างบาดแผลนันทนทด้วยน้ำอุ่น ๆ แล้วชุบน้ำยาที่เป็นด่าง เช่น
โซดาไบคาร์บอเนต ๒% ชุบปิดแผลไว้

เมื่อแผลใกล้ๆจะแห้งแล้ว อาจใช้พวกน้ำยาคาลามายน์ (Calamine
Lotion) ทาก็ได้

บาดแผลตกต่าง

ต่างอย่างแรงทำให้ผิวหนังไหม้เช่นเดียวกับกรด เมื่อล้างบาดแผล
ด้วยน้ำอุ่น ๆ หรือน้ำเกลือแล้ว ใช้ลากล้างกรดน้ำส้มหรือกรดเกลือจาง ๆ
(Dilute Hydrochloric Acid) ขนาด ๑% ชุบปิดแผลเอาไว้

ถูกสายไฟฟ้า

เมื่อผู้ป่วยถูกสายไฟฟ้าจะทำให้ไหม้หรือมีอาการช็อคตายได้ โดย
หัวใจหยุดเต้นและหยุดการหายใจทันที จะต้องรีบนำผู้ป่วยให้หลุดออกจาก
สายไฟฟ้านั้นๆโดยเร็วเท่าที่โอกาสจะทำได้ ดังนี้ :—

- (ก) ปิดสวิทช์ไฟ
- (ข) ถ้ามองไม่เห็นเลยบนพันที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า คึงผู้ป่วยออก
- (ค) ใช้ผ้ายาว ๆ เช่นผ้าขาวม้าหรือเชือก จับชายหรือปลายทั้งสอง
ข้างละมือ ตลบผ้าหรือเชือกให้คล้องตัวคนไข้ดึงกระดูกออกมา

เมื่อผู้ป่วยหลุดออกมาได้ต้องรีบรักษาช็อค ทำการผายปอดและรีบ
นำส่งโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดีขึ้น

บทที่ ๔

“สิ่งแปลกปลอมเข้าตา, หู คอ, จมูก และกระเพาะอาหาร”

(Foreing Bodies in Eye-Ear-Nose-Throat
and stomach)

สิ่งแปลกปลอม หรือ Foreign Bodies ในบทนี้ หมายถึงวัตถุ—
เศษวัตถุ หรือเคมีวัตถุใดๆ ก็ตาม ที่เข้าสู่ตา, หู คอ, จมูก และกระเพาะ
อาหาร เข้าไปค้างหรือดำอยู่ภายในอวัยวะเหล่านั้น เป็นเหตุให้เกิดอาการ
ขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องให้การบำบัดปัจจุบันพยาบาลเป็นพิเศษ เพื่อเอาสิ่งเหล่านั้น
ออกเสีย

ตลงเข้าตา

ตลงเข้าตาในบทนี้ หมายถึงเศษวัตถุใด ๆ ก็ตามที่ตกลงไปในตา และ
อาจจำแนกออกเป็น ๒ ชนิดด้วยกัน

๑) ตกลงไปอยู่ในเปลือกตา และเคลื่อนที่ไปในที่ต่าง ๆ ภายใน
ตานั่นได้ ได้แก่ผงดิน หรือฝุ่น

๒) ตกลงไปในที่ในเปลือกตา หรือตวลูกตา พวกนี้ได้แก่ผงเหล็ก
สะเก็ดหิน หรือประกายหินเหล็กไฟ หรือผงใด ๆ ที่เป็นวัตถุเล็ก ๆ และ
แข็ง มักพบว่าตลงในลูกตาดำหรือตาขาวก็ได้

วัตถุเหล่านี้ บางชนิดถ้าไม่รีบเอาออก อาจทำให้เกิดการอักเสบ
ของลูกตาได้อย่างมากมาย

ปัจจุบันพยาบาล:—

๑. พวกผงเล็ก ๆ ที่ไม่ฝังตัวอยู่ในตา

ก) อย่าขยตา

ข) ให้ล้มตาในน้ำทสะอาด หรือล้างตาด้วยน้ำอุ่น, น้ำเกลือ หรือ
น้ำยาบอริก ๓ %

ค) ถ้าผงอยู่เปลือกตาชั้นบน จับเปลือกตาบนให้ตบลงบนเปลือก
ตาล่างจะทำหน้าที่คล้ายแปรงขัดเอาผงหรือผงในเปลือกตาบน ตัดขนตา
ออกมาในขณะที่จับเปลือกตาบนโยกไปมา แล้วก็จะเชยออกได้ง่าย

ง) อาจเปิดเปลือกตา บน หรือเปลือกตาล่างให้แยกออกเมื่อเห็น
ผงชัดเจนแล้วใช้ชายผ้าเช็ดหน้า หรือสำลี ซึ่งบิดใหม่ปลายแหลม เชย
ผงนั้นออก

จ) เมื่อผงออกจากตาแล้ว ควรล้างตาเสีย

๒. ผงฝังอยู่ในเนื้อของตา

ก) อย่าให้ผู้ป่วยขยตา

ข) อย่าพยายามที่จะเชยเอาผงออกให้ได้

ค) เปิดเปลือกตาล่าง แล้วหยอดตาด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำมัน
พาราฟินเหลวทสะอาด

ง) ให้ผู้ป่วยหลับตา แล้วใช้สำลีก่อนแบน ๆ วางลงบนเปลือก
ตาที่หลับแล้วจน แล้วพนผ้า เพื่อบีบกดไว้ไม่ให้ลูกตาเคลื่อนไหว หรือ
เปลือกตากะพริบมากเกินไป

จ) ประกษาแพทย์ หรือนำส่งโรงพยาบาล

กรดหรือต่างเข้าตา

กรดหรือต่างเข้าตา เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ลูกตามากกรดหรือต่างจะกัดลูกตา และในตอนที่อาจเกิดแผลเป็นของลูกตาดำ ทำให้ตาบอดได้

ปัจจุบันพยาบาล

๑) รีบให้ผู้ป่วยล้มตาในนาทิสี่อาดโดยเร็วที่สุด

๒) ล้างตาด้วยน้ำอุ่น ๆ ได้เร็วแล้วถ้าเป็นกรดเข้าตา หยอดตาด้วยน้ำต่างอ่อน ๆ เช่น น้ำยาโซดาไบคาร์บอเนตจาง ๆ ถ้าเป็นต่างเข้าตา หยอดน้ำส้มอ่อน ๆ (๑ ช้อนชาต่อน้ำ ๑ ไปน့်)

๓) หลังจากหยอดตาด้วยน้ำยาดังกล่าวแล้ว หยอดน้ำมันพาราฟินเหลว ๆ อีกครั้งหนึ่ง

๔) วางก้อนล้าลแบนๆ ลงที่ตาโดยให้หลับตาก่อน แล้วพินผ้าเอาไว้

๕) ส่งปรึกษาแพทย์ หรือส่งโรงพยาบาล

ของเข้าหู

พวกนี้มักจะพบในพวกเด็ก ๆ โดยใช้สิ่งต่างๆ ยัดเล่นเข้าในหู ซึ่งมักจะแถมเมล็ดผลไม้, กระจุก, ลูกปัทม์, หรือขนม ฯลฯ

ปัจจุบันพยาบาล

ห้ามผู้ป่วยไขนวดของตนหรือไม้เคาะหูเพื่อจะเอาของตกลงไปในหูนั้น

ออก เพราะยังจะทำให้ดันเอาวัตถุนั้นลึกลงไปอีก

- ๒) ให้เอียงหูข้างนั้นลงต่ำ วัตถุบางชนิดอาจกลิ้งออกได้เอง
- ๓) ส่งปรึกษาแพทย์ เพื่อใช้เครื่องมือคืบออก

แมลงเข้าหู

ที่พบโดยมากมักเป็นพวกมด, แมลงตัวเล็ก ๆ หรือแมลงสาป หรือน้ำมดมะกอกหยอดหู ตัวแมลงมักจะตายแล้วลอยขึ้นมา ถ้าแมลงนั้นตายแล้วไม่ลอยขึ้นมาเพราะตัวค่อนข้างโต ต้องส่งปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ใช้เครื่องมือคืบออก

ของเข้าจมูก

ของเข้าจมูกมักจะคล้าย ๆ กับของที่เข้าหู แต่ส่วนมากมักจะพบเป็นพวกเมล็ดผลไม้ต่าง ๆ โดยเด็กยัดเล่นเข้าไปเอง บ้างจู้บ้นพยาบาล

- ๑) บีตรูจมูกข้างหนึ่งแล้วส่งน้ำมูกอย่างแรง ของนั้นอาจจะออกเองได้
- ๒) อย่าพยายามใช้นิ้วหรือแคะออกเอง ซึ่งจะทำให้ของนั้นยิ่งถูกดันลึกเข้าไป
- ๓) ส่งปรึกษาแพทย์ เพื่อใช้เครื่องมือเอาออก

ของติดคอ

ของติดคอก็มักจะพบว่าเป็นพวกก้างปลา, กระดูกไก่หรือเบ็ดและพวกสัตว์ต่าง ๆ ในพวกก้างปลาบางครั้งอาจหลุดไปแล้ว แต่รอยแผลที่ก้างปลาตำ

อยู่ยังคงเป็นไหมการเจ็บคออยู่ คล้ายกับกำปลานนั้นยังคงฝังอยู่ ส่วนมาก
กำปลามักจะติดอยู่ที่ลำคอตอนบนหรือบริเวณทอนซิล

ปัจจุบันพยาบาล

๑) ถ้าเป็นกำปลาเล็กๆ ให้กลืนน้ำ, ชาวเป็นก้อนๆ ไม่ต้อง
เคี้ยว หรือขนมปังปอนด์นุ่มๆ ก็อาจหลุดลงไปได้เอง

๒) ถ้าไม่ออก อย่าพยายามไปเขี่ยหรือดึงออก นอกจากจะเห็น
ได้ชัดเจน จึงควรถูก

๓) ขอตัดลำคอลลึกลงไป ควรส่งปรึกษาแพทย์ เพื่อใช้เครื่อง
มือพิเศษเอาออก

ของตกลงในกระเพาะอาหาร

วัตถุตกลงในกระเพาะอาหารมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น สัตว์ต่าง,
แหวน, เข็มเย็บผ้าหรือเข็มหมุด, ตะปู ฯลฯ วัตถุใหญ่ๆ อาจเป็นเหตุให้
ไปอุดตันได้ถ้าอาหารผ่านไม่ได้ ส่วนวัตถุปลายแหลมอาจลงไปทิ่มตำกระเพาะ
อาหารถ้าใส่ทะลุได้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการรักษาโดยวิธีผ่าตัด

ปัจจุบันพยาบาล

๑) ให้รับประทานขนมปัง, ขนมฝรั่งลงไปจำนวนมากๆ จะช่วย
เป็นตัวหุ้มกันไม่ให้ของทิ่มปลายแหลมแทงทะลุกระเพาะอาหารหรือลำไส้

๒) อย่าให้ยาถ่ายเป็นอันตราย

๓) ส่งโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง

บทที่ ๕

“การหมดสติ”

(Unconsciousness)

บทนี้นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะรวมเอาโรคเข้าไว้หลายโรคด้วยกัน และการให้การปัจจุบันพยาบาลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้โดยถูกต้อง โดยการตรวจและพิจารณาอาการของผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน ก่อนที่จะหมดสติบางรายอาจมีการชักก่อน หรือบางรายอาจไม่มีการชักก่อนก็ได้ แล้วแต่ชนิดโรคนั้น ๆ

การจำแนกโรคที่ทำให้หมดสติ:

เราอาจจำแนกออกเป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ ด้วยกัน

๑. หมดสติพร้อมกับการหายใจลำบากหรือหยุดหายใจ
ได้แก่โรคที่ทำให้หายใจขัด (ดูเรื่องการหายใจขัด Asphyxia)
2. หมดสติแต่ยังคงหายใจ
พวกนี้ยังออกไปเป็น ๒ พวกย่อย ๆ ดังนี้;—
 - ก) พวกที่ไม่มีการชักด้วย เช่น
 - (๑) ลมบ้าหมู (Epilepsy)
 - (๒) โลหิตเป็นพิษ — ยูรีเมีย (Uremia)

(๓) โรคประสาท — ฮิสทีเรีย (Hysteria)

(๔) จากยาพิษบางอย่างเช่น สไตรคินิน

ข) พวกที่ไม่มีการชัก

(๑) เมาเหလာ

(๒) เส้นโลหิตในสมองแตก

(๓) เป็นลม

(๔) ช็อค

(๕) ยาพิษบางอย่าง เช่น ฝิ่น หรือมอร์ฟีน

(๖) พิษเนื่องจากโรคเบาหวาน

(๗) ลมแดด หรือลมร้อน

ลักษณะของการหมดสติ

ลักษณะของการหมดสติ อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะด้วยกัน

(๑) มึนงงและซึม (Stupor)

ในพวกหมดสติพวกนี้อาจเพียงแต่มึนซึมไป แต่ถ้าเขย่าตัวหรือปลุกก็อาจตื่นงว่งขึ้นมาแล้วหลับไปใหม่ ผู้ป่วยพวกนี้ถ้าหายเปิดเปลือกตาแล้วใช้ไฟฉายเข้าสู่ลูกตา ม่านตาจะเล็กลง (เหมือนเช่นในคนปกติ—การตรวจที่ได้เช่นนั้น เราเรียกว่า “ม่านตามีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง”) เวลาถามก็อาจพูดตอบได้บ้าง แต่อาจเลอะเลือนไป

๒. หมดสติและความรู้สึกทุกอย่าง (Coma)

พวกนี้นับว่าหมดสติไปแล้ว มากกว่าพวกแรก ปลุกไม่ตื่น ม่านตาอาจไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง

การตรวจลูกตาในรายที่หมดสติ

การตรวจลูกตาในรายที่หมดสตินั้นทำได้ง่าย ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้รู้ว่าผู้ป่วยหมดสติจริงหรือไม่แต่อย่างเดียว การตรวจยังทำให้ทราบอีกว่าการหมดสตินั้นมากเพียงใด

๑) การตรวจว่าผู้ป่วยหมดสติจริงหรือไม่ ?

ก) เปิดเปลือกตาบนขึ้นเพื่อให้เห็นลูกตา แล้วใช้เส้นด้ายหรือผ้าเช็ดหน้าเชยเบา ๆ ที่ลูกตาขาว

ข) ใช้ผ้าเช็ดหน้าเชยทวนตาเวลาทหับตาอยู่

โดย ๒ วิธีนี้ ถ้าผู้ป่วยหมดสติก็จะกระพริบตา ถ้าหากหมดสติจริงจะไม่กระพริบตา

๒) การตรวจว่าผู้ป่วยหมดความรู้สึกมากน้อยเพียงใด

ในลูกตาดำ ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่าม่านตาอยู่ และม่านตานี้ อาจขยายหรือหดได้ เมื่อได้รับแสงสว่างจัด ๆ ม่านตาจะหดตัวเล็กน้อย ทำให้ช่องในม่านตาแคบเล็กเข้า แต่ในที่มืด ม่านตาจะขยายตัวเพื่อให้ได้รับแสงสว่างผ่านเข้าลูกตามากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของม่านตา

พวผู้ป่วยที่หมดสติ ม่านตามักจะขยายกว้างเมื่อใช้ไฟฟ้าเดินทาง ฉายเข้าสู่ลูกตา ถ้าม่านตายังหดตัวได้ก็แสดงว่าการหมดสตินั้นยังไม่มากหรือรุนแรง แต่ถ้าม่านตาขยายและไม่หดตัวเวลาส่องไฟเข้าลูกตา ก็แสดงว่าการหมดสตินั้นเป็นมากและรุนแรง

หลักปฏิบัติในการให้การบำบัดพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมดสติโดยทั่วไป

๑) ตรวจสอบว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ ถ้าหยุดหายใจต้องทำการหายใจ
ปอด

๒) ตรวจสอบว่าการตกเลือดหรือไม่ ถ้ามีการห้ามเลือด

๓) จับให้ผู้ป่วยนอนหงาย เอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเป็น
การกันไม่ให้ล้มตกไปด้านหลังลำคอ ซึ่งจะปลอดภัยและเป็นการ
ป้องกันไม่ให้อาเจียนที่ผู้ป่วยอาเจียนออกมานั้นไหลลงสู่หลอดลม เป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายขึ้นต่อไป

ถ้าใบหน้าน้ำสีแดง ควรให้นอนศีรษะสูงขึ้น โดยการใช้น้ำม้วน
หนุนบริเวณไหล่และศีรษะ แต่ถ้าใบหน้าซีดขาว ควรให้นอนศีรษะต่ำๆ

๔) เครื่องนุ่งห่มที่คับๆ ในบริเวณคอ—หน้าอก—ท้อง ควรเปลี่ยน
เครื่องนุ่งห่มส่วนนั้นให้หลวม ถ้ามีฟันปลอมใส่อยู่ถอดฟันปลอมออกเสีย
(ถ้ามีช่องมีค่าอยู่ ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี)

๕) ให้นอนราบ เหยียดขาและแขนลงไปตรงๆ และควรคิดว่า
อาจมีกระดูกหักที่หนึ่งใด ซึ่งการจะเคลื่อนไหวตัวผู้ป่วยจะต้องทำด้วยความ
ระมัดระวังยิ่ง

๖) อย่าให้ดื่มหรือกินอาหาร—แม้แต่ น้ำ ในผู้ป่วยหมดสติ

๗) ตรวจสอบว่ามีบาดแผลที่ใดบ้าง โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ

๘) ทำการตรวจหรือค้นหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยหมดสติ และประวัติ

การเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วย อาจได้รับจากผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดหรือผู้พบเหตุการณ์
มาแต่ต้น

๘) ถ้ามีอาการชักขึ้นมา ให้ใช้มวนผ้าหรือจุกไม้กอกยัดเข้าไว้ใน
ระหว่างฟัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยกัดลิ้นตนเอง

๑๐) หมั่นสังเกตชีพจรและการหายใจ

๑๑) ในรายที่เกี่ยวกับคดี ควรจดบันทึกเหตุการณ์ตลอดจนพยานผู้
เห็นเอาไว้ด้วย

วิธีการตรวจผู้ป่วยทั้งหมดสติ

การตรวจนั้นควรจะทำโดยด่วนและตรวจเป็นลำดับไปดังนี้:—

๑) ศีรษะ— ตรวจดูว่ามีบาดแผลซึ่งอาจเป็นตัวต้นเหตุกระทบ
กระเทือนไปถึงสมองนั้น มีบ้างหรือไม่?

๒) ใบหน้า— ใบหน้าทมัสแดงกล่ำ มักจะเนื่องมาจากเมาเหล้า
เส้นโลหิตในสมองแตก หรือมันสมองถูกกด

ถ้าใบหน้าซีด มักจะเนื่องจากมันสมองกระเทือน (Concussion),
เป็นลม, ช็อค ฯลฯ

ถ้าใบหน้าสีเขียวคล้ำ มักเนื่องมาจากการหายใจขัด, โรคลมบ้า
หมูขณะชัก

๓) หูและจมูก— ตรวจดูว่ามีน้ำหรือเลือดออกมาหรือไม่ถ้ามี
มักเนื่องมาจากกระดูกศีรษะตอนฐานแตก

๔) ปากและลิ้น— ถ้าหากพบแผลที่ริมฝีปากหรือลิ้น มักจะ
เนื่องจากลมบ้าหมูขณะชักกัดลิ้นตนเอง

ถ้าบริเวณริมฝีปาก, กระพุ้งปาก หรือลิ้น มีสีมืดปกติหรือหรือรอย
ไหม้ติดอยู่ อาจเป็นพิษของยาพิษที่รับประทานเข้าไป

ควรตมกลั่นหายใจ ซึ่งอาจมกลั่นเหล้าหรือกลั่นผิดปกติอย่างไรว่าง

๕) คอ— ควรตรวจดูว่ามีรอยผิดปกติอย่างไรว่าง ซึ่งอาจจะถูก
แขวนคอหรือฆาตกรรมด้วยการรัดคอ

๖) ตา— (ก) ดูลักษณะและขนาดของม่านตา และม่านตาทั้งสอง
ข้างเท่ากันหรือไม่

ถ้าม่านตาขยายทั้งสองข้าง—มักเนื่องจากช็อค, เมาเหล้าหรือพิษยา
บางอย่าง (เช่นเบลลาดอนนา)

ถ้าม่านตาทั้งสองข้างเล็กลง—มักเนื่องจากยูริเมยา หรือแพพวกฝัน
และมอร์ฟิน

ถ้าม่านตามีขนาดไม่เท่ากัน— มักเนื่องจากมันสมองถูกกด, เส้น
เลือดในสมองแตก

(ข) ตรวจม่านตาว่ามีปฏิกิริยาต่อแสงสว่างหรือไม่ ดังได้กล่าว
มาแล้ว

๗) ตรวจหาตำแหน่งทมเลือดออกหรือกระดูกหัก
ตรวจดูกระดูกซี่โครง, กระดูกต้นคอ เซิงกราน หรือแขนขา และ
กระดูกสันหลัง

๘) แขนขา— ตรวจว่ามีเลือดออกหรือกระดูกหักหรือไม่? มีอัม
พาตของแขนขาบ้างหรือไม่?

๙) ผิวหนัง— ถ้าหากชืด—เย็นและมเหงอ มักเนื่องจากช็อคหรือ
การตกเลือด

ถ้าผิวหนังร้อน— มใช่ มักเนื่องจากลมแดด, ลมร้อน หรือมัน
สมองถูกกด

๑๐) การหายใจ—ตรวจดูระยะ ลักษณะและจังหวะของการหายใจเปลี่ยนแปลงผิดปกติอย่างไร

๑๑) ชีพจร— ชีพจรช้าแต่แรง — มักเนื่องจากเมาเหล้า, เส้นเลือดในสมองแตก, มึนสมองถูกกด

ชีพจรช้าและเบา — มักเนื่องจากมึนสมองกระเทือน, แพ้ฝุ่นหรือมอร์ฟีน

ชีพจรเร็วและเบา— มักเนื่องจากตกเลือดหรือช็อค

๑๒) การชัก— ถ้ามการชักเนื่องจากลมบ้าหมู, ยूरเมยการแพ้พิษยาบางชนิด (เช่นสตริคนิน)

“ เผล ”

(Fainting)

การเป็นลมหน้ามืด เป็นผลเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยไปชั่วคราว

สาเหตุ เนื่องจากร่างกายอ่อนเพลีย อยู่ในททมฝูงคนแออัดยัดเยียด การถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ไม่สะดวก การออกแรงหรือกำลังมากเกินไป อากาศร้อนอบอ้าว ตื่นเต้นตกใจหรือเสียใจมากเกินไป

อาการ วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตามัว ใจสั่น ใบหน้าจะซีด มีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าผาก อาจล้มลงและหมดสติ (แต่ไม่มีอาการชัก) ชีพจรจะเบา หายใจแผ่ว ๆ

การบัจ จุบันพยาบาล

๑) เมอร์สลักเวียนศีรษะ หน้ามืด ต้องให้ผู้ป่วยนั่งลงสุดหายใจยาว ๆ ให้จับน้าเย็น ๆ บ้างเล็กน้อย

๒) เมอหมดสติ—

(ก) ให้อุปถัมภ์นอนลง

(ข) เปิดช่องเสื้อผ้าให้หลวม

(ค) ห้ามคนมุงดูรอบ ๆ

(ง) พัดให้อุณหภูมิเย็น

(จ) ให้อดมยาหอม ๆ หรือแอมโมเนียหอม

(ฉ) เช็ดเหงื่อตามมือ เท้า และหน้าผาก

(ช) ถ้าไม่ฟื้น ควรให้ความอบอุ่นและหายใจตลอด

ปรึกษาแพทย์

“ช็อค”

(SHOCK)

ช็อค เป็นอาการอย่างหนึ่ง ซึ่งเนื่องมาจากสาเหตุจากโรคหลายอย่างด้วยกัน ช็อคเป็นเพียงอาการของโรค แต่มีใช้ตัวโรคดังนั้นในการรักษา ควรรักษาโรคซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการนี้ไปด้วย แต่อย่างใดก็ตาม การปัจจุบันพยาบาลนั้นจำเป็นต้อง “รักษาช็อคก่อน” (Treat Shock first) อาการช็อคอาจเป็นชนิด ช็อคขั้นต้น หรือ ช็อคขั้นสอง (ดังได้กล่าวไว้ในเรื่องไฟไหม้และน้ำร้อนลวกมาแล้วครั้งหนึ่ง) แต่อาการก็คล้ายคลึงกันทุกอย่าง

สาเหตุ สาเหตุที่ทำให้ช็อคอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้;—

๑) พวบท่อนเพลียมาก ๆ หรือออกแรงมากเกินไป

๒) ความเจ็บปวดอย่างมากมาโดยสาเหตุใดก็ตาม

๓) การมีบาดแผลโตมาก หรือช็อคช้ำมาก ๆ

๔) เนื่องจากถูกความร้อนหรือความเย็นจัด ๆ

- ๕) การเสียน้ำจากร่างกายมาก หรือการตกเลือดมาก ๆ
- ๖) จากพิษของโรคต่าง โดยผู้ป่วยมีโรคอยู่ก่อนแล้ว
- ๗) ตื่นเต้น กลัว หรือตกใจมาก ๆ

อาการ—

- ๑) ใบหน้าชา
- ๒) เหียวออก ตัวเย็นชา
- ๓) กระสับกระส่าย
- ๔) คลื่นไส้ — อาเจียน
- ๕) ชีพจรเต้นเร็ว เบา และไม่สม่ำเสมอ
- ๖) ความดันโลหิตต่ำลงมาก
- ๗) หายใจเร็วหอบ — ตื้น
- ๘) อุณหภูมิจะต่ำ
- ๙) หหมดสติ

การปัจจุบันพยาบาล;—

- ๑) ถ้ามการตกเลือด ต้องทำการห้ามเลือดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
- ๒) ให้นอนยกขาให้สูงขึ้น ศีรษะต่ำลง เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้มากขึ้น
- ๓) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยการห่มผ้า, วางกระเป๋าน้ำร้อนหรือขวดน้ำร้อนตามร่างกาย
- ๔) ให้ดมน้ำชาหรือกาแฟดำร้อนอุ่นๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นหัวใจ

๕) บางครั้งแพทย์อาจสั่งฉีดมอร์ฟีน เพื่อระงับความเจ็บปวดและ

อาการกระวนกระวาย

๖) คอยนับชีพจรและหายใจทุก ๑๕ นาที

๗) ถ้ามีแผลตามแขนหรือขา ควรแต่งบาดแผลแล้วใส่เฝือกไม่ให้
 หักให้บริเวณนั้นอยู่นิ่ง เพราะถ้าปล่อยอยู่โดยไม่เข้าเฝือก บริเวณนั้นเคลื่อนไหวได้
 จะทำให้เกิดความปวดเจ็บของบาดแผลมากขึ้น

๘) ถ้าหยุดหายใจ ทำการผายปอด

๙) รีบนำส่งโรงพยาบาล โดยใช้เปลหาม

“เส้นเลือดในสมองแตก”

(Apoplexy or Cerebral Haemorrhage)

การมีเส้นเลือดในสมองแตก จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้มากโดยที่
 เลือดออกมาซึ่งอยู่ในเนื้อสมองนั้น จะกดดันเนื้อสมองและศูนย์ประสาท
 กลางในสมอง มักจะพบในคนสูงอายุ, โรคความดันโลหิตสูง หรือการมีโรค
 ของเส้นเลือดในสมอง

อาการ—

๑) มักให้ประวัติของการออกแรงทำงานมาก ๆ หรือนั่งนาน ๆ
 แล้วลุกขึ้นทันที ขณะลุกขึ้นนั้นความดันโลหิตจะสูงขึ้น ทำให้เส้นเลือดใน
 สมองแตกเพราะความดันในเส้นเลือดสูงขึ้น

๒) ผู้ป่วยจะล้มลงทันที และหมดสติไป

๓) ใบหน้าจะมึนแดง

๔) หายใจจะตัน และกรนเสียงดัง

๕) ชีพจรช้า แต่แรง

๖) ม่านตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง บางรายม่านตามีขนาดไม่เท่ากัน

๗) มีอัมพาตไปครึ่งซีก อัมพาตนั้นจะมครึ่งซีกของตรงกันข้ามกับซีกที่สมองที่เส้นเลือดแตก เช่น เส้นโลหิตในสมองซีกซ้ายแตกก็จะอัมพาตครึ่งซีกขวา โดยยกแขนขาไม่ขึ้น

การปัจจุบันพยาบาล:—

๑) รับนำส่งโรงพยาบาลโดยใช้เปลหาม

๒) ให้นอนหงายยกศีรษะให้สูงขึ้น เอาน้ำแข็งวางบริเวณศีรษะ

๓) คอยสังเกตตรวจชีพจรและหายใจ

๔) อย่าให้ยาบำรุงหัวใจแต่อย่างใด เพราะยาบำรุงหัวใจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เลือดในสมองยิ่งออกมากจนออก

๕) อย่าให้ดื่มน้ำหรืออาหารแต่อย่างใดเลย ในขณะหมดสติ เพราะอาจสำลักน้ำหรืออาหารลงในปอด

พวกนี้อาจฟื้นขึ้นภายใน ๒๔ ชม.—๓ วัน แล้วแต่เส้นเลือดที่แตกนั้นเป็นเส้นฝอยหรือเส้นใหญ่ๆ ถ้าเส้นใหญ่ๆ แตกมักไม่ฟื้นและทุกรายถ้าฟื้นแล้วมักมอัมพาตไปครึ่งซีก

“เม้าเหล้า”

เม้าเหล้า

(Alcohol)

อาการ—

๑) ใบหน้าแดง ริมฝีปากซีด

๒) ตาแดง

๓) ม่านตาขยาย และบางรายถ้าเมามาก ๆ ม่านตาจะไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง

๔) ผิวหนามเหงื่อชุม

๕) เดินโซเซ และงุนงง

๖) ไม่มีสติสัมปชัญญะ

๗) บางรายอาจมีชักแล้วสลัด

การบำบัดนั้นพยาบาล.—

๑) ต้องให้อาเจียนออกโดยใช้นิ้วล้วงคอให้อาเจียน หรืออาจใส่สายยางลงไปในกระเพาะอาหาร แล้วล้างกระเพาะอาหาร

๒) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยห่มผ้าหรือวางขวดน้ำร้อน

๓) ลูบบริเวณหน้าผากและศีรษะด้วยน้ำเย็น หรือน้ำเจอน้ำไอติโคโลนจ์อ่อน ๆ

๔) ถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวบ้าง ให้ดื่มกาแฟดำร้อนชงแก่ ๆ ถ้าไม่รู้สึกตัวอาจต้องฉีดยาพวาคาเฟอีน (Cafeine)

๕) รายที่เมามากหมดสติมากแก้ไข้พ่น ควรส่งโรงพยาบาล

“ลมแดด”

(Sun - Stroke)

สาเหตุ— ลมแดดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการอยู่ในกลางแจ้งและถูกแสงแดดอยู่เป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะบริเวณศีรษะหรือส้นหลัง การดื่มเหล้ามากเกินไปเวลาอากาศร้อน ๆ ช่วยให้เกิดลมแดดได้ง่าย

อาการ— คล้ายๆ กับเป็นลม จะมีคลื่นไส้อาเจียน กระจายน้ำ
มาก ตาแดง ผิวหน้าจะแห้ง และตัวร้อน ถ้าวัดอุณหภูมิตัวอาจมีไข้ถึง ๓๐.๕
ดีกรีฟาเรนไฮต์ การหายใจหอบถี่

— ม่านตา ตอนแรกๆ จะหดตัว แต่ตอนหลังขยายตัว

— ชีพจร เร็วมากและเบา

— อาจมีอาการชัก แล้วหมดสติ

กาจปัจจุบันพยาบาล

- ๑) ให้ผู้ป่วยนอนหงาย ยกศีรษะและไหล่ให้สูงขึ้น
- ๒) ให้อยู่ในที่ร่ม โปร่ง และลมพัดเย็นสบาย
- ๓) ปลดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้หลวม
- ๔) ใช้น้ำเย็นราดบริเวณศีรษะ คอ และลำตัว
- ๕) เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัว อุณหภูมิของร่างกายลดลง ตัวเย็นลง ให้
นำผู้ป่วยมานอนบนเตียงและห่มผ้าให้ความอบอุ่น
- ๖) ถ้าหยุดหายใจ ต้องทำการหายใจ
- ๗) ถ้ารู้สึกตัวบ้าง ให้ดมน้ำชา กาแฟดำแก่ๆ และร้อนๆ

“ ลมร้อน ”

(Heat - Stroke)

สาเหตุ— อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเมื่อบรรยา
การค่อนข้างชื้น ทำให้การระบายความร้อนจากร่างกายได้น้อย การสวม
เสื้อผ้าหนาเกินไปในอากาศร้อนๆ มักพบในคนที่อ่อนเพลีย หัวใจอ่อน
และท้องผูกอยู่ก่อนแล้ว

อาการ—

- ๑) ใบหน้าและผิวหนังซีด
- ๒) ตัวเย็น
- ๓) อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
- ๔) ชีพจรเร็ว เบา
- ๕) หหมดสติ

การบำบัดรักษาพยาบาล;—

ทำการรักษาคล้าย ๆ กับช็อค ควรให้ความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา
(ดูเรื่องช็อค)

“ลมบ้าหมู” (Epilepsy)

โรคลมบ้าหมู มักจะให้ประวัติเป็นมาหลายครั้งแล้ว จะมีอาการชัก
ก่อน แล้วจึงหมดสติ

อาการ— ตัวผู้ป่วยเองซึ่งเคยชักมาก่อน มักจะรู้สึกตัวเองก่อนว่า
ตนจะชัก มีอาการบอกล่วงหน้าประจำตัว เช่น มีเสียงดังในหู, ตามอง
กลม ๆ พร่า ๆ ฯลฯ เมื่อมีอาการบอกล่วงหน้าเช่นนั้นแล้ว ต่อมากจะชัก
มักจะร้องก่อนด้วยเสียงอนดัง แล้วล้มลงชักกระตุก กล้ามเนื้อแข็ง มือกำ
แน่น เท้าเหยียดแข็ง ขากรรไกรกัดและเคลื่อนไหวไปมา การชักอาจมีไปทั้ง
ตัว ใบหน้าสีเขียวคล้ำ อาจถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาโดยไม่รู้ตัว
น้ำลายฟูมปาก เวลาล้มลงชักอาจเกิดบาดแผลบริเวณศีรษะที่ฟาดกับพื้น
เวลาชักอาจกัดลิ้นตนเองเป็นแผลมเลือดออก ถ้าดูใบหน้านักจะเห็นลูกตา

กลอกไปมา ชักอยู่ ๒-๓ นาทีหยุดชัก กล้ามเนื้อจะหย่อนตัว ผู้ป่วยจะหมดสติหลับแน่นิ่งไป กรนเสียงดัง ใบหน้าค่อย ๆ มีสีแดงจนเมื่อฟื้นรู้สึกตัวขึ้น มักปวดศีรษะมาก

การปัจจุบันพยาบาล;—

เวลาชัก— คอยจับตัวและศีรษะไว้เพื่อกันไม่ให้ได้รับอันตราย เช่น ตกเตียงหรือศีรษะฟาดพื้น หรือเกิดบาดแผลขึ้น หายา, ตามช่อง หรือของแข็ง งดเข้าระหว่างฟื้น เพื่อกันกดลิ้นตนเอง

เมื่อหยุดชัก— ให้ได้นอนพักผ่อน อย่าปลุกหรือเรียกให้ตื่นอย่าให้ดื่มน้ำหรือกินอาหารในขณะที่ชักหรือยังไม่รู้สึกตัว ต้องคอยเฝ้าอยู่จนกว่าจะฟื้น เพื่อดูว่าจะมีอาการชักซ้ำหรือไม่

“ มึนตมองกระเทือน ”

(Brain Concussion)

สาเหตุ— มักเนื่องจากถูกตีศีรษะ หรือล้มและศีรษะฟาดพื้น

อาการ— มักมึนงง หมดสติ บางครั้งอาจฟื้นขึ้นแล้วกลับ สับสนไป สลับกัน ชีพมึน ในหน้ามืด ตัวเย็น หายใจหอบแผ่วเบาชีพจรเบาเร็ว ไม่มีอัมพาต บางรายอาจเพ้อ ตื่นนอนกระสับกระส่าย บางรายมีคลื่นไส้อาเจียน ม่านตายังคงมีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง

(ควรตรวจหาว่ากระโหลกศีรษะแตกหรือไม่)

การปัจจุบันพยาบาล;—

๑) เตรียมผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยใช้เปลหาม

๒) ให้ผู้ป่วยนอนหงาย เอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง (แต่ไม่ใช่ด้านที่มีบาดแผลของศีรษะ) นอนให้ศีรษะต่ำ ถ้ามีบาดแผลที่หน้าซีกแต่ถ้ากลับมีบาดแผลที่หน้าซีก ให้นอนยกศีรษะสูงขึ้น

๓) ถ้ามีบาดแผลบริเวณศีรษะ ควรชะล้างและแต่งบาดแผลเสียก่อน

๔) ถ้ามีตกเลือด ควรห้ามเลือดเสียให้หยุด

๕) ห้ามผ่าหรือวางขวดนาร้อนตามร่างกายให้ความอบอุ่น

๖) บริเวณศีรษะว่างก่อนหรือถ่วงน้ำแข็ง

๗) อย่าให้ยาบำรุงหัวใจ

๘) อย่าให้อาหารหรือน้ำดื่ม ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกรับ

๙) การปัจจุบันนี้ จะคล้ายคลึงกับในรายการะโหลกศีรษะแตก ซึ่งจะ

ได้กล่าวในบทต่อไป

“มันสมองถูกกด”

(Brain Compression)

มักเกิดมชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับถูกตีบริเวณศีรษะ มีกระโหลกศีรษะแตก และกระดูกที่แตกนั้นแหลมตำหรือฝังลงไปในส่วนสมอง สมองเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการบังคับบัญชาร่างกายเมื่อถูกกด เช่นนั้นก็จะเกิดอาการขึ้น นอกจากนี้อาจเกิดขึ้นในรายที่เลือดซึ่งในสมอง เลือดนั้นก็จะกดต่อสมองเหมือนกัน

อาการ— ใบหน้ามีสีแดง ชีพจรช้าแต่แรง หายใจลึก ช้ากรน

อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น (มีไข้) ม่านตามักมีขนาดไม่เท่ากัน อาจมีม่าน

พาดครึ่งซีก

การบ่งจวบ็นพยาบาล;—

เช่นเดียวกับในรายมนั้สมองกระเทือน และกระโหลกศีรษะแตก
(ในบทที่ ๖)

“ ยูเรเมีย ”

(Uremia)

ยูเรเมีย — เป็นอาการของโลหิตเป็นพิษขึ้น เพราะมีของเสียในร่างกาย
กายอยู่ในเลือดมาก เนื่องจากไตไม่สามารถจะขับออกทั้งได้จะพบในผู้ป่วย
ที่เป็นโรคไตอักเสบเรื้อรัง หรือทางเดินปัสสาวะถูกอุดตันโดยสาเหตุใดก็
ตาม เช่น นิ่ว หรือต่อมลูกหมากโตขึ้น

อาการ— เริ่มต้นด้วยอาการปวดศีรษะ เวลาที่หมดสติอาจปลุก
แล้วรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้ ม่านตาหดตัวเล็กน้อย ผิวหนังแห้ง ซพจรแรง
อาจมีชกเป็นพัก ๆ ลิ้นหนาและผ้า หายใจมักกลิ่นเหม็นเหมื่อนกลิ่นปัสสาวะ
การบ่งจวบ็นพยาบาล;—

ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และรีบนำส่งโรงพยาบาล

“ คนจมน้ำ ”

(Daowning)

คนจมน้ำ ตอนแรก ๆ จะล้าล็กน้ำ และดมน้ำเข้าจนเต็มกระเพาะ
อาหาร ตอนหลังจะมีน้ำเข้าไปเต็มหลอดลมและปอด ทำให้มีอาการของ
การหายใจขัด (Asprhyxia ซึ่งจะกล่าวต่อไป)

และตาย

二二

- ๑) ทำการเอาน้ำออกจากกระเพาะอาหารและปอด มีต่างกันหลายวิธี
 - ก) ใช้หลอดคอให้อาเจียนออก
 - ข) จับแบกพาดบ่า ให้บริเวณท้องอยู่บนบ่า ศีรษะอยู่และห้อยไปทางด้านหลัง พาวัง ช่วยเขย่าให้น้ำออก
 - ค) ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ ผู้พยาบาลยืนคร่อมผู้ป่วยตรงระดับตะโพก ให้นำหน้าไปทางศีรษะผู้ป่วย กดตัวลงใช้มือทั้งสองจับบริเวณใต้ชายโครงทั้งสองข้างของผู้ป่วย ยกขึ้นและวางลงสลับกันโดยวิธีนี้จะออกได้ทางปากและจมูก เมื่อน้ำออกเช่นนี้ผู้ป่วยจะเริ่มหายใจบ้าง
 - ๒) ลงมือทำการฉายปอดเมื่อผู้ป่วยเริ่มหายใจ
 - ๓) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
 - ๔) เมื่อพ้นหรือรู้สึกตัว ให้จับกาแฟดำหรือบรอนด์เล็กน้อยเพื่อช่วยกระตุ้นหัวใจ
 - ๕) หมั่นเช็ดตัวผู้ป่วยให้แห้ง
 - ๖) ถ้ายังไม่ฟื้น อย่าให้ยาบำรุงหัวใจ
 - ๗) ถ้ายังไม่ฟื้น อย่าเลิกให้การช่วยเหลือ การฉายปอดควรกระทำต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะฟื้น และหายใจสะดวกอย่างปกติ
 - ๘) ส่งโรงพยาบาล

“หายใจขัด”

(Asphyxia)

การหายใจขัด เป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากปอดได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เพราะมีการอุดตันทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินหายใจทำงานไม่เต็มที่ โดยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

สาเหตุ—

๑) เนื่องจากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอุดตันหลอดลม เช่น น้ำ (ในรายที่จมน้ำ) เลือด (รายที่เป็นแผลในปอดเช่นทุกทางทะลุปอด) หรือของบางอย่าง เช่น เมล็ดผลไม้, สตางค์, กระจุม ฯลฯ ตกลงไปอุดตัน

๒) การถูกแก๊สพิษ

๓) การมีอัมพาตของกระบังลม หรือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกระบังลม หรือกล้ามเนื้อทรวงอกที่เกี่ยวข้องกับการหายใจตัวอย่างเช่นพิษของโรคคอตีบ (Diphtheria) โรคโปลิโอ

๔) การแพ้ยาบางชนิด เช่น มอร์ฟีน, ฝิ่น, ยาสลบ ซึ่งพิษของยานั้นไปกดศูนย์ประสาทของหัวใจในสมอง

๕) เมื่อมีอาการช็อคจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

อาการ— มีเป็นระยะ ๆ ดังต่อไปนี้—

๑) หายใจขัด กระสับกระส่าย หุนหุน

๒) หยุดหายใจ และหมดสติ

๓) ใบหน้าเขียวคล้ำ และตอนสุดท้ายดำ

๔) หัวใจหยุดเต้น และตาย

การปัจจุบันพยาบาล:—

- 3) พยายามทำลาย หรือเอาสาเหตุที่ทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจออก
- ๒) ปลดเปลื้องเสื้อผ้าให้หลวม ให้นอนในที่อากาศโปร่งลมพัดเย็นสบาย
- ๓) ลงมือทำการผายปอด
- ๔) ถ้ามการตกเลือด ควรห้ามเลือดเสีย (เพราะในขณะหายใจขัดอาจเป็นสาเหตุให้เลือดออกน้อย แต่พอการหายใจดีขึ้นอาจมีตกเลือดออก)
- ๕) ให้ความอบอุ่น และรักษาอย่างช็อค
- ๖) ส่งโรงพยาบาล

“การผายปอด”

(Artificial Respiration)

การผายปอด เป็นวิธีปฏิบัติการปัจจุบันพยาบาล เพื่อความประสงค์ที่จะให้ปอดได้รับออกซิเจนได้เพียงพอแก่ความต้องการผายปอดจึงเป็นวิธีการนำบทพิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งการจะทำให้ได้ผลต้องรู้จักวิธี และได้เคยฝึกปฏิบัติมาจนเคยชินและเข้าใจแล้ว

หลักทั่ว ๆ ไปที่จะต้องคำนึงเวลาทำการผายปอด

- ๑) เวลาทำการผายปอด จะต้องทำช้า ๆ หนักแน่นคล้ายกับคนปกติหายใจ แต่ไม่ทำอย่างรุนแรงหรือรวดเร็วเกินไป
- ๒) ให้จำนวนครั้งที่ทำการผายปอดนั้น เท่ากับระยะของการหายใจของคนปกติ เช่นในเด็ก ๒๐ ครั้งต่อนาที ผู้ใหญ่ ๑๒ - ๑๖ ครั้งต่อนาที

๓) ไม่ควรหยุดทำการฉายปอด เมื่ออาการของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น หรือจนกว่าจะแน่ใจจริงๆ ว่าผู้ป่วยตายแล้ว

๔) ถึงแม้ว่าอาการหายใจของผู้ป่วยจะเป็นปกติแล้วก็ตามควรเผื่อใจต่อไปจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้น และเมื่ออาการเป็นปกติแล้ว อย่าทอดทิ้งผู้ป่วยไปเสียก่อน

๕) ในระหว่างทำการฉายปอดอยู่นี้ ถ้าเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นเลย ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

วิธีการฉายปอดที่ปฏิบัติกันมีหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่นิยมวางง่าย และสะดวกนั้นมี ๒ วิธี คือ วิธีของแซฟเฟอร์ และวิธีซิลเวสเตอร์

วิธีของแซฟเฟอร์ (Schafer's Method)

ก่อนลงมือฉายปอด เปิดองศาเครื่องnungหมบริเวณคอหน้าอก และท้องให้หลวม จับไหล่ผู้ป่วยนอนคว่ำ จับศีรษะผู้ป่วยให้เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ใช้มือข้างหนึ่งเป็นตัวหนุนรองศีรษะ (เช่นเอียงหน้าไปด้านขวา ก็ใช้มือซ้ายหนุนศีรษะ) ส่วนอีกมือหนึ่งจับให้เหยียดตรงขึ้นไปด้านศีรษะ

ผู้ทำฉายปอดนั่งคุกเข่าลงข้างๆ ตัวผู้ป่วย ข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ แล้วก้มตัวหันหน้าไปทางด้านศีรษะผู้ป่วย แบ่มือทั้งสองวางทาบลงทแยงโครงทงสองข้างของผู้ป่วย เมื่อกดฝ่ามือทั้งสองลงไปบนชายโครงของผู้ป่วย พร้อมกับผู้ที่ทำโนนตัวลงไปข้างหน้า การทำเช่นนี้เป็นการกดไล่ให้อากาศและของต่าง ๆ ในปอดและหลอดลมออกมา เมื่อผู้ทำโนนตัวกลับพร้อมกับยกมือขึ้น ทรวงอกจะกลับคนรูปเพราะไม่ถูกกด ทำให้อากาศบริสุทธิ์

ผ่านเข้าสู่ปอดใหม่ เป็นการหายใจเข้า กระทำสลับกันเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปตามจังหวะของการหายใจของคนปกติ

วิธีของเซฟเฟอร์นั้นมักใช้กันมากเพราะได้ “ผลดี” ดังต่อไปนี้ คือ:—

- ๑) ทำได้ง่าย ไม่ต้องการผู้ช่วย
- ๒) ออกแรงเพียงเล็กน้อย
- ๓) ไม่มีอันตรายต่ออวัยวะภายใน
- ๔) ลิ้นผู้ป่วยไม่ค่อยตกไปในคอ ซึ่งทำให้ไปอุดทางหายใจ
- ๕) การหายใจเข้าหรือออกได้มาก เป็นไปตามแรงกดที่ผู้ทำโน้มตัวลงไปมากหรือน้อย ทำให้อากาศเปลี่ยนเข้าออกได้มาก
- ๖) บรรดาของตกกลงไปอุดหลอดลม เช่นน้ำจะออกจากปอดได้ดี

วิธีของซิลเวสเตอร์ (Silvester's Method)

จับผู้ป่วยให้อยู่หงาย ปล่อยให้ศีรษะและแขนงอให้หลวมใช้หมอนหรือผ้าม้วนใหญ่กลมสอดเข้าใต้ไหล่ เพื่อให้ศีรษะต่ำและคอแหงนขึ้น จับใบหน้าผู้ป่วยให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง จับปลายลิ้นของผู้ป่วยดึงออกมาแล้วให้ผู้ช่วยจับไว้ เพื่อกันไม่ให้ลิ้นตกไปในลำคอไปอุดทางหายใจ

ผู้ทำนั่งคุกเข่าเหนือศีรษะผู้ป่วย หันหน้าไปทางด้านเท้าของผู้ป่วย จับข้อศอกของผู้ป่วยให้พับ ยกขึ้นเล็กน้อย แล้วดันข้อศอกที่พับนั้นกดลงทแยงโครงทรวงสองข้าง ในเวลาที่ถูกกดลงไปผู้ทำโน้มตัวตามลงไปด้วย วิธีนี้จะเป็นการทำให้ผู้ป่วยหายใจออก เมื่อยกข้อศอกผู้ป่วยขึ้นพร้อมกับผู้ทำโน้มตัวกลับ จะเป็นการทำให้ผู้ป่วยหายใจเข้า ทำสลับกันเช่นนี้ตามจังหวะของการหายใจของคนปกติธรรมดา

ผู้ป่วยตาย — จะมีอาการอย่างไร ?

เป็นปัญหาอยู่มากกว่าผู้ป่วยนั้นตายหรือยัง เพื่อจะได้ให้การพยาบาลต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม อย่างนี้กว่าผู้ป่วยนั้นตายแล้ว ควรให้การพยาบาลต่อไปจนถึงที่สุด ผู้ป่วยที่ตายแล้วจะมีอาการดังนี้:-

๑) ไม่มีการหายใจ ทรวงอกไม่เคลื่อนไหว ไม่มีเสียงลมผ่านเข้าออกที่จมูก ถ้าใช้ลำโพงไวที่จมูกลำโพงจะไม่ไหวตัว และถ้าวางกระจกเงารอไวที่จมูก จะไม่มีไอน้ำมาเกาะที่กระจก

๒) หัวใจหยุดเต้น ชีพจรไม่เต้น เอาหูแนบที่ทรวงอกเบื้องซ้าย บริเวณหัวใจ จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้น

๓) เปลือกตาปิดไม่สนิท ม่านตาขยาย ไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง และตาขุ่นมัว

๔) ผิวหนังจะเย็นและซีด

บทที่ ๖

“ข้อเคล็ด - ข้อเคลื่อน - และกระดูกหัก”

(Sprain - Dislocation and Fracture)

“ข้อเคล็ด”

(Sprain)

“ข้อเคล็ด” หมายถึงการที่ข้อมการเคลื่อนที่มากเกินไปทำให้ส่วนเนื้ออ่อนต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ข้อ เช่นเยื่อหุ้มข้อ เอ็นรอบ ๆ ข้อ หรือกล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาด

มักพบได้ทั่วข้อใด ๆ ก็ตาม แต่ส่วนมากมักพบว่าข้อเท้าเคล็ดเป็นส่วนมาก

สาเหตุ— เนื่องจากข้อนั้นถูกบิด พลิก หรือแพลงไป ตกหรือพลัดจากที่สูง

อาการ—

- ๑) บริเวณข้อนั้นจะบวม และร้อน
- ๒) เจ็บปวดมาก และถ้ากดดูยิ่งเจ็บมากขึ้น
- ๓) ให้ทำการเคลื่อนไหว ข้อนั้นจะทำได้ เพราะเจ็บ
- ๔) อาจเกิดอาการชาไปทั่วบริเวณนั้น แสดงว่าอาจมีเส้นประสาท

ถูกฉีกขาดไปด้วย

การปัจจุบันพยาบาล;—

- ๑) ให้ส่วนนั้นอยู่นิ่ง โดยไม่ใช่ขอนั้น ๆ
- ๒) บริเวณมือหรือเท้าควรยกให้สูงขึ้น และถ้าเป็นข้อมือควรให้
ห้อยแขวนนวดด้วยผาคลงคอ
- ๓) ให้ประคบน้ำร้อน หรือนวดเบา ๆ ด้วยน้ำมันสะโตกหรือน้ำมันระกำ
- ๔) อาจต้องเข้าเฝือกเพื่อให้ขอนั้นได้พักนิ่งที่สุด จะทำให้หายเร็ว
ยิ่งขึ้น
- ๕) ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจให้แน่นอนว่าไม่มีกระดูกหักร่วม
อยู่ด้วย

“ข้อเคลื่อน”

(Dislocations)

ข้อเคลื่อน— “หมายถึงปลายหรือหัวกระดูกที่ประกอบขึ้นเป็นข้อ
นั้น หลุดออกไปจากที่มันอยู่ตามปกติ”

สาเหตุ—

- ๑) เป็นมาตั้งแต่เกิด
- ๒) เนื่องจากมีโรคที่ขอนั้นอยู่ก่อน เช่น วัณโรคที่ข้อตะโพก ซึ่ง
วัณโรคจะทำลายเบ้ากระดูกข้อตะโพกให้ตันเข้า และหัวกระดูกต้นขา
เล็กลง อาจหลุดออกจากกันได้
- ๓) เนื่องจากกำลังแรงจากอุบัติเหตุ เช่น ถูกกระชากเต็มแรง
หกล้ม ฯลฯ

อาการ—

- ๑) ขอนนจะบวมรอบ ๆ และปวดมาก
- ๒) ขอนนจะผิดรูปร่างไปกว่าข้างที่ดี
- ๓) เคลื่อนไหวขอนนไม่ได้
- ๔) ความยาวของแขนหรือขาข้างนั้น อาจจะสั้นหรือยาวกว่าปกติ
- ๕) อาจฉีกปลายหรือหัวกระดูกที่หลุดออกมานั้นได้

การปัจจุบันพยาบาล;—

- ๑) อย่าพยายามดึงให้เข้าที่
- ๒) ประคบร้อนหรือน้ำแข็ง เพื่อลดอาการบวมและลดความเจ็บ

ปวดลง

- ๓) ส่วนนั้นอยู่นิ่งที่สุด
- ๔) รับส่งโรงพยาบาล การทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้การดึงเข้าที่ได้ลำบาก และถ้านานเกินควรอาจต้องใช้การผ่าตัด ซึ่งยุ่งยากและลำบากมาก

“กระดูกหัก”

(Fracture)

กระดูกหักเป็นโรคที่มีปัญหาในการรักษาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปัจจุบันพยาบาล เพราะการปัจจุบันพยาบาลที่ถูกต้องจะทำให้กระดูกติดกันได้เร็ว และกลับคืนได้เป็นปกติภายหลังที่ได้รับการปฏิบัติรักษาอันถูกต้องของแพทย์ต่อไป

ขอให้เราลองนึกดูว่า บุคคลที่ล้มเจ็บไปมาและผู้ทรมานชวดอยู่อย่าง

แสนทรมานในสังคมต่าง ๆ อยู่นั้น อาจมีผู้ทรมานโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยหลายประ-

เกาด้วยกัน ซึ่งเราไม่อาจทราบได้เมื่อเพียงแต่เห็นร่างกายภายนอกของเขา
 ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น วัณโรคของปอด แผลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ
 เขาเหล่านั้นอาจไปไหนมาไหนได้ดังเช่นคนปกติ ยังอาจประกอบอาชีพได้
 และยังสามารถสนุกสนานอยู่ในสังคมได้ แต่ผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกหักบาง
 รายนั้น แม้กระดูกจะติดกันดีแล้ว กระดูกก็อาจติดกันผิดรูปไปจากเดิม
 โค้ง งอ คด หรือสั้นกว่าธรรมดา บางรายเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องถึง
 ระยะตัดแขนหรือขาบางส่วนเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้ โดยกระดูกที่หักนั้นทับตำ
 แขนหรือขาออกมาให้เกิดแผลภายนอก แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้หรือรักษากัน
 เองจนแขนหรือขานั้นเน่าไป และลุกลามไปทั้งแขนหรือขาถึงแม้จะรอดตาย
 มา เขาก็เป็นผู้ทุพพลภาพและมีปมด้อยอยู่ในใจ ยิ่งกว่านั้นผู้ป่วยจากกระดูก
 สันหลังหัก ได้รับการพยาบาลมาอย่างผิด ๆ เขาอาจมีอัมพาตไปครึ่งตัว
 ท่อนล่าง เขาจะหาเลี้ยงชีพหรือเขาสังคมอย่างไร เขาได้แต่รอวันตายซึ่งนับ
 วันแต่จะยิ่งใกล้เข้ามาทุกที ๆ บุคคลเหล่านั้นควรเป็นบุคคลที่น่าสงสารอยู่มาก
 ฉะนั้น การปัจจุบันพยาบาลจึงนับว่าสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้วิชา
 ความรู้ และมีหลักเกณฑ์ พร้อมกับมีปฏิภาณด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึง
 เรื่องกระดูกหักให้ละเอียดบ้างเล็กน้อย

สาเหตุ — สาเหตุที่ทำให้กระดูกหัก อาจเนื่องจาก

๑) เนื่องจากความแรง (Trauma)

(ก) แรงมาถูกกระดูกนั้นโดยตรง (Direct) กระดูกจะหักในตำแหน่งที่ถูกแรงนั้น

(ข) แรงมาถูกกระดูกโดยทางอ้อม (Indirect) คือกระดูกนั้นจะหัก

ในตำแหน่งอื่นที่ห่างมาจากตำแหน่งที่ถูกแรงมากระทบ เช่น เวลาหกล้มใช้
มือนยันพนักในท่าเขนเหยียดตรง ทำให้กระดูกไหปลาร้าหัก

(ค) เนื่องจากกล้ามเนื้อกระดูกหรือหูดตัวเต็มแรง

เนื่องจากมีโรคที่กระดูกนั้นอยู่ก่อนแล้ว โดยการมีพยาธิวิทยา

อยู่ทกระดูกนั้นก่อน เช่น โรคกระดูก โพรงกระดูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic-
Osteomyelitis) เนื้องอกของกระดูก (Sarcoma) ทำให้กระดูกนั้นเปราะ เมื่อ
ออกแรงหรือถูกแรงเพียงเล็กน้อยก็หักได้ง่าย การหักของกระดูกเช่นนี้เรียก
ว่า "Pathological Fracture" (หักเนื่องจากกระดูกมีพยาธิสภาพ)

รูปร่างลักษณะของกระดูกหัก

กระดูกหักอาจมีรูปร่างต่าง ๆ กัน และมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน

ดังนี้:—

๑) หักออกจากกัน (Complete Fracture) อาจมีรูปร่างดังนี้:—

ก) หักอย่างธรรมดา (Simple) แล้วปลายหักยังประสานกันอยู่

(Impacted) คือกระดูกนั้นหักออกเป็น ๒ ส่วน ปลายหักนั้นชนกันอยู่ใน
แนวเดิม

ข) หักมีบาดแผล (Compound Fracture)

คือกระดูกนั้นหักและมีทางติดต่อกับผิวหนังภายนอก โดยปลายกระดูก

หักที่หักปลายใดปลายหนึ่งตำทะลุออกมา หรืออาจุชอย่างอื่นหรือเศษไม้ตำ
ทะลุเข้าไปถึงกระดูกหักนั้น

ค) หักละเอียด (Comminuted Fracture)

คือกระดูกนั้นหักหรือแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ง) หักมีอาการอื่นแทรก (Complicated Fracture)

คือกระดูกนั้นหักแล้วปลายกระดูกที่หักแทงทะลุเข้าไปใน อวัยวะภายในที่สำคัญ ๆ เช่น กระดูกซี่โครงหัก แล้วปลายหักนั้นตำเข้าไปในปอด หัวใจ ตับ หรือเส้นเลือด ฯลฯ

๒. ไม่หักขาดจากกัน (Incomplete Fracture)

ก) กระดูกร้าว (Fissure Fracture)

จะพบได้บริเวณกระดูกโหลกระดูกซี่โครงหรือกระดูกท่อนยาว ๆ

ข) กระดูกเดาะ (Green Stick Fracture)

คือกระดูกนั้นหักเพียงบางส่วน มีลักษณะคล้าย ๆ กับเราหักกิ่งไม้สด ๆ จะไม่หักขาดจากกัน กระดูกอาจโค้งตรงรอยหัก

ค) กระดูกบุบ (Depressed Fracture)

คือกระดูกหักนั้นมรรอยบุบลงไป ถ้าเป็นที่กระดูกซี่โครงกระดูกที่บุบลงไปอาจกดลงบนเนื้อสมอง เกิดอาการร้ายแรงขึ้นได้มาก

อาการทั่ว ๆ ไปของกระดูกหัก

กระดูกที่หักอาจไม่มีอาการ และลักษณะดังที่จะกล่าวต่อไปทั้งหมดไปทุกข้อ แต่อาการต่อไปนี้เป็นอาการทั่ว ๆ ไปเท่านั้น การหักของกระดูกแต่ละตำแหน่ง และลักษณะของการหักนั้นย่อมทำให้มีอาการแตกต่างกันไปได้

ก. อาการทั่วไป

๑) อาจมีอาการช็อค

๒) มีอาการของการตกเลือด

๓) มีไข้

ข. อาการเฉพาะตำแหน่งที่หัก

๑) บริเวณกระดูกที่หักจะเจ็บปวดมาก และถากดตำแหน่งนั้นยิ่ง

ทำให้เจ็บปวดมากขึ้น

- ๒) บริเวณนั้นจะบวม ร้อน
- ๓) ถ้าจับกระดูกนั้นโยนหรือบิดไปมาจะมีเสียง “กรอบแกรบ” (Crepitus) เนื่องจากปลายกระดูกที่หักนั้นฉีก-เสียดสีกัน
- ๔) กระดูกนั้นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น มีรูปร่างลักษณะ คลายคลึงกับมขอทตาเห่งนั้น
- ๕) ทำการเคลื่อนไหวส่วนนั้นไม่ได้ คือส่วนนั้นทำหน้าที่อย่างปกติไม่ได้
- ๖) ส่วนนั้นมีรูปร่างผิดปกติไป อาจสั้น ยาว หรือโค้งโค้งผิดไปจากปกติ
- ๗) อาจมีบาดแผล และพบปลายกระดูกโผล่ออกมาให้เห็นได้

ความมุ่งหมายของการปัจจุบันพยาบาล:— ก็เพื่อ

- ๑) ช่วยให้ผู้ป่วยที่กระดูกหักได้รับอันตรายให้น้อยที่สุด
- ๒) เพื่อนำผู้ป่วยส่งไปรักษายังโรงพยาบาลทันที ด้วยวิธีถูกต้อง

หลักเกณฑ์ในปัจจุบันพยาบาลโรคกระดูกหักโดยทั่วไป

ในเมื่อพบผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากกระดูกหัก ควรมีหลักอยู่ในใจเสมอ ว่า:—

- ๑) โรคกระดูกหักเป็นโรคที่จะต้องรักษาอย่างทันด่วนที่สุด
- ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วย เพียงแต่สงสัยว่ากระดูกหักแล้ว ควรรีบนำส่ง

โรงพยาบาลทันที อย่าคิดว่ากระดูกนั้นไม่หัก เพราะการพิจารณา การตรวจ และการรักษา เป็นหน้าที่ของแพทย์

๒) โรคกระดูกหัก เป็นโรคที่ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะโรคกระดูก

อย่ามัวหลงเชื่อว่าการรักษากระดูกหักนั้น จะหายได้ด้วยวิธีนวด การทาน้ำมันนวด การเสกเป่าคาถา การสับเคาะกระดูก ฯลฯ ซึ่งถ้าบังเอิญกระดูกนั้นไม่ได้หักเลย เพียงแต่เคล็ดหรือแพลงเพียงเล็กน้อย หรือกระดูกหักเพียงเดาะ ร้าว หรือไม่ขาดออกจากกัน กระดูกก็อาจติดเองโดยธรรมชาติ เป็นการช่วยโฆษณาสนับสนุนการกระทำเช่นนั้น แต่ถ้าโรคกระดูกหักนั้นไม่ติด หรือติดแต่ผิดรูปร่างหรือใช้งานไม่ได้ เกิดทุพพลภาพไปตลอดชีวิต ผู้หลอกลวงนั้นจะไม่ยอม “รับผิดชอบ” เลย หากแต่เป็นผู้ยอม “รับชอบ” ถ้างบเอิญหายเท่านั้น

๓) ถ้ามีอาการเป็นลมสลบหรือช็อค ควรรักษาให้ฟื้นเสียก่อน

๔) ถ้ามีอาการตกเลือด ต้องทำการห้ามเลือดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเท่าที่จะทำได้

แต่ไม่ควรลืมนักถึงทุนเก็ต (กล่าวไว้ในบทที่ ๑)

๕) การจับต้องหรือจะตรวจบริเวณที่หัก ต้องทำด้วยความระมัดระวัง อย่าทำรุนแรงเกินไป

การทำรุนแรงเกินไป อาจทำให้กระดูกที่หักประสานกันได้อยู่บนเคลื่อนไหวของมันมาเกยกันหรือห่างจากกัน หรือทำให้ปลายตำทะลุออกมาภายนอก และกระดูกที่ไม่หักขาดจากกันอาจขาดออกจากกันได้ กลายเป็นว่ากระดูกนั้นหักไม่ขาดจากกัน แต่เรากลับไปหักให้มันขาดออกจากกันเสีย

๖) เวลาต้องการจะถอดเสื้อมานั้นออก ควรใช้ดัดทงหรือเลาะตะเข็บออก อย่าพยายามให้ผู้ช่วยถอดเอง เพราะจะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่ง

๗) ถ้ามีบาดแผลอยู่ควรชำระล้างให้สะอาด แต่อย่าล้างเข้าไปในแผล ถ้ามีปลายกระดูกโผล่ออกมา อย่าพยายามดันให้กลับเข้าที่ ปิดแผลนั้นและพันด้วยผ้าทาสะอาดเท่านั้นพอ

๘) พยายามให้การปัจจุบันพยาบาล และเข้าเฝือกให้ถูกต้องและรวดเร็ว

๙) รับประทานอาหารโดยด่วน ด้วยวิธีถูกต้อง

เฝือก:— เฝือกที่ใช้กันมีหลายชนิด

๑) เฝือกธรรมชาติ— คือใช้กระดูกที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่หักเป็นเฝือกชั่วคราว เช่นกระดูกต้นแขนหัก ใช้ทรวงอกเป็นเฝือกพันให้ต้นแขนนั้นแนบกับลำตัวไว้

๒) เฝือกสำเร็จ— คือเฝือกที่ทำไว้แล้ว อาจเป็นไม้หรือเหล็กก็ตาม

๓) เฝือกชั่วคราว— คือเฝือกที่ทำขึ้นจากวัสดุใกล้เคียงเท่าที่จะหาได้ง่าย ๆ ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น แผ่นกระดาน ไม้บันทัด ไม้ถือ คันร่ม ด้ามไม้กวาด หรือกิ่งไม้ก็ได้

ในการใช้เฝือกนั้น ก่อนจะวางเฝือกลงบริเวณอวัยวะกระดูกหัก ควรวางสำลี (หรือผ้า) เอาไว้บนอวัยวะนั้นก่อนตลอดแนวเฝือก เพื่อเป็น

การป้องกันไม่ให้เปลือกกดลงบนผิวหนังโดยตรง ทำให้เกิดความเจ็บปวดและ
และเกิดเป็นแผลจากเปลือกกดได้

“ กระโหลกศีรษะแตก ”

(Fracture of Skull)

สาเหตุ— ตกจากที่สูงหรือหกล้ม หรือถูกตี

อาการ — กระโหลกศีรษะแตกหรือร้าวแต่อย่างใด ไม่มีอัน-
ตรายร้ายแรงอะไรนัก แต่ถ้าหากกระดูกแตกนั้นกดลงสู่เนื้อสมองหรือมี
อาการกระทบกระเทือนทางสมอง ก็จะมีอาการรุนแรงและมีอันตรายมาก

อาการทางสมอง (ได้กล่าวมาแล้วที่ ๕ แล้ว ในเรื่องมันสมอง
กระทบกระเทือนหรือมันสมองถูกกด) ในรายที่กระดูกกดลงในเนื้อสมองนั้น
ผู้ป่วยมักหมดสติ ม่านตาเล็กลงหรือมีขนาดไม่เท่ากัน ระยะหลัง ๆ ม่าน
ตาอาจขยายและไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง ใบหน้าแดง ชีพจรช้า บาง
ครั้งมึนงงได้อาเจียน ตัวร้อน

ถ้ากระโหลกศีรษะบริเวณที่แตกไม่และหว่างควแตก อาจมีน้ำใส ๆ
หรือเลือดออกมาทางหูหรือจมูก และนอกจากนี้บริเวณศีรษะตรงนั้นบวม
ให้เห็นได้

การปัจจุบันพยาบาล :—

- ๑) ต้องปรึกษาแพทย์ หรือนำส่งโรงพยาบาลโดยใช้เปลหาม
- ๒) ถ้ามีช็อค ควรรักษาช็อคก่อน

- ๓) ถ้ามบาดแผล ควรแต่งบาดแผล และถ้ามตกเลือดต้องห้าม

เลือด

- ๔) ให้อนหงาย ศีรษะสูง ๆ เอาไว้
 ๕) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
 ๖) วางก้อนน้ำแข็งหรือถุ่่น้ำแข็งบริเวณศีรษะ
 ๗) อย่าใช้ยาบำรุงหัวใจ
 ๘) อย่าให้อาหารหรือน้ำดื่ม ถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟื้น

“กระดูกขากรรไกรหัก”

(Fracture of lower jaw)

สาเหตุ— จากถูกตี

อาการ —

- ๑) รู้สึกเจ็บปวด และคางผิดรูปร่างไป มักยื่นออกมาข้างหน้า
 ๒) อาปากไม่สนิท เพราะเจ็บมาก และเคี้ยวอาหารไม่ได้
 ๓) ฟันจะไม่อยู่ในระดับเสมอกัน
 ๔) เวลาโยกกระดูกคางมีเสียงกรอบแกรบ
 ๕) อาจมีเลือดออกมาจากเหงือกกลางให้เห็น
 ๖) บริเวณคางอาจมีแผลให้พบได้

ปัจจุบันพยาบาล :—

ให้ผู้ป่วยนั่งลง ใช้ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ หรือผ้าพันชนิดล้าม

เหลียม ๒ ผืน พบผาใหม่ความกว้างราว ๒ นิ้วฟุต ผืนหนึ่งพันรอบด้านหน้า
หน้าของคาง (ใต้ระดับริมฝีปากล่างเล็กน้อย) แล้วไปผูกทท้ายทอยอกผืน
หนึ่งพันรอบใต้คาง แล้วไปผูกก้นทยอดศีรษะ เมื่อผูกแน่นดีแล้ว ถ้าชาย
ผาที่ผูกแล้วของทั้งสองผืนยาวพอเอาชายที่เหลือทั้งหมดมาผูกกันไว้ออกหนึ่ง
แล้วนำส่งโรงพยาบาล

“ กระดูกไหปลาร้าหัก ”

(Fracture of Clavicle)

สาเหตุ—

- ๑) เนื่องจากหกล้มไข่ม้อยันพื้นในท่าแขนเหยียดตรง
- ๒) ถูกตีหรือหกล้ม เอากระดูกไหปลาร้ากระแทกกับของแข็ง

อาการ—

- ๑) บริเวณกระดูกไหปลาร้าข้างนั้นจะบวม และเจ็บปวด
- ๒) คลำพบปลายกระดูกหัก และมีเสียงกรอบแกรบเวลาโยก

กระดูกไหปลาร้านนดู

- ๓) ให้ยกแขนข้างนั้น ยกไม่ขึ้น
- ๔) ผู้ป่วยมักเอียงคอไปด้านที่เจ็บ ยื่นหน้าไปด้านหน้าเล็กน้อย
และจะไข่ม้อยันข้อกระดูกปลายแขนข้างเจ็บไว้

ปัจจุบันพยาบาล— ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ควรทำการปัจจุบันพยาบาล
ซึ่งมีได้ ๒ วิธี

- ๑) ให้ห้อยแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักนั้นไว้ด้วยผ้าคล้องคอ ให้

ต้นแขนข้างนั้นแนบกับลำตัว แล้วใช้ผืนผ้าใด ๆ พันแขนนั้นให้ติดกับทรวงอกไว้ ไปผูกที่ตอนใต้รักแร้ข้างใด การทำเช่นนั้นเพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของแขนนั้นเคลื่อนไหว

๒) ใช้ผ้าเช็ดหน้าใหญ่ ๆ ๓ ผืน (หรือผ้าพันสามเหลี่ยมก็ได้) ใช้ผ้า ๒ ผืนผูกรอบ ๆ ไหล่ข้างละผืน ผืนที่ ๓ คลองผ้าที่พันไว้รอบไหล่แล้วทั้งสองผืนทางด้านหลังของผู้ป่วย ดึงรั้งแล้วผูก การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ไหล่ทั้งสองข้างถูกตรึงหน้าอกแน่น ทำให้ปลายท่อนกระดูกไหปลาร้านั้นเข้ามาชิดกัน แล้วใช้ผ้าออกผืนหนึ่งคลองคอ และห้อยแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักนั้นเอาไว้ด้วย

“ กระดูกซี่โครงหัก ”

(Fracture of Ribs)

สาเหตุ— จากถูกตี หรือหกล้มหน้าอกฟาดพื้นหรือของแข็ง

ชนิด—

๑) หักธรรมดา คือ หักแล้วปลายไม่ทะลุเข้าไปในอวัยวะภายใน

๒) หักแล้วปลายที่หักแทงเข้าไปทะลุอวัยวะภายใน เช่น ปอด หัวใจ หรือเส้นโลหิต

อาการ—

๑) เจ็บหน้าอก และเจ็บมากเวลาหายใจเข้าออกแรง ๆ

๒) ลักษณะหายใจมนัถ์ แตะตน

- ๓) กระดูกซี่โครงซี่ใดหัก กตจะเจ็บมากตรงที่หัก
 ๔) มีเสียงกรอบแกรบเวลาโยกกระดูกซี่หัก
 ๕) ถ้ามีการทำลายอวัยวะภายใน จะพบว่า มี :-

- (ก) มีไอเป็นเลือด
 (ข) มีช็อค
 (ค) มีอาการตกเลือดภายใน

การปัจจุบันพยาบาล :-

ก) หักธรรมดา

ใช้ผ้าผืนโต ๆ ๒ ผืน (อาจเป็นผ้าขาวมาหรือผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ ๆ) พับให้แคบจนมีความกว้างราว ๒ นิ้วฟุต วางให้ตรงกลางของความยาวของผืนนอนบนกระดูกซี่หัก พันรอบทรวงอกแล้วมาผูกด้านข้างด้านทศ ก่อนผูกให้ผู้ป่วยหายใจออกเต็มที่แล้วก่อน ส่วนอีกผืนหนึ่งพันและผูกเช่นเดียวกัน แต่ให้อยู่เหนือและทับขอบผ้าผืนแรกเล็กน้อย

ข) มีอันตรายต่ออวัยวะภายในด้วย

พันผ้ารอบหน้าอกอย่างปกติเช่นอย่างแรก แต่ไม่ต้องแน่นแล้วให้ผู้ปวยนอนบนเปลในท่านอนตะแคงข้างลงบนด้านที่เจ็บ เพื่อให้ปอดด้านที่ทำงานได้เต็มที่

“กระดูกต้นแขนหัก”

(Fracture of Humerus)

กระดูกต้นแขนอาจหักได้ ๓ ตำแหน่งด้วยกัน

๑) ใต้ไห่ (Fracture Neck of Humerus)

๒) ตอนกลางกระดูก (Fracture of shaft)

๓) ตอนเหนือข้อศอก (Supracondylar Fracture) ซึ่งจะกล่าว

เป็นตอน ๆ ไปดังนี้ :—

๑) กระดูกต้นแขนหักตอนใต้ไห่

คือจะหักทศของกระดูก

สาเหตุ— หกล้มเอาบริเวณต้นแขนบริเวณหัวไห่กระแทกพื้นเต็มแรง

อาการ —

๑) บวมบริเวณหัวไห่ แต่ไม่รอบ ๆ ไปทั้งข้อไห่

๒) ทำการเคลื่อนไหวแขนข้างนั้นไม่ได้เช่น ให้ยกแขนขึ้นทำไม่ได้

เพราะจะเจ็บมาก

๓) กดเจ็บตรงกระดูกที่หัก

๔) มีเสียงกรอบแกรบ

การปฐมพยาบาล :— ให้แขนข้างนั้นอยู่แนบตัว ใช้ผ้าผืนใหญ่ ๆ พันทับแขนข้างนั้นไปผูกด้านข้างของทรวงอกตอนใต้รักแร้ข้างดี (คือใช้ทรวงอกทำหน้าที่อย่างฝ่อก) แล้วจึงห้อยแขนข้างเจ็บนั้นไวด้วยผ้าคล้อง

คอ

๒) กระดูกต้นแขนหักตอนกลาง

สาเหตุ— ถูกตบต้นแขน หรือหกล้มเอาต้นแขนนั้นพาดกับพื้น

อาการ —

๑) ปวดเจ็บ ใช้แขนข้างนั้นไม่ได้

- ๒) บวม
- ๓) การเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๔) มีเสียงกรอบแกรบ เวลาจับกระดูกโยกดู
- ๕) อาจสั้นกว่าข้างดี

การปัจจุบันพยาบาล :— ใช้ไม้แบน ๆ เช่น ไม้ฉำฉาหรือไม้ไผ่ กว้างราว ๑ นิ้วฟุต จำนวน ๔ ชิ้น ให้ความยาวเท่ากับความยาวของต้น แขนของผู้ป่วย (คือตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอก) เอาไม้วางไว้ทางด้านหน้า ด้าน หลัง ด้านข้าง และด้านในของต้นแขน (วางผ้าหรือผ้าสักหลาดก่อนวางเปลือก) แล้วพันผ้าให้แน่น เสร็จแล้วใช้ผ้าคล้องคอห้อยแขนข้างนั้นไว้

- ๓) กระดูกต้นแขนหักตอนเหนือข้อศอก

สาเหตุ—

- ๑) อาจถูกตีบริเวณเหนือข้อศอกโดยตรง
- ๒) หกล้ม ใช้ฝ่ามือข้างนั้นยันพื้นในท่าที่ข้อศอกอยู่ในท่าอเล็กน้อย

อาการ—

- ๑) บริเวณข้อศอกนั้นจะบวม
- ๒) ให้พับและเหยียดแขน ทำไม่ได้เต็มที่
- ๓) เจ็บปวดมาก
- ๔) มีเสียงกรอบแกรบ
- ๕) อาจฉีกพบปลายกระดูกหักด้านใดด้านหนึ่ง เหนือข้อศอก

การปัจจุบันพยาบาล

ใช้ไม้แบน ๆ ๒ ชิ้น กว้างประมาณ ๒ นิ้วฟุต มัดหรือตอกตะปู
ให้ปลายของไม้ทั้งสองทำเป็นรูปมุกฉาก ให้ความยาวของไม้สั้นกว่าความยาว
รวมกันแล้วเท่ากับความยาวตั้งแต่ไหล่ถึงปลายนิ้วของผู้ป่วย วางแผ่นไม้
ฉากนลงบนด้านนอกของแขน ให้ตรงมุกฉากอยู่ทขอศอกพอดี พบแขน
ให้เป็นมุกฉาก ซึ่งจะทำให้แขนนั้นมรูปร่างเช่นแผ่นอกที่หาชน แล้วจึงมัดแผ่น
ให้ติดแน่นกับแขนนั้น เสร็จแล้วจึงห้อยแขนข้างนั้นไว้ด้วยผ้าคล้องคอ

“กระดูกปลายแขนหัก”

(Fracture of Forearm Bones)

กระดูกปลายแขนมีกระดูก ๒ อันประกอบกันขึ้น คือ กระดูกเร-
เดียส (Radius) และกระดูกอัลนา (Ulna) อาจหักอันใดอันหนึ่ง หรือหัก
ทั้งสองอัน ถ้ากระดูกเรเดียสหักที่ตอนเหนือข้อมือขึ้นมาภายในระยะ ๒ นิ้ว
ฟุต มีชื่อเรียกพิเศษว่า Colle's Fracture

(กระดูกเรเดียสจะอยู่ด้านทางหัวแม่มือ กระดูกอัลนาอยู่ทางด้าน
นิ้วก้อย)

สาเหตุ— มักเนื่องจากถูกตีโดยแรง

ส่วน Colle's fracture มักเนื่องจากหักล้ม เอามือยันพื้นเท่านั้น
โดยตอนอุ้งมือกระแทกลงกับพื้น

อาการ—

๑) บวมด้านกระดูกหัก

๒) ถูกตัวอย่างเต็มแรง

อาการ—

- ๑) ต้นขานจะบวมมากตรงตำแหน่งกระดูกหัก
- ๒) มีเสียงกรอบแกรบเวลาโยกกระดูกต้นขา
- ๓) ถ่ายกระดูกต้นขาด้านล่างดู ข้อตะโพกจะไม่เคลื่อนตามตัว

เช่นคนปกติ

- ๔) ขามักจะสั้นกว่าขาข้างดี
- ๕) ขามักจะบิดไปทางด้านข้าง
- ๖) คลำพบปลายกระดูกหัก
- ๗) เดินไม่ได้

การปัจจุบันพยาบาล :—

ให้ผู้ป่วยนอนหงาย ใช้เชือกไม้ ๒ อัน ซึ่งกว้างราว ๔—๕ นิ้วผูก
 อันแรกมีความยาวตั้งแต่รักแร้ถึงส้นเท้า วางตามโอบนด้านนอกของขา อีก
 อันหนึ่งยาวตั้งแต่ตอต้นโตงเข้ถึงส้นเท้า วางเอาไว้ด้านในของขา ใช้ผ้า
 พันผูกกันให้แน่นกับขาและลำตัว เมื่อนำขึ้นเปลเพื่อส่งไปโรงพยาบาล
 ผูกให้ขาดตดกับขาเจ็บ โดยมีดทตรงเหนือข้อเท้าและข้อเข่า เพื่อทำให้ขา
 ข้างเจ็บเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

“กระดูกสะบ้าแตก”

(Fracture of Patella)

สาเหตุ— ถูกตี หรือหกล้มเอาเข่าตอกระดูกสะบ้ากระแทกกับพื้น

อาการ —

- ๑) บวมบริเวณกระดูกสะบ้า
- ๒) ให้พับหรือเหยียดข้อเข่า จะเจ็บปวดมาก
- ๓) คลำที่กระดูกสะบ้า จะเห็นรอยแตกซึ่งแยกออกจากกัน
- ๔) มีเสียงกรอกแกรบ เวลาโยกกระดูกสะบ้า
- ๕) เดินไม่ได้

การปัจจุบันพยาบาล :—

ให้ผู้ป่วยนอน ใช้ไม้แบน ๆ ซึ่งมีความกว้างราว ๓—๕ นิ้ว ฟูต มีความยาวเท่ากับความยาวตั้งแต่ตะโพกถึงส้นเท้าของผู้ป่วย สอดไว้ใต้ขาข้างนั้นแล้วพันผ้าให้แน่น ควรผูกผ้าพันไว้ที่ต่อนใต้และเหนือกระดูกสะบักนั้น เพื่อให้กระดูกที่แตกเข้ามาชิดกัน ถ้าบริเวณเข่าบวมมาก จะวางถุงน้ำแข็งไว้เหนือเข่าข้างนั้นด้วยก็ได้ ให้นอนเปลห้ามส่งโรงพยาบาล

“กระดูกหน้าแข้งหัก”

(Fracture of Leg)

กระดูกหน้าแข้งมี ๒ อันด้วยกัน คือกระดูกทibia และกระดูกFibula (Tibia and Fibula) อาจหักอันเดียวหรือทั้งสองอัน แต่อันสำคัญและใหญ่ คือกระดูกทibia

ผลเสีย— กระดูกหน้าแข้งหัก มีผลเสียกว่าที่แห่งอื่น ๆ บ้าง ก็คือ

- ๑) กระดูกอยู่ใกล้ผิวหนังมาก ปลายที่หักอาจทิ่มตำออกมาภายนอก

๒) กระตุกตดซ้ำ เพราะมีเลือดเลี้ยงกระตุกน้อย

๓) มักจะมีการบวมมากของส่วนล่าง ๆ ของตอนทหกลงไป

สาเหตุ—มักเนื่องจากถูกต หรือหกล้มเอาหน้าแข็งฟาดกับพื้นหรือของแข็ง

อาการ—

๑) ชามักสั้น

๒) ด้านหน้าแข็งมักโก่งหรือโค้งออกมาก

๓) รูปร่างผิดไป

๔) มีเสียงกรอบกรอบ

๕) บวมลงไปจนถึงข้อเท้าข้างนั้น

การปัจจุบันพยาบาล :—

ใช้เฝือกไม้แบน ๆ ๓ อัน กว้างราว ๓ นิ้วฟุต ความยาวตั้งแต่
เหนือเข่าถึงข้อเท้า วางไว้ที่ใต้ขา ทาบกับนอนอันหนึ่ง อีก ๒ อันวางไว้
ด้านในและด้านนอกของขา แล้วพันผ้าให้แน่น ก่อนนำขึ้นแปลไปโรง
พยาบาล ควรผูกขาข้างที่เจ็บให้ติดกับขาข้างที่ดี เพื่อให้ขาข้างที่เจ็บนั้นอยู่
นิ่ง

“กระตุกสั้นหลังหัก”

สาเหตุ— ตกจากที่สูงในท่าก้นกระแทก

อาการ— กระตุกสั้นหลังหัก มักจะมีอันตรายต่อประสาทไขสันหลัง โดย
ส่วนที่หักนั้นกดลงไปบนประสาทไขสันหลัง ทำให้เกิดอัมพาตครึ่งท่อนตัวใน
ระดับล่างจากกระตุกที่หักลงไป ถ้าเป็นบริเวณคออาจทำให้ผู้ป่วยตายได้ทันที

๓) กระจกสันหลังตำแหน่งที่หักจะโป่งนูนขึ้นมาให้เห็นได้

๒) กัดในตำแหน่งที่หักจะเจ็บมาก

๓) เดินไม่ได้

๔) มีลมพาตครั่งท่อน คือ

ก) ยกขาทั้งสองไม่ได้

ข) ซาซาและไม่รู้สึกลึก

ค) อูจจาระ บั๊สสาวะกลืนไม่ได้ หรือถ่ายออกมาโดยไม่รู้สึกลึก บั๊สสาวะส่วนมากมักถ่ายไม่ได้เอง

การปัจจุบันพยาบาล :—

กระจกสันหลังหักมีความสำคัญที่สุดในการให้ การ ปัจจุบัน พยาบาล
สามัญชนทั่ว ๆ ไปมักจะใช้วิธีห้ามผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ โดยวิธี “หว่หว่—หว่
ท่าย” ในเมื่อผู้ป่วยนอนหงายเสมอ แต่การกระทำเช่นนั้นของผู้ป่วยที่กระจก
สันหลังหักเป็นเหตุให้ผู้ป่วยงอมาด้านหน้าและสันหลังแอ่นลงไป ทำให้
ประสาทไขสันหลังจะถูกกดและถูกทำลายมากขึ้น ฉะนั้น วิธีที่กล่าวไว้ใน
กระจกสันหลังหัก เป็นข้อห้ามที่ไม่พึงกระทำอย่างเด็ดขาด และควรทำดังต่อ
ต่อไปนี้ :—

๑) ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำนิ่ง ๆ ถ้าจะนำเคลื่อนที่อาจ “หว่หว่—หว่
ท่าย” ในท่าที่นอนคว่ำอยู่เช่นนั้น

๒) ถ้าต้องการนำผู้ป่วยเคลื่อนที่ในท่านอนหงาย ต้องให้นอนบน
ที่ราบ ๆ เช่น เปดไม้แข็ง, กระจาดแผ่นเดียว (อาจใช้บานประตูหรือบาน
หน้าต่างก็ได้) แต่ควรให้นอนไปในท่านอนคว่ำเป็นดีที่สุด

๓) การจะจับผู้บ่วยให้พลิกตัวจากท่านอนคว่ำมานอนหงาย ต้อง
ประคองตัวให้พลิกไปทั้งตัว (เปรียบเหมือนดังการม้วนเสื้อ)

๔) อย่ารอเวลาหรือเก็บผู้บ่วยไว้รักษากันเอง ควรส่งโรงพยาบาล
ด่วนที่สุด

๕) ถ้ามีช็อค ควรรักษาช็อคไปพร้อม ๆ ด้วย

บทที่ ๗

“ยาพิษ”

(Poisons)

คำจำกัดความ ยาพิษ หมายถึง “เคมีวัตถุ ซึ่งเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน, การฉีด ทางหายใจ หรือผ่านเข้าทางผิวหนังก็ตาม ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือทำลายชีวิต”

การจำแนกชนิดของยาพิษ :—

เราอาจแบ่งชนิดของยาพิษออกเป็น ๔ ชนิดด้วยกัน

(๑) พวกที่กัดเนื้อ (Corrosive) คือ พวกที่เมื่อถูกต้องส่วนของร่างกายแล้ว จะกัดเนื้อจนทำให้ไหม้ทันที

(๒) พวกที่ทำให้เกิดอาการระคายเคือง และอักเสบ (Irritants)

(๓) พวกที่ทำให้มึนเมา (Narcotics)

(๔) พวกที่ทำให้เพ้อคลั่ง (Deliriant) และในที่สุดหมดสติไป

เหตุแวดล้อมที่ทำให้คนกลืนว่าผู้ป่วยได้รับยาพิษ :—

(๑) โดยเกิดอาการขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเมื่อได้รับยาพิษ เช่น อาเจียน, ท้องเดิน, กระตุก หรือเป็นตะคิวของแขนขา ปวดท้อง เพ้อคลั่ง, หมดสติ ฯลฯ โดยผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก่อน แต่อาการปรากฏขึ้นในไม่ช้า ภายหลังรับประทานอาหาร ดมเห็ด, น้ำซากาแฟ หรือรับประทานยาใด ๆ เข้าไป

(๒) อาการที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏขึ้นกับผู้นอนด้วย เป็นอาการที่คล้ายกัน ภายหลังที่ผู้ป่วยเหล่านั้นร่วมรับประทานอาหารกัน

(๓) โดยมีเหตุแวดล้อมให้พบได้ เช่น มีถ้วยแก้วทมกลืนยาพิษ กล่องยาพิษ หรือขวดยาพิษ ฯลฯ อยู่ใกล้เคียง

(๔) มีประวัติเกี่ยวข้องกับส่วนตัวมาก่อน เช่น เป็นโรคจิต การเสียอกเสียใจ และตั้งใจจะฆ่าตนเอง หรือมีศัตรูผู้เกลียดชังมาก่อน ๆ ฯลฯ

วิธีการจับจูนพยาบาลทั่ว ๆ ไป

- ๑) ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ จะต้องทำการผายปอด
- ๒) เตรียมที่จะนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ๓) ถ้ามชอคต้องรักษาชอค
- ๔) ตรวจและพยายามค้นหาสิ่งแวดล้อม ว่าผู้ป่วยได้รับยาพิษ

ชนิดใด

- ๕) ถารู้ชนิดของยาพิษ อาจทำลายยาพิษนั้นโดย
 - (ก) ทำให้อาเจียนออกมา
 - (ข) ทำให้ยานั้นเจือจางเข้า
 - (ค) ทำลายยาพิษนั้นด้วยยาซึ่งมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับยาพิษ
- ๖) ถ้าไม่รู้ชนิดของยาพิษ ให้ใช้วิธีการทั่ว ๆ ไป (จะกล่าวได้

ต่อไปนี้)

- ๗) โดยทั่ว ๆ ไป ควรจะให้น้ำนม, ใช้ดื่บดรวมกับน้ำมันหรือน้ำ, แฉ่งเปียก, ชาแก่ ๆ หรือน้ำจำนวนมาก ๆ

๘) ควรเก็บเอาเจียนที่ออกมาขึ้นไว้เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจหรือถ้า
เกี่ยวกับคดี เก็บไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ขวดหรือแก้วยานั้นควรเก็บรักษาไว้
อย่าล้างทิ้งเสีย

๙) อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยไว้นานเกินไป ควรเฝ้าดูไว้ตลอดเวลา

การบำบัดรักษาพยาบาลในรายที่ไม่ทราบชนิดของยาพิษ

๑) พยายามเอายาพิษนั้นออกทิ้ง โดยการให้อาเจียนหรือใช้ยาที่
กระตุ้นให้เกิดอาการอาเจียน หรือให้ถ่ายยาออกทิ้งเสีย

แต่ในรายใดที่ตรวจพบว่าริมฝีปาก, ปาก และลำคอ มีรอยไหม้
อย่าให้ยาทำให้อาเจียน เพราะยาพิษนั้นจะกลับออกมากับอาเจียน ทำให้
อาการไหม้ลำคอและปากเพิ่มขึ้นอีก

๒) โดยใช้ยาที่ไปหุ้มหรือเคลือบ — ไม่ให้ยาพิษนั้นออกฤทธิ์ของ
มันได้เต็มที่ เช่น ให้น้ำมัน, น้ำมันมะกอก, น้ำมันสลัด หรือไข่ดิบ ๆ
ตรวบรวมเข้ากับน้ำมันดื่มลงไป

๓) ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และรักษาอาการช็อค

๔) ให้ยาระงับความเจ็บปวด

การทำให้อาเจียน—

๑) ใช้ขี้วัวสดคอง หรือใช้ไม้พั่นลำเล็กกวาดลำคอให้รู้สึกคลื่นไส้และ
อาเจียนออก

๒) ใช้ยาบางชนิดที่ทำให้มีอาการอาเจียน ยาที่ใช้อาจเป็นยาต่อ-
ไปน:—

(ก) มัสตาด — ใช้ ๑ ช้อนชาถึง ๑ ช้อนโต๊ะ ในน้ำอุ่น ๆ

๑ ถ้วยแก้ว

(ข) ซิงค์ซัลเฟต — ๓๐ เกรน ในน้ำอุ่นครึ่งถ้วยแก้ว

(ค) น้ำธรรมดาจำนวนมาก ๆ แล้วลวกคอให้อาเจียนออก

ยาเหล่านี้ อาจให้โดยวิธีให้ดื่ม หรือใส่สายยางลงสู่กระเพาะ

อาหาร และกรอกยานั้นลงไปด้วยกรวย และการใส่สายยางลงไปในกระ-
เพาะนี้ อาจทำการล้างกระเพาะได้ไปด้วยในตัว

ข้อห้าม — อย่าให้ยาทำให้อาเจียน ในรายที่ยาพิษนั้นเป็นชนิดกัดเนื้อ
(ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)

การบ่งจุนพิษยาบาลยาพิษที่ทราบชนิด

พวกที่ ๑ “พวกที่กัดเนื้อ” (Corrosive)

ได้แก่พวกกรดหรือพวกด่าง

อาการ - มีการพองหรือไหม้ที่ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้นหรือลำคอปวด
ท้องมาก และสุดท้ายมักหมดสติ

บ่งจุนพิษยาบาล:—

(๑) อย่าให้ยาทำให้อาเจียน

(๒) ให้ยาที่มีปฏิกิริยาตรงกันข้าม คือ

ก) ถ้าเป็นกรด ให้ยาที่เป็นพวกด่างอ่อน ๆ เช่น น้ำยาโซดา-
ไบคาร์บอเนต น้ำปูนใส

ข) ถ้ายาพิษเป็นพวกด่าง ให้ยาพวกที่เป็นพวกกรดอ่อน ๆ เช่น
น้ำมะนาว, น้ำส้มสายชู

ค) ถ้าไม่ทราบว่าการดหรือต่างแน ให้ดมน่านมหรือน่านเย็น ๆ จำนวนมาก ๆ

(๓) ภายหลังให้ยาทกล่าแล้ว ให้ประคบน้ำร้อนบริเวณ คอ
ทรวงอก และหน้าท้อง

(๔) รักษาการช็อค

พวกที่ ๒ “ พวกทำให้เกิดอาการระคายเคืองและอักเสบ ”

(Irritants)

ยาพวกนี้ได้แก่ยาจำพวกเข้าตะกั่ว, ฟอสฟอรัส, สตริกนิน, สารหนู
หรืออาหารเป็นพิษ (มักพบในพวกอาหารกระป๋อง)

อาการ —

๑) ปวดแสบปวดร้อนในคอ หรือปวดท้องอย่างรุนแรง

๒) คลื่นไส้ ชะเย่อน หรืออาเจียน

๓) ท้องเดิน

๔) สลบ

ปัจจุบันพยาบาล.—

๑) ให้ยา หรือทำให้อาเจียน (ถ้าใช้ยา อาจซ้ำได้ทุก ๕ นาที
จนมอาการอาเจียน)

๒) ภายหลังทอาเจียนออกหมดแล้ว ให้น้ำมันละหุ่ง (ผู้ใหญ่
๒ ช้อนโต๊ะ เด็ก ๒ ช้อนชา)

๓) ต่อมาให้ น้ำมันมะกอก, น้ำมันสลัด, น้ำมันพาราฟิน, นานม
หรือใช้ดบดเชากกับนานม

๔) ควรรักษาข้อคตอ ๆ ไปจนกว่าผู้บ่วยจะฟื้น
พวกที่ ๓ “พวกที่ทำให้มันเมา” (Narcotics)

ยาพวกนี้ได้แก่พวกฝิ่น, มอร์ฟีน, เวโรนาล, ซัลโฟนาล หรือ
เมดินาล เป็นต้น

อาการ — นอนหลับลึกไม่ตื่น หมดสติ ม่านตามักเล็กลงมาก และตาย
ปัจจุบันพยาบาล.—

- ๑) ให้ยาทำให้อาเจียน
- ๒) ดมกาแฟดำร้อนชงแก่ ๆ (หรือนิดยาพวกคาเฟอีน)
- ๓) คอยปลุกให้ตื่น พยุงเดินไปมา
- ๔) ถ้าหยุดหายใจ ทำการผายปอด

พวกที่ ๔ “พวกที่ทำให้เพ้อคลั่ง” (Delirants)

ยาพวกนี้ได้แก่พวกเบลลาดอนนา หรืออะโตปีน ลำโพง

อาการ — ใบหน้าแดง ผิวน้ำแดง สะดุ้ง ตันเต้น ม่านตาขยาย ชีพจร
เร็ว และเพ้อคลั่ง

ปัจจุบันพยาบาล.—

- ๑) ทำให้อาเจียน หรือใช้ยาทำให้อาเจียน
- ๒) รีบนำส่งโรงพยาบาล

การปัจจุบันพยาบาลยาพิษบางชนิด

ยาพิษบางชนิดมีการปัจจุบันพยาบาลพิเศษ นอกเหนือไปจากหลัก
ทั่ว ๆ ไปที่กล่าวไว้ข้างต้น

กรดคาร์บอนิกหรือไลโซล

พวกนี้เป็นกรดและกัดเนื้อ กัดนํ้าหายใจของผู้ป่วยที่กินยานมกมกขึ้น
การบอกล

ควรให้นํ้ามันพาราฟิน (ประมาณครึ่งไปนต) นํ้านมหรือนํ้าธรรมดา
และให้พวกยาถ่ายดัดเกล็ด

นํ้าปรอท

(Corrosive Sublimate)

เป็นยาพวกทำให้ระคายเคือง
ใช้ใช้ชาวดมสกับนํ้านมหรือนํ้าให้ดมก่อน แล้วจึงให้ยาทำให้
อาเจียนตามภายหลัง

ไอโอดีน

ผู้ป่วยที่ดื่มไอโอดีนเข้าไป มักมีอาการกระหายนํ้ามาก และอาเจียน
ออกมามากจะมีสีเหลืองหรือสีนํ้าเงิน (ไอโอดีนเมื่อถูกแสงจะมีสีนํ้าเงิน)
ให้เบ้งเบ้งหรือนํ้าธรรมดาก่อน แล้วจึงให้ยาทำให้อาเจียน

ฟอสฟอรัส

อย่าให้ยาจำพวกนํ้ามันหรือไขมันเลย ให้ยาถ่ายดัดเกล็ดเพื่อ
ถ่ายออก

ฝน

(และยาพวกคล้ายคลึงกัน)

เมื่อให้ยาทำให้อาเจียน และยาเริ่มออกฤทธิ์ ให้ดื่มน้ำยาต่างทั้บ
 ทิมแก่ ๆ ซึ่งจะทำให้ฝนเจือจางเข้าและอาเจียนออกมา (โดยฤทธิ์ของยาทำ
 ให้อาเจียนออกฤทธิ์และให้ไวก่อนแล้วนั้น) อาจซ้ำอีกหลังจากให้ครั้งแรก
 ครึ่งชั่วโมง แล้วให้ดื่มน้ำกาแฟดำร้อน ๆ ชงแก่ ๆ

สตริกนิน

ทำให้เกิดชัก อาจตายเพราะการหายใจไม่สะดวก

ให้ยาทำให้อาเจียนออก และทำการขยายปอดให้ในระหว่างทั้บ

การชัก

บทที่ ๘

“ปวดท้อง”

(Abdominal Pain)

“ปวดท้อง” เป็นอาการของโรคหลายชนิดด้วยกัน ที่เกิดขึ้นภายใน
อวัยวะของช่องท้อง

สาเหตุ:— ทวี ๆ ไป อาการปวดท้องอาจเนื่องจากสาเหตุใหญ่ ๆ
ดังนี้ :—

(๑) จากการบีบรัดตัวของลำไส้ กระเพาะอาหาร หรืออวัยวะใน
ช่องท้อง

(๒) เมื่อเกิดมีแผลหรือการอักเสบขึ้น ของอวัยวะในช่องท้อง หรือ
เยื่อช่องท้อง

(๓) มี การอุดตันของลำไส้ เช่น วัณโรค, เนื้องอก, ลำไส้กลืน
กันเอง, ลำไส้บิดตัว, หรือพยาธิจำนวนมากๆ ในลำไส้อุดตันทางเดินอาหาร
หรือมีการอุดตันทางเดินของน้ำดี เช่น นิ่วในท่อน้ำดี

(๔) อาหารเป็นพิษ อาหารไม่ย่อย ทำให้เกิดแก๊สจำนวนมากใน
ทางเดินอาหาร

(๕) โรคเกี่ยวกับทางเดินน้ำปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์,

ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการปวดท้อง

- ๑) สังเกตว่าอาการปวดมีลักษณะอย่างไร เช่น ปวดจืด ๆ ปวดตื้อ ๆ เหมือนกับเกิดมึนงง, ปวดเมื่อย ๆ คล้ายจะจับไข้, ปวดตื้อ ๆ, ปวดเหมือนถูกบีบได้, ปวดเสียดแน่น และอาการปวดที่เกิดขึ้นทันที หรือค่อย ๆ ปวดเพิ่มทีละน้อย และปวดตลอดเวลา หรือปวดเป็นพัก ๆ
- ๒) สังเกตว่าคลื่นไส้ อาเจียนหรือไม่ และลักษณะอาเจียนเป็นอย่างไร (ควรเก็บอาเจียนไว้ให้แพทย์ตรวจ)
- ๓) อูจจาระในระหว่างนี้ผิดปกติอย่างไรบ้าง เช่น ท้องผูก ท้องเดิน อูจจาระเป็นมูกเลือด
- ๔) บัสสาวะเป็นอย่างไรบ้าง ถ่ายสะดวกหรือติดขัด ชूनหรือสีน้ำบัสสาวะเป็นเลือดสด ๆ หรือน้ำล้างเนื้อ ถ่ายบ่อย หรือไม่ถ่ายเลย
- ๕) มีไข้หรือไม่
- ๖) ตำแหน่งที่ปวดเริ่มต้นที่ใด ปวดย้ายไปที่ใดบ้างและปวดมากที่สุดอยู่ที่ใด (เวลาแพทย์ตรวจจะให้ผู้ป่วยชี้ด้วยนิ้วเดียวและบอกตำแหน่งที่ปวดที่สุด)
- ๗) ก่อนปวด รับประทานอาหารอะไรผิดธรรมดาบ้าง
- ๘) อาการปวดท้องเกี่ยวกับเวลาอาหารหรือไม่ เช่น ปวดก่อนหรือหลังอาหาร
- ๙) ถ้าเป็นสตรี จำถึงครั้งสุดท้ายว่าเริ่มวันที่เท่าใดและเกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องครั้งนี้หรือไม่

หลักในการบ่งจุนพยาบาล

ตัวผู้ป่วยเองหรือผู้ให้บ่งจุนพยาบาล ควรกระทำดังต่อไปนี้:

๑) อย่าวินิจฉัยโรคของตัวเอง ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หรือ
ปรึกษาแพทย์ใกล้เคียง

๒) อย่าใช้ยาตามท้องตลาด หรือให้ยาแก่ตนเอง จนกว่าแพทย์
จะเป็นผู้สั่งให้ใช้

๓) ผู้ให้การพยาบาล ควรแนะนำผู้ป่วยเลิกหลงเชื่อการรักษาโดย
การอาบน้ำมันต์, เส็กเป่า ทายา, การขับผีคำจ, การเข้าทรง ตลอดจน
การใช้รูปหรือเหล็กเผาไฟจับบริเวณที่มีอาการเจ็บปวดเสียโดยเด็ดขาด

๔) อย่าให้รับประทาน หรือใช้ยาชนิดระงับความเจ็บปวดจนกว่า
แพทย์จะได้ตรวจ และแนะนำการปฏิบัติรักษาอย่างถูกต้องแน่นอนเสียก่อน
เพราะยาระงับปวดมิใช่ยาทำลายสาเหตุของโรคหรือทำลายการอักเสบ กลับ
มีผลร้ายชน โดยเมื่อยาออกฤทธิ์แล้วการตรวจจะไม่ได้ผลถูกต้องเท่าที่ความ
รุนแรงของโรคที่ควรจะเป็นอาจทำให้การรักษาเน้นช้าต่อไปอีก

๕) อย่าบีบนวด หรือคลึงหน้าท้อง อวัยวะในช่องท้องที่อักเสบ
อาจแตกทะลุได้ง่าย

๖) อย่ากินยาถ่าย หรือสวนอุจจาระ ซึ่งทำให้ลำไส้เคลื่อนไหว
บีบตัวมาก การอักเสบอาจลุกลาม หรือแผลอาจทะลุ ควรขอคำแนะนำ
จากแพทย์ก่อน

๗) แม้มอาการเพียงเล็กน้อย ให้นึกสงสัยไว้ว่าโรคในช่องท้อง
อาจรุนแรงต่อไป ให้รีบปรึกษาแพทย์ที่อยู่ใกล้เคียง หรือนำส่งโรงพยาบาล

๘) ในระหว่างที่ตามแพทย์ให้นอนนิ่ง ๆ ในท่าพิงเอนหลังวาง
กระเป๋าทือหรือขวดน้ำร้อนไว้บริเวณหน้าท้อง

๙) ถ้าหากทำได้ ควรวัดอุณหภูมิ นับชีพจรของผู้ป่วยไว้และแจ้ง
แพทย์ทราบ

๑๐) ควรงดอาหารและน้ำดื่มทุกชนิด

๑๑) เมื่อแพทย์ตรวจแล้ว แนะนำว่าต้องรับการผ่าตัดควรตัดสินใจ
รับการผ่าตัดโดยทันที

บทที่ ๘

ความรู้บางประการ

“ยากระตุ้นหัวใจและยาบำรุงหัวใจ” (Heart Stimulants)

การกระตุ้นหัวใจ และการใช้ยาบำรุงหัวใจนั้น ความมุ่งหมายก็เพื่อให้หัวใจได้ทำงานและหน้าที่ของมันแข็งแรงขึ้น ในรายที่หัวใจอ่อนลงโดยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เราอาจใช้วิธีและยาดังต่อไปนี้ได้

๑. การให้ดื่ม

จะให้ได้ดีก็ในเมื่อผู้ได้รับอุบัติเหตุนั้นมึนสลัด และสามารถกลืนได้และการให้ดื่มน้ำยาเหล่านี้แล้ว จะไม่อันตรายต่ออวัยวะอื่น ๆ อาจเลือกใช้ดังนี้ :—

- ก) กาแฟดำร้อนหรือชาร้อน ชงแก่ ๆ
- ข) นมสดร้อน ๆ
- ค) น้ำร้อน
- ง) แอมโมเนียหอม (๑ ช้อนชาต่อน้ำอุ่นครึ่งถ้วยแก้ว)
- จ) บรันดิ ๑ ช้อนโต๊ะ

- ๒) ให้ดื่ม ใช้พวกแอมโมเนีย (เยียวอูฐ) แอมโมเนียหอม
- ๓) เช็ดบริเวณใบหน้าด้วยน้ำอุ่นและน้ำเย็นสลับกัน

๔) ให้ความอบอุ่น โดยวางกระเป๋าร้อนหรือขวดน้ำร้อนบริเวณหน้าท้องและทรวงอกเบื้องซ้าย

๕) การนวด คลึง เพ้น หรือถูบริเวณมือ แขน เท้า ขา ขนมหาลำตัว

หมายเหตุ— การใช้ยาบำรุงหัวใจชนิดใดก็ตาม ไม่ควรใช้เป็นอันขาด ถ้าในรายที่ตกเลือดนั้น ยังไม่อาจห้ามเลือดให้หยุดได้แน่นอน เพราะการทำการกระตุ้นหัวใจให้บีบตัวแรงขึ้น จะเพิ่มความดันโลหิต เป็นเหตุให้การตกเลือดมีได้ใหม่อีก หรือเพิ่มเร็วขึ้น

“การเปลื้องหรือถอดสิ่งทรงกุ่ม”

ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ควรถอดเปลื้องสิ่งทรงกุ่มออกเสียเพื่อการตรวจ หรือให้ผู้ช่วยหายใจสะดวก และให้หัวใจได้ทำงานเต็มที่ แต่บางรายไม่ควรถอดออกหมดซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยหนาวสั่น การเปลื้องจึงเพียงทำให้หลวม ๆ เท่านั้น

ก) บริเวณคอ ปลดกระดุมหรือผ้าผูกคอ

ข) เสื้อผ้า ปลดกระดุมให้หลวม ถ้าจำเป็นต้องถอดออกเลย ในรายที่กระดูกหัก อาจใช้เลาะตามตะเข็บหรือตัดส่วนของเสื้อผ้าบริเวณกระดูกหักนั้นทิ้งเสีย

ค) ปลดเข็มขัดให้หลวม และปลดกระดุมกางเกงให้หลวม

ง) ถอดรองเท้า (ด้วยความระมัดระวัง ถ้ากระดูกบริเวณข้อเท้าหัก หรือข้อเท้าบวม)

จ) ถูเท้า ใช้ติดทงถ้ากระดูกบริเวณเท้าหัก

“การแต่งบาดแผล”

การแต่งบาดแผล ความประสงค์เพื่อทำลายเชื้อโรค และการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล ซึ่งต้องการความสะอาดโดยการล้างฆ่าเชื้อโรค และการปิดปากแผลด้วยผ้าหรือล้าสะอาดไม่ให้แผลเปิดถูกกับภายนอก บาดแผลที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนมากในรายที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ มักเป็นบาดแผลที่ตื้นเขิน เพราะบาดแผลมักจะมียาหรือสิ่งสกปรกติดลงไป เนื่องมาจากสถานที่เกิดเหตุนั้นย่อมมีสิ่งสกปรกไปทุกประการ

การแต่งบาดแผลในปัจจุบันพยาบาลเช่นนั้น ไม่อาจทำได้เต็มที่ในด้านการป้องกันหรือการทำลายเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามการกระทำควรทำให้สะอาดมากที่สุดที่จะทำได้

ผู้ทำการแต่งบาดแผล ควรล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดที่สุดถ้าไม่มีน้ำหรือสบู่ อาจล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เสียก่อน

ผู้ช่วย บริเวณบาดแผลที่มดหรือขนอยู่ ควรตัดผมหรือโกนขนให้สั้น

เครื่องมือ (ก) คีม (Forceps) ควรต้มเสียก่อน หรือแช่แอลกอฮอล์ ๗๐ % นาน ๕ นาทีเป็นอย่างน้อย

(ข) กรรไกร แช่แอลกอฮอล์ ๗๐% ๕ นาที

(ค) มีด (หรือใบมีดโกน) แช่แอลกอฮอล์ ๗๐% ๕ นาที

(ง) ล้าหรือผ้ากอสนิ่งแล้ว ถ้าจำเป็นและไม่ได้ล้าง ควรใช้ที่ใหม่ๆ ล้างฆ่าเชื้อโรค ยาล้างฆ่าเชื้อโรคอาจใช้ได้หลายชนิดด้วยกันแต่ยาที่จะกล่าวนี้เป็นยาที่สมควรจะมีไว้ และเป็นยาที่หาได้ง่าย

๑) น้ำเกลือ เกลือ ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ๑ ลิตร ใช้ล้างแผล

๒) น้ำต้มเดือดและทำให้อุ่นลง ใช้ล้างบาดแผลเพื่อให้บาดแผลสะอาด

๓) แอลกอฮอล์ ใช้ขนาด ๗๐% ถ้าความแรงต่ำหรือสูงกว่านี้ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคจะอ่อนลงไป ใช้เช็ดแผล เช็ดเครื่องมือ, ล้างมือ

๔) น้ำยาด่างทับทิม ใช้ขนาดความเข้มข้น ๑;๓๐๐๐ หรือ ๑;๓๐๐๐ ใช้ล้างบาดแผล การผสม ใช้เกล็ดด่างทับทิมใส่ลงในน้ำอุ่น จนน้ำยามีสีชมพูอ่อน ๆ ก็นับว่าพอ

๕) ทิงเจอร์ไอโอดีน โดยมากใช้ขนาด ๒% แต่เด็ก ๆ ใช้ ๑% เพราะเด็กผิวหนังบางใช้ขนาดแรง ๆ อาจไหม้ได้ ใช้เช็ดแผล

๖) โลโซล ใช้ขนาด ๑-๒% ใช้เช็ดเครื่องมือ

๗) น้ำยาบอริก ๓% ใช้ล้างตา หรือชะแผล

๘) ยาเหลือง (Acriflavine) ขนาด ๑;๓๐๐๐ ใช้ล้างแผลและชุบปิดแผลสดหรือเปื่อย

๙) ยาแดง (Mercurochrome) ขนาด ๒.๕% ใช้เช็ดแผลหรือชุบบิดแผล

๑๐) ผงซัลฟานิลาไมด์ ใช้โรยแผลสดหรือแผลเปื่อย (การแต่งแผลได้พูดไว้ในโรคต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว)

“กระเป๋าทันหรือหีบปัจจุบันพยาบาล”

ในการเดินทาง หรือเพื่อการปัจจุบันพยาบาล ควรมีเครื่องมือเครื่องใช้ และ เพื่อให้การปัจจุบันพยาบาลผู้ป่วย ดังนี้:—

๑) สำลีและกอต

- ๒) ผ้าพันแผลอย่างม้วน (Roller Bandage)
- ๓) ผ้าสามเหลี่ยม ผ้าเช็ดหน้าผืนโต
- ๔) มัด หรือโบมัดโกน
- ๕) กรรไกร
- ๖) คีมแต่งแผล (Forceps)
- ๗) ยาเม็ดแอสไพริน— แก้วปวดต่าง ๆ
- ๘) ยาเม็ดควินิน—ขนาดเม็ดละ ๕ เกรน รับประทานวันละ ๓ เม็ด เพื่อกันไข้มาลาเรีย
- ๙) แอมโมเนียหอม
- ๑๐) เกล็ดด่างทับทิม
- ๑๑) ยาแดง หรือยาเหลือง
- ๑๒) แอลกอฮอล์ ๗๐%
- ๑๓) ทิงค์เจอร์ไอโอดีน $2\frac{1}{2}\%$
- ๑๔) ผงซัลฟานิลไมด์ และผงซัลฟานิลไมด์
- ๑๕) ผงโซดาไบคาร์บอเนต
- ๑๖) น้ำมันพาราฟิน
- ๑๗) ผงกาแฟ (ถ้าในททจะไปไม่มีร้านขาย)
- ๑๘) ทุნიเกต (เชือกหรือสายยาง)
- ๑๙) ปรอทวดไซ

(นอกจากนี้ อาจมียาหรือเครื่องมืออื่น ๆ แล้วแต่เห็นสมควรหรือ
แล้วแต่ความจำเป็น หรือขาดแคลนอย่างไรในสถานททจะเข้าไปนั้น ๆ)

แม่บ้านการเรือน

เครื่องเรือน

ก่อนที่ท่านจะจัดเครื่องเรือน ถ้าหากเอาผ้าชุบน้ำสามส่วนผสมกับ
น้ำส้มหนึ่งส่วน เอาผ้านั้นเช็ดเครื่องเรือนเสียให้ทั่วกัน แล้วจึงจัดดูอย่าง
เคย ท่านจะทึนแรงเขามาก

ไม้ทพ่นสีขาว

เครื่องเรือนที่เป็นไม้และพ่นสีขาวเมื่อยังใหม่ ๆ อยู่จะล้างนานๆครั้ง
ก็ได้ ถ้าได้ขัดด้วยครีมสำหรับเฟอร์นิเจอร์สีขาวอยู่เสมอ บัดฝุ่นละอองให้
หมดเสียก่อนด้วยผ้าสะอาด ๆ แล้วจึงใช้ครีมทาด้วยเศษผ้าให้ทั่ว จะทำให้
พ่นเป็นเงางามดี และฝุ่นละอองก็จะไม่ค่อยจับด้วย

เครื่องเรือน

ให้เป็นสีอ่อน ๆ ไม้ดูดีขนาด เพราะสีแก่จะทำให้ร้อน ม่านหน้า
ต่างที่ใช้สีแก่ เช่น ม่วงแก่หรือแดง ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้นทำให้ห้องร้อน
ขึ้นกว่าปกติธรรมดาทั้งสิ้น ใช้สีนวลหรือใช้ไก่หรือขาวดีกว่า

ขัดล้างสิ่งที่ทำสีขาว

จงเอาหอมฝรั่งมาต้มกับน้ำให้ละลาย แล้วใช้น้ำนั้นขัดดูตามท ๆ เปื้อน
จะใช้สบู่ขัดด้วยก็ได้

วิธีนี้จะทำให้สัณฐานกลับเป็นงามดังเดิม

โต๊ะหรือตู้ ฯลฯ ที่ทำด้วยไม้มะฮอกกานีให้ล้างด้วยน้ำส้มกับน้ำ
ส่วนที่ทำได้ด้วยไม้โอ๊คให้ล้างด้วยเบียร์อุ่น ๆ ไม้วอลนัทให้ใช้ผ้าป่านชุบน้ำมัน
พาราฟินอุ่น ไม้มะเกลือให้ใช้ผ้าขาวนุ่ม ๆ ชุบน้ำมันมะกอก ส่วนที่ลงน้ำยา
ให้ใช้น้ำมันมะกอกผสมกับนมเปรี้ยว

รอยแตก

โต๊ะขดมนั้นที่เป็นรอยต่างเพราะแตกเมื่อนั้น จะแก้ไขได้ด้วยการเอา
ผ้าชุบสีปรีตออฟแคมเฟอร์ แล้วถูให้ทั่วรอยต่าง ทั้งไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงจึง
ค่อยทาน้ำมันออก

เครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยน้ำมันชักเงา ให้ทำความสะอาดด้วยการ
ใช้เศษผ้านุ่ม ๆ ชุบน้ำซาฟรอนอุ่น ๆ ขัดถูให้ทั่วแล้วจึงเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
หนึ่ง

วิธีทำความสะอาดเครื่องเรือนที่ถูกลำเป็นรอยต่างใช้น้ำมัน อะโรกัต์ได้
ผสมกับเกลือ ไม้กอกจุ่มถูให้ทั่วแล้วขัดด้วยผ้านุ่ม

เครื่องเตียงทองเหลือง

เครื่องเตียงที่ทำด้วยทองเหลืองเมื่อจะขัดล้างให้มองใส ให้ใช้ผ้าชุบ
น้ำมันมะกอกทาให้ทั่ว แล้วจึงเช็ดน้ำมันออกและถูให้ขนเงาด้วยผ้าเก่า ๆ นุ่ม ๆ

เก้าอี้

ถ้าเก้าอี้ไม้ของทานมเตียงตั้งเป็นท่นาราคาญทุกครั้งท่นงลง จงใช้ผ้า
กวางขนาดหนึ่งนิ้วพันให้รอบหลาย ๆ รอบ ตรงไม้รอยต่อระหว่างพนักท่นง
กับพนักท่นง ผาพันไว้นนถาจะไหดกควรทาสีให้เขาทบทกบสเก้าอี้เสียดด้วย

ถ้าหมึกหกบนเฟอรินเจอร์ทชดมัน ให้ใช้น้ำส้มผสมกับแอลกอฮอล์
เล็กน้อย จะสะอาด

ล้างรอยหมึกตามประตู

จงเอารังบวบขมทากแห้งชุปน้ำกับส้มแล้วขัดถูตามรอย เปื้อน ตาม
ประตูหน้าต่าง จะออกง่ายสะอาด

ผสมน้ำมันสลัดกับเกลือทาบนโต๊ะ หรือภาตทชดมันซึ่งถูกความร้อน
จากกาน้ำหรือหม้อต่างเป็นดวงขาว ๆ แล้วจึงขัดด้วยน้ำมันชกเงาทหลัง

กระจกหน้าต่างและตู้

กระจกหน้าต่างหรือตู้ทเปื้อนฝุ่นหรือเป็นฝ้า จงใช้ผ้าจุ่มน้ำส้มถูให้
ทั่วแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า แล้วขัดด้วยหนังสือฟอกจะเป็นเงางามดี แต่ถ้าเปื้อน
สีมาก ๆ แทนที่จะขัดให้เป็นการลำบาก จงใช้น้ำร้อนแช่โซดาซักผ้า หรือ
ถูด้วยผ้าจุ่มน้ำมันสนก็ใช้ได้

กระจกหน้าต่างหรือกระจกเงาดี ถ้าใช้ยาขัดทองเหลือง (บราสโซ
หยดลงบนผ้าสักหลาด ๒-๓ หยดแล้วเช็ดถูตามกระจก แทนที่จะเช็ดด้วยน้ำ
จะสะอาดดีกว่า)

เบ็ดกระจก

กระจกหน้าต่าง กรอบรูป ฯลฯ นั้น จะเช็ดให้สะอาดได้ง่ายเร็ว
ที่สุด ด้วยการเอาแปรงชุบ methylated spirits เป็นวิธีที่ดีที่สุด

เกาอชู่ครึ่งแบก

เกาอชู่ครึ่งแบกหรือชู่ใด ๆ ที่บุด้วยหนังอย่างดีราคาแพง จะรักษา

ให้หนังนั้นไม่แข็งแตกเป็นริ้วได้ด้วยการใช้มานุ่ม ๆ สะอาดชุบนมสดดูให้ทั่ว
 ทงไวพอแห้งใช้มาชนสัตว์เช็ดอีกครั้งหนึ่งทำเช่นนั้นเป็นประจำ หนังซึ่งบุเกา
 ชุบน้ำเชกนั้นจะอ่อนนุ่มเป็นเงางาม มีสภาพคล้ายของใหม่อยู่เสมอและมี
 ความทนทานถาวรคุ้มค่าทีเดียว

อีกวิธีหนึ่ง ใช้ไม้กวาดขนไก่บัดกวาดฝุ่น เศษผงซึ่งติดเปื้อนเปื้อน
 อยู่ให้หมดแล้วใช้มาชุบน้ำเช็ดให้สะอาดเสียก่อน จึงเอาแปรงจุ่มไข่ขาวทา
 ทั่วให้ทั่วแล้วทงไว้สักครู่หนึ่ง พอแห้งใช้มาสะอาดเช็ดอีกครั้ง จะมองเห็น
 ทนทว่าหนังทบุเกาอ่อนนุ่มสภาพเหมือนของใหม่และอ่อนนุ่มกว่าเดิม

เตียงนอนเคลือบสี

เตียงนอนทเคลือบสีสวยไว และประดับด้วยโลหะต้องทำความสะอาด
 จงใช้มาชุบน้ำมันสนเช็ดให้ทั่ว รอยเปื้อนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ จะหลุดหายไป
 หมดสิ้น สักจะสัปดาห์สองสามครั้งมาก โลหะที่ประดับก็ไม่ต้องสน

สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามลูกบิดประตู

หรือติดตามเครื่องใช้ที่เป็นโลหะชุบน้ำเกลือใช้ผงดัดฟัน ขัด ๒-๓
 ครั้งก็จะสะอาดดังเดิม

เกาอี้ไม้

โดยมากตามส่วนของข้อต่อต่าง ๆ ข้างไม้มักใช้ลิ่มสลักตอกตรึงให้
 แน่นแทนตะปู เมื่อลิ่มสลักนั้นหักหลุดข้อต่อต่าง ๆ เช่น พนักพิง ขา ท้าว
 แขน ก็จะโยกคลอน ลองใช้น้ำมันจืด ๆ ราดลงเกาอี้โยกคลอนตัวนั้นดู
 แล้วยกไปตั้งตากลมให้แห้ง อย่าตากแดดเป็นอันขาด เมื่อแห้งแล้วท่านจะ

รู้สึกว่ ความโยกคลอนบรรเทาเบาบางลงจริง ๆ

เครื่องใช้ที่หาสีขาว

ถ้าสกปรกหรือใช้ไปนานสีจะมัวและเปลี่ยนเป็นเหลือง จงใช้หัวหอม
ต้มให้เปื่อย เอาน้ำนั้นล้างทำความสะอาด สิ่งสกปรกจะหมด สีที่มัวเปลี่ยน
ก็จะกลับขาวสดใสเช่นเดิม

เครื่องสานที่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์

จงแช่ล้างลงในน้ำเกลือเค็มจัด ๆ จะสะอาดได้

รอยขีดข่วนบนสิ่งของเครื่องใช้

เครื่องประดับบ้านที่เป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อย ใช้ น้ำมันมะกอกหรือ
น้ำมันส่ายชุ ทาถูตรงรอยด้วยผ้านุ่ม ๆ หรือจะใช้ น้ำมันสนกับน้ำมันลินชด
ผสมส่วนละเท่า ๆ กัน ทา เช็ด ถู ไม่นานรอยน้ก็จะหายไป
แต่ถ้าเป็นรอยลึกเขาเนื้อมาก ต้องใช้ ขี้ผึ้งเคียวพอเดือดเหลวอุดทิ้ง
ให้แห้งจึงขัดออกทีหนึ่ง

รอยขีดข่วนเครื่องใช้ที่เป็นสีค่า

ต้องใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทา ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนจึงขัดภายหลัง

รอยขีดข่วนชุดอาหารสีไม้โอ๊ค

ใช้ยาขัดรองเทาสีน้ำตาลทาแล้วจึงขัดภายหลัง

จุดเปื้อนรอยไหม้ที่เกิดจากไม้ขีดไฟ

มีวิธีให้หายได้โดยใช้มะนาวสดผ่าซีกถูตรงรอยไหม้บนของสิ่งนั้น จะ

หายในไม่ช้า

โต๊ะเก้าอี้ สิ่งของเครื่องใช้ที่ขัดมันไว้

เมื่อนำของร้อน ๆ เช่น กาน้ำร้อน จานใส่อาหารร้อน ๆ วางลง

ไปโดยไม่มีสิ่งใดรองรับความร้อนจะทำให้เป็นรอยด่างน่าเกลียด จึงใช้ผ้านุ่ม
ชุบน้ำมันพาราฟินเช็ดถู รอยด่างซึ่งเกิดขึ้นจะหายไป

งาน้าง

สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับบ้านต่าง ๆ ที่ทำด้วยงาช้าง ทั้งไว้นาน
จะมสเปลี่ยนมัวเป็นเหลือง จึงควรรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมเพราะเป็นของ
หายากราคาแพงมาก ด้วยการใช้น้ำมัน ๆ ชุบไฮโดรเจนเพอรอกไซด์ เช็ด
ถูเป็นประจำจะทำให้งาช้างมีสีขาวอยู่ในสภาพเดิมและไม่มี รอย แตก ร้าว ตก
กระด้วย

กระจกและกรอบรูป

การทำความสะอาดกระจกหรือกรอบรูป อย่าปล่อยให้เปียกน้ำตรง
กรอบเพราะจะซึมเข้าไปด้านหลังทำให้กระจกเสีย หรือ ภาพงาม ๆ ในกรอบ
เสีย จึงใช้หนังสืออ่อนชุบน้ำบิดแห้งเช็ดจะสะอาดหมดจดเป็นอย่างดี

อีกวิธีหนึ่งใช้ผ้าชุบแอมโมเนียหอมเช็ด จะสะอาดเช่นเดียวกัน

กรอบรูปที่เคลือบสีทอง

ใช้แปรงอ่อนนุ่มชุบน้ำทาทั้งไว้สักครู่ เช็ดออกด้วยผ้าอ่อน ๆ จะทำ
ให้สีสกปรกที่ติดอยู่ออกหมด และสีทองซึ่งเคลือบไว้ก็จะงามเป็นเงาดูใหม่
ขึ้น

บานประตูหน้าต่าง

เมื่อเปิดเปิดบานประตูหน้าต่างบานไหนมีเสียงดังน่ารำคาญแล้ว จึง
แก้ไขโดยใช้น้ำมันลินซีดหยอดหรือทา หรือจะใช้ผงของใส่ดินสอโรยลงไป
ก็ได้

บางคนต้องการให้ตั้ง เพื่อแสดงสัญญาณให้ทราบว่าใครบีตเบ็ดเข้า
ออกบ้าง

พจนทอทรอยเตกราว

วชชอมพจนทอทรอยเตกราวอย่างง่าย ๆ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ใช้แค่กระดาษหนึ่งลือพมพ์เก่า ๆ ฉีกชนเล็ก ๆ แซกกับน้ำผสม สาร์ ส้ม ทงไว
จนกระดาษละลายเข้ากันมลักษณะชนเหมือนกาว นำมาอุดรอยเตกราวของ
พจนปาดตบแต่งหนาให้เรียบเป็นพจนเดียวกัน ทงไวให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วใช้
สัดเดียวกบพจนทาเคลือบและขัดด้วยยาขัด ท่านจะไม่ทราบว่ารอยร้าวเตกนั้น
อยู่ตรงไหนถ้าไม่สังเกตให้ดี

กลอนหรือสลักประตุนาต่างผิด

ทำให้หนักแรงในการชักชนหรือลง จงเอาผงไส่ดินสอตำเทลงไปใน
ช่องกลอนหรือสลักนั้น

ผงไส่ดินสอจะทำงานให้แก่ท่านได้อย่างน่าพิศวงที่สุดโดย กลอน หรือ
สลักนั้นจะฉนผิดกันเหมือนคนละอัน

กระจกเงาชำรุด

ปรอทซึ่งเคลือบไว้ด้านหลังจะหลุดออกเป็นจุด ๆ จงใช้กระดาษตะกั่ว
สะท้อนแสงปะตรงรอยชำรุด ก็จะยึดอายุกระจกแผ่นนั้นออกไปได้อกนาน
และวิธีป้องกันมิให้กระจกนั้นชำรุดต่อไปได้อก จงใช้เชลแลคบริ-
สุทฐ์ทาเคลือบไว้หนา ๆ

อนึ่งจงพยายามอย่าให้กระจกตากแดดหรือถูกแสงแดดได้ แสงแดด
จะทำให้กระจกผ้ามัว

วัตถุดิบทำด้วยไม้มะฮอกกานี

จะเป็นตู้ กตาเครื่องประดับบ้าน เครื่องใช้ต่าง ๆ ทำจากไม้มะฮอกกานี มวกรรมทำความสะอาดได้ดังนี้ ใช้จุกไม้กอกเก่าขัดถูให้เป็นมันเงางาม จึงใช้ผ้าสะอาดอ่อนเช็ดอีกครั้งหนึ่ง

น้ำซาหรือกาแฟมักจะหกรดพรมอยู่บ่อย ๆ วิชาแก้คือใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น ผสมกับบอแรกซ์เล็กน้อยถูให้ทั่ว

ถารอยเปื้อนเกิดจากผลไม้สกปรกจะแก้ไขยากเล็กน้อย เพราะยาที่จะแก้ไขได้นั้นมีราคาแพงหน่อยหนึ่ง ยาที่คิดดีที่สุดในขณะนี้คือ บายตรงรอยเปื้อนด้วยสปีรตส์ออฟไวน์กับแอมโมเนีย ๒-๓ หยด

พรมสีสดบน

พรมหม่นสีจางแล้ว อาจทำให้หม่นสดได้เช่นใดก็โดยใช้ไมกวาดชุบน้ำผสมน้ำมันสนเล็กน้อยขัดไปมาให้ทั่ว

สีบุ๋มหน้าละเอียด ๒ (ออนซ์) ใส่กระปุกกับน้ำร้อน ๒ ปอนด์จนละลายดีแล้ว และกลับข้างตัว จึงใช้สีบุ๋มทำความสะอาดกับพรมที่ละเอียด ๆ กับน้ำพอชื้น ๆ แล้วเอาแปรง ๆ ให้เข้าในขนพรม เสร็จแล้วเอาสีน้ำมันขัดเอาสีบุ๋มที่ติดตามขนออก จึงใช้ชุบน้ำเช็ดออก ถ้าพรมนั้นสกปรกให้ใช้น้ำเกลือเช็ดแทนน้ำธรรมดา เวลาเช็ดอย่าให้เปียกมากพอชื้น ๆ เท่านั้น

ให้เอาเกลือป่นโรยลงบนพรมให้ทั่ว แล้วเอาผ้าชุบน้ำอุ่น ซึ่งผสมกับน้ำมันสน ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ๑ ควอตซ์ให้ทั่วจนเกลือออกหมด

จะทำให้พรมสะอาดแลดูใหม่ขึ้น ทงกันมดปลวกไม่ให้รบกวนด้วย ถ้าพรมเปื้อนน้ำมันเป็นจุด ๆ ให้ใช้กระดาษ ขั้ว วางทตรงรอยเปื้อนแล้วรดด้วยเตารีดร้อน ๆ

สี่สี่แปด

เพื่อประโยชน์แก่การที่จะทำพรมให้สะอาดจากการเปื้อนสี จงทาน้ำมันสนลงบนส่วนที่เปื้อนแล้วใช้กระดาษซับที่ลงบนน้ำมันสนนั้น ทิ้งไว้หลาย ๆ ชั่วโมง กระดาษซับนั้นจะดูดสีหมดทีเดียว

ใช้ท่อยางเก่า ๆ ตัดเป็นท่อนขนาดพอเหมาะ ตัดพรมแทนท่อนไม้ จะให้พรมทนชนออกมา

ถ้าไม่จำเป็นแล้วอย่าทำให้พรมเปียกหรือ ชน บ่อย ๆ เมื่อล้าง รอยเปื้อน หรือทำให้สีพรมใหม่ชนด้วยโซดาซักผ้าผสมกับดิวาเชดพรมแล้ว ก็ต้องเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด ๆ ออกครึ่งหนึ่ง แล้วเอาออกไปตากในที่กลางแจ้งให้แห้งโดยเร็ว

พรมน้ำมันที่เปื้อนจะเปื้อน จงใช้น้ำมันอย่างเลวๆ ให้แห้งแล้วขัดด้วยน้ำมันสน ทำเช่นนี้สัก ๒-๓ สัปดาห์ต่อครั้ง กับในระหว่างวันเหล่านั้นควรใช้ผ้าชุบน้ำถูทุกคราวที่ขัดกวาด จะทำให้ความทนทานมากขึ้น

พรมน้ำมันถ้าจะให้ดูใหม่ชน ให้เอาผ้าชุบน้ำเปรี้ยวเช็ดจะดูสีสนใหม่ชน ทั้งเป็นเงางามอีกด้วย

ล้างเสื่อฟาง

เอาผ้ามาวนให้เป็นก้อนจุ่มลงในเกลือผสมกับน้ำ ถูให้ทั่วแล้วเอาผ้าชุบน้ำที่สะอาดเช็ดออกครึ่งหนึ่ง เสร็จแล้วจึงผึ่งแดด อย่าใช้สบู่ฟอกเสื่อฟาง เพราะจะทำให้เส้นฟางที่สานนั้นนุ่มสลาย

เสื่อ

ถ้าเสื่อสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยการมัดเอาฝุ่นละอองออกเสีย

ก่อน แล้วเอาแปรงแข็ง ๆ ชุบน้ำเย็นผสมเกลือแปรงให้ทั่วเนื้อแล้วผึ่งแดด
ไวกลางแจ้งจนเนื้อแห้ง

ล้างกรอบรูป

กรอบรูปซึ่งมีลวดลายและทาทองนั้น ถ้าเปื้อนน้ำมันซึ่งทำด้วยไข
สัตว์แล้ว ให้ชำระด้วยเอาผ้าชุบน้ำมันเบนซินเช็ด (ระวังไฟให้มาก ๆ ขณะ
ทำงาน) ถ้าหากเปื้อนสกปรกเพราะสิ่งอื่นเช่น ควันรม ให้ล้างด้วยน้ำโซดา
แล้วเช็ดด้วยเนื้อในขนมปังก็จะสะอาดดี

ในขณะที่ล้างกรอบรูปนี้ให้ถอดเอารูปข้างในออกถ้ามีฉนวนรูปจะเสีย

ล้างขวดปักดอกไม้

ใส่ทรายลงในขวดพร้อมกับน้ำเล็กน้อยแล้วเขย่าให้ทั่ว ถ้ายังไม่
หมดคราบสกปรกก็ใช้ผ้าพันไม้เช็ดให้ทั่วแต่ถ้าเจก้นนั้นปากแคบ และตรง
กลางขวดใหญ่ ก็ให้ใช้ล้างด้วยแอมโมเนียประมาณ ๓ ชั่วโมงก็จะสะอาดดี

พรมปูห้อง

ต้องการทำความสะอาดอย่าใช้ไม้กวาดอ่อนกวาดจะทำให้ พรม ชำรุด
ง่าย ควรใช้แปรงขนสัตว์หรือไม้กวาดก้านมะพร้าว แปรงหรือไม้กวาดที่ใช้
ชุบน้ำมันสนหรือแอมโมเนียเล็กน้อยก่อน ผูกตดพรมจะออกได้มาก จงสะบัด
หลายครั้ง แล้วใช้ผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง

พรมทึบราคาแพง

ถ้าถูกน้ำหมักหรากลดเปรอะเปื้อน จงรีบใช้กระดาษซับน้ำหมัก
ออกให้แห้งเสียก่อน แล้วเอาผ้าหรือแปรงจุ่มน้ำหมักถู แปรงตรงรอย

เปื้อนมาก ๆ น้ำแข็งขาวโพลโรยประทั้งไว้สักคนหนึ่ง รุ่งขึ้นจึงมัดแบ้งออก
พรมจะสะอาดเช่นเดิม

พรมน้ำมัน

ก่อนปูพรมน้ำมันลงบนพรม ๆ ต้องการ จึ่งใช้แบ้งผงบจะเป็นแบ้ง
อะไรก็ได้โรยลงให้ทั่วบริเวณนั้นเสียก่อน

พรมน้ำมัน

พรมน้ำมันเป็นเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหายได้ง่าย ๆ ถ้าโดนอากาศ
เย็นจัดมากหรืออากาศร้อนจัดมากก็จะเปราะและแตกง่าย ควรเก็บไว้ใน
สถานที่ที่อุณหภูมิ ๗๐ องศา ฟ. และเมื่อไม่ใช้จะนำเข้าไปเก็บก็ต้องม้วนไว้
เชือกเหนียวมัดอย่าให้แน่นนักและวางลง ไม่ควรใช้ตงพม นอกจากจะมี
ปลอกกระดาดแข็งสวมทับอีกทีหนึ่ง

พรมสีสดทน

ถ้าเอาแปรงชุบน้ำร้อนผสมกับน้ำมันสนเสียก่อน แล้วเอาแปรง
นั้นเช็ดผงบให้ทั่วพรมทำดังนี้ไว้เสมอ ๆ พรมนั้นจะมีสีสดทนนาน

พรมสีตก

ถ้าหากพรมที่ใช้ปูสีตกจางไปจะช่วยให้กลับสดขึ้นได้ด้วยการ เอา ผ้า
ชุบน้ำอุ่น ๆ ผสมกับผงบอแรกซ์หนึ่งช้อนโต๊ะและแอมโมเนีย เช็ด ให้ทั่ว ผืน
พรม แล้วจึงเอาผ้าชุบน้ำเปล่าเช็ดอีกครั้งหนึ่ง

พรมปูห้อง

ไม่มีสิ่งใดที่จะมองดูเด่นในห้องเท่ากับพรมที่มีงามสดได้ ดังนั้นผู้ที่
มีจึงควรเอาใจใส่ในเครื่องแต่งห้องที่มคานเสมอ

พรมเก่า

พรมที่สดหรือเก่านั้น ถ้าเอาผ้าชุบน้ำผสมกับน้ำส้มเช็ดให้ทั่ว
ของพรมจะดูใหม่และสดใสขึ้นจนแปลกตา

น้ำมันเปื้อนพรม

ถ้าน้ำมันหกเปื้อนพรม ให้เอากระดาษซับปิดตรงรอยเปื้อน แล้ว
เอาเตารีดร้อน ๆ รีด จนกระทั่งกระดาษซับน้ำมันทั่วแล้ว จึงใช้ผ้าชุบน้ำ
สัปปีร์ติดออฟเทอเพนไทน์เช็ดที่ตรงรอยเปื้อนนั่นให้ทั่ว

ແຈກນໍ້ສກປຣກ

ราดน้ำส้มลงในกาชახเปียกให้ลงในแฉกที่สกรปรกเขย่ามากๆ หน่อย
แล้วล้างด้วยน้ำเย็นแฉกนั้นจะสะอาดดีมาก

ถ้าหากท่านมีแฉกที่ปักดอกไม้ ซึ่งมีปากหนักกว่ากัน หากเอาทราย
ใส่ลงในแฉกนี้เสียก่อนราว ๆ สัปดาห์ ๑/๔ ของแฉกแล้วจึงใส่น้ำลง ทราย
นอกจากจะทำให้แฉกนี้มีกลิ่นมันชื้นแล้ว ยังทำให้ก้านดอกไม้ไม่ทยิดเหี่ยว
ซึ่งจะไม่ร่วงหรือเอนเอียงได้ง่าย

วิธีไล่มด

จงใช้ผงกำมะถันโรยลงไปตรงที่มดมาก มดจะหนีไปหมดโดยเร็ว
ออกฤทธิ์หนึ่งทศวรรษได้ผลดีมาก ตัดมันฝรั่งออกเป็นชิ้นยาว ๆ เล็ก ๆ
นำไปชุบแอมโมเนียให้เปียกโชกแล้วนำไปวางไว้ใกล้ ๆ ที่มด มดจะรีบ
หนีโดยเร็วเช่นกัน

วิธีไล่มุง

ในห้องของท่านถ้ามีมุงและแมลงเล็ก ๆ ชุกชุม บินและกัดทำความ

ราคาแพงเท่านั้น จึงใช้การระบุนแท่งผูกเชือกแขวนไว้ใกล้โคนไฟฟ้า ความ
ร้อนจากหลอดไฟจะทำให้การระบุนระเหยกกลับตาลปัตรเร็วเหล่านี้ บินหนีไป
ได้แต่ก็คงไม่หมดทีเดียว เพราะยุงบางตัวไม่กลัวยาอ่อน ๆ

แมลงรบกวนเบียดเบียน

ภายในเบียดเบียนมีสัตว์เล็ก ๆ อาศัยอยู่บางชนิดกัดแทะทำลายไม้ทำ
ให้ชำรุดเสียหายได้ โดยเฉพาะเช่นมอด จึงนำการระบุนแท่งใส่ไว้จะไล่แมลง
เหล่านี้ไปหมดสิ้น

ก้นตัวสัตว์

กลิ่นซักหรือโตะ ที่เก็บของซึ่งจะไม่ให้เกิดตัวสัตว์หรือเตยงนอนททำ
ด้วยไม้ ตูเสื้อผ้าหรือตู้หนังสือ พนห้องนอนเหล่านี้ ถ้าจะป้องกันไม่ให้
ตัวเลือด ไร มอด ฯลฯ ซึ่งจะทำลายเสื้อผ้าหรือหนังสือให้เสียหายไปเหต
นี้ ให้ใช้ลางชดด้วยนาทมส์มด้วยเกลือก อาบนานชนิดกลิ่นลาเวนเดอร์และ
การระบุนก็จะป้องกันสัตว์เหล่านี้ได้ ทั้งจะทำให้เสื้อและหนังสือมีกลิ่นหอม
ชื่นใจอีกด้วย

ฆ่าตัวสัตว์

ถ้าจะล้างห้องให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและตัวสัตว์ต่าง ๆ เช่น
เลือด ไร มอด ฯลฯ ดายหมดแล้ว ให้ใช้น้ำส้มผสมกับเกลือกอาบ น้ำ
กลิ่นลาเวนเดอร์ ๑ กำมือ และการระบุน ๑ ช้อนโต๊ะ เมื่อละลายแล้วใช้ลาง
พน ลางตุ และเตยงไม้ดุนก นอกจากจะได้ประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังจะ
ทำให้เตยงนมนมีกลิ่นหอมอีกด้วย

๒-๓ เดือนใช้น้ำยาทผสมดังนี้ ลางในตู้หนังสือเสียครึ่งหนึ่งกต จะ

ทำให้ตัวมอดตายหมด

มอดกินเครื่องเรือน

มอดที่เกิดขึ้นในวัตถุเป็นไม้ให้รีบกำจัดเสีย ถ้ามันนั้นมันจะกินลามไปทั่วทั้งห้อง วิธีกำจัดอย่างหนึ่งก็คือชนเครื่องเรือนที่มอดเกิดขึ้นไปไว้ในห้องที่ว่างห้องหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเลย แล้วปิดหน้าต่างประตูให้หมดทุกบาน เอาถังไล่เล็ก ๆ ที่ใส่ถ่านไฟไหม้เรียงบรายนแล้วตั้งไว้กลางห้องและ ไล่ ก่อน กำมะถันลงหลาย ๆ ก่อน ปิดประตูทั้งไว้สัก ๕ หรือ ๖ ชั่วโมง จึงเข้าไปเปิดประตูหน้าต่างให้ควันออก ภายหลังที่ทำเช่นนั้นแล้ว ทั้งตัวมอดและไข่มอดจะตายจนหมดสิ้น

ป้องกันมอด

ตัวมอดเป็นแมลงที่ทำลายเครื่องใช้ในบ้าน เรือน ตลอด จน ตัว เรือน มากกว่าแมลงอื่น ๆ และเป็นเวลาเร็วด้วยดังนั้นจึงควรระวังให้มาก ในเวลาที่ท่านไม่อยู่บ้าน เช่นไปเที่ยวตากอากาศตามหัวเมือง เป็นต้น บางคนใช้ผ้าใบปิดเครื่องเรือนเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองจับ แต่ความจริงความมืดนั้นแหละที่ทำให้ตัวมอดเกิดขึ้นได้เร็ว วิธีที่ดี ควรจะใช้น้ำมันเบนซินพรมบนเครื่องเรือนและผ้าห่มนอน จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวมอดจับได้

กำจัดมอด

ก่อนที่จะเก็บเสื้อผ้าที่เป็นสักหลาดและเฟอร์ไว้นิตู้ ให้เอาออกผึ่งตากกลางแจ้ง แล้วสะบัดให้ทั่ว เสร็จแล้วใช้แปรง ๆ ให้หมด แล้วม้วนให้ตึงใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หลาย ๆ แผ่น ซ้อนกันห่อเสื้อก่อนเก็บไว้ หมักที่พิมพ์ตัวหนังสือในหนังสือพิมพ์นั้นแหละจะกำจัดตัวมอดได้

อีกวิธีหนึ่ง ก่อนที่จะเก็บเข้าตู้ ให้ใช้เกลือเอปซอม (หาซื้อตาม

ทางซ้ายขวา) ไรยเลื่อเลื่อมวนเลื่อใช้กระตาส หนึ่งสี่ พิมพ์ ห่อ อย่าง วิชา
ข้างต้น

วิธีการอัดแมลงวันในครัว

เอากรตคาบอลิคใส่ลงในเตาไฟ ควันของมันจะไล่แมลงวันไปหมด
หรือจะใช้ต้นสำระแห่นแขวนไว้ตรงที่ประตูและหน้าต่าง แมลงวันก็จะไม่มา
เหมือนกัน

การจัดดอกไม้

ศิลปการจัดดอกไม้ประดับห้อง

ดอกไม้สดนั้นไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ บ้านใดเรือนใด ไม่มีต้นไม้ ดอกไม้ประดับบ้านและห้องบ้าง ก็ดูจะแห้งแล้งไม่น่าอยู่เลย และสำหรับเมืองร้อนอย่างเมืองเรา ต้นไม้และดอกไม้ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุที่ต้นไม้และดอกไม้เป็นของสำคัญในการจะทำให้บ้านเป็นบ้านอย่างสมบูรณ์ การจัดและปลูกต้นไม้จึงเป็นวิชาอันหนึ่งของแม่บ้านทั้งหลายในประเทศและไทยตามทฤษฎีกัน ศิลปะของการจัดดอกไม้ประดับห้องในสมัยนี้ มักจะจัดให้เข้ากับแจกันหรือซามที่ปักดอกไม้ เช่นเป็นซามก็จัดดอกไม้ย่อย ๆ เช่น ช่อกล้วยไม้ แจกันรูปขวดสูง ๆ ก็ใช้ดอกไม้ทาก้านแข็งช่อยาว ๆ ให้เหมาะกันออก ทั้งจะต้องพิถีพิถันในเรื่องสีของขวดปักดอกไม้กับสีดอกไม้ให้แลดูกลมกลืนอีกด้วย

นอกจากนี้ ถ้าในห้องเดียวกันนั้นมียอดปักดอกไม้หลายยอด ซึ่งจะปักดอกไม้ทุกยอดแล้วจะต้องให้สีของดอกไม้ที่ปักเป็นสีเดียวกันจึงจะแลดูสวยงาม เช่นยอดหนึ่งดอกไม้สีเหลือง ยอดอื่น ๆ ก็ต้องให้เหลืองเข้าชุดกันเหมือนกันหมด ทั้งนี้เพราะถ้าจะใช้สีต่างกัน บางทีก็จะแลดูไม่งามตา เช่นยอดหนึ่งเป็นสีเหลือง อีกยอดหนึ่งเป็นสีแดง ดังนั้นจะดูไม่เรียบร้อยไม่เย็นตา

การปลูกต้นไม้ดอกก็เหมือนกันมักจะนิยมปลูกให้เป็นหมู่หมวด ตามชนิดและสีของดอกไม้เป็นแปลงไปเช่น ดอกกุหลาบสีแดงก็รวมกันเป็นแปลงหนึ่ง สีชมพูก็อยู่อีกแปลงหนึ่ง ไม่ให้สับสนกัน ทั้งนี้เพื่อในเวลาที่มีดอกจะได้ดูงามยิ่งขึ้น

ดอกไม้และต้นไม้

ดอกไม้ที่มีก้านยาวทุกชนิดผ่าตรงปลายก้านประมาณครึ่งนิ้วแช่น้ำไว้วันต่อไป ตัดตรงนั้นทิ้งแล้วทำอย่างเมอวานนอก แต่เปลี่ยนน้ำ ภาชนะทำให้ดอกไม้สดสวยเสมอ

ดอกไม้ก้านยาวทุกชนิด ผ่าปลายก้านประมาณครึ่งนิ้วใส่ในขวดที่มีกลิ่นเชอลิน อุดจุกให้แน่น ยาดวายนาชงละลายร้อน ๆ ดอกไม้นั้นจะสดอยู่ได้มากกว่า

จุ่มช่อดอกไม้ลงในน้ำกาวยาโรบิคอย่างใส แชวนไว้ให้แห้ง ทำเช่นนั้น ๒—๓ ครั้งดอกไม้จะสดอยู่หลายเดือน

เสียมก้านดอกไม้ให้แหลมปักในหัวมันฝรั่ง จะทนอยู่ได้อาทิตย์กว่า แอมโมเนียหยดลงในแจกัน ๒—๓ หยด จะทำให้ดอกไม้สดอยู่นานกว่าปกติมาก และน้ำก็ไม่เหม็น

แอสไพรินหนึ่งในสี่ของเม็ดละลายลงในน้ำที่มิดอกไม้ปักอยู่ จะทำให้ดอกไม้สดกว่าปกติมาก

ฟองสบู่ที่ซักผ้าแล้วเป็นปุ๋ยดีสำหรับต้นกุหลาบ

น้ำมันมะกอกวางไว้ใกล้ต้นเฟิร์น จะทำให้ต้นเฟิร์นโตเร็วและงด

ต้นไม้ปลูกในร่ม เอาฟองน้ำชุบน้ำผสมกับน้ำนมเล็กน้อยถูใบ
แต่เบา ๆ ทั่ว ใบจะเงางามดีบ้องกันไม่ให้ใบเป็นรอยเกรียมขึ้นตามใบได้
ด้วย อย่าเอาน้ำธรรมดารดใบเป็นอันขาด จะทำให้ใบเป็นรอยเกรียมขึ้น
งาม

ดอกไม้โดยมาก ก้านมักจะไม่ตรง ถ้าจัดในแจกันปากกว้าง ๆ
ก็ยากจะจัดให้ตรงได้ ถ้าหากท่านหาหลอดตาช่วยช่วยมาตัด แล้วสอดรอบ
ภายในแจกันให้พนักขนานกันดีหน่อย แล้วจึงปักดอกไม้ลงไป เมื่อปัก
เสร็จแล้ว ดอกและใบจะคลุมจนไม่เห็นหลอดตาช่วย

ดอกไม้ปักไว้นานจะทนทานขึ้น ถ้าหากรักษาน้ำที่แช่อยู่ในนั้นให้
สะอาด จดตัดใบที่ตกค้างอยู่อย่าแช่ลงในน้ำ และน้ำนั้นให้ใส่น้ำตาลลงไป
ด้วยเล็กน้อย

๕ เสือผ้า

๑ ปัญหาเรื่องการชักผ้า

แม่เรือนโดยมากมีความเห็นว่า การชักผ้าทุก ๆ วันเป็นการเปลือง
โดยใช้เหตุอย่างหนึ่ง เช่นเปลืองสบู่ เปลืองน้ำเป็นต้น แต่ความจริงการ
ชักผ้าทุกวัน ๆ สะเล็กน้อย คือการประหยัดทรัพยากรจะขอเสือผ้าอย่างหนึ่ง
นอกจากจะทำให้สะอาดและถูกอนามัย เพราะว่าเสือผ้าที่เราใส่วันหนึ่งๆนั้น
ถึงจะไม่เปื้อนสกปรกอย่างอื่น ก็ต้องเปื้อนเหงื่อไคลของเราเอง ซึ่งถ้าหาก
ทิ้งไว้นาน ๆ วันจึงชัก เหงื่อไคลนั้นก็จะจับเขาแน่น ทำให้ชักไม่ค่อย
หมดคราบ แล้วเสือผ้าก็จะเปื่อยขาดเร็ว เพราะกรดที่เกิดจากเหงื่อมันกัดผ้า

อีกประการหนึ่ง กลิ่นสาปทเกิดจากเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหมกทั้งตัว ก็เป็นโทษแก่
การหายใจของเราเองด้วย

ล้างนํ้ามันคิน

ใช้กลีเซอรินทาที่ตรงรอยเปื้อนจะทำให้มันอ่อนตัวลง แล้วเอาผ้า
หรือแพรทเปื้อนนั่นเช็ดลงในนํ้ามันเบนซิน (เฉพาะที่ตรงรอยเปื้อน) ทั้งไว้
สักครู่ แล้วจึงเอาซักด้วยนํ้าอุ่น ซึ่งผสมกับแอมโมเนียเล็กน้อย

ประโยชน์ของแอมโมเนีย

แอมโมเนียหรือที่เรียกกันอย่างสามัญว่าเยี่ยวอุฐุนั้น เวลาที่จะซัก
ผ้าไหมนอนหรือผ้าสักหลาด ถ้าเอาแอมโมเนียหนึ่งช้อนชาผสมลงในนํ้าแล้ว
เอาของที่จะซักจุ่มลงและขย แอมโมเนียจะช่วยกัดสิ่งโสโครกออกได้ง่าย และ
นอกจากนั้น แอมโมเนียยังทำให้ผ้าเนออนุ่มไม่กระด้างดอกด้วย

ซักไหมพรม

ถ้าจะซักเครื่องใช้ที่เป็นไหมพรมก่อนลงมือซัก ต้องเอาแช่นํ้าเย็น
ทั้งไว้ก่อนอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมง การทำเช่นนั้นจะทำให้ไหมพรมนุ่มไม่
แข็งกระด้างเมือแห้งแล้ว และทรงรักษารูปให้คงที่อยู่ด้วย

เสื้อผ้าที่ทาด้วยขนสัตว์ เมือจะต้องซักให้ซักในนํ้าสบู่อุ่น ๆ เวลา
ซักนํ้าเปล่าก็ให้ซักนํ้าอุ่น ๆ เช่นกัน ห้ามบิดแต่ใช้บีบให้นํ้าออก แล้ววาง
ลงบนผ้าเช็ดตัวขนหนูผืนไว้ในร่มจนแห้ง

เสือกั้กับกระโปรงแพรขาว

ภายหลังที่ซักสะอาดได้แล้ว เมือจะซักนํ้าเปล่า ควรผสมกับเหล้า
เมทิลเลต ๒—๓ หยด จะทำให้แพรขาว

ทำให้ผ้าขาว

เวลาซักผ้าการที่จะให้ผ้าขาวมาก ๆ นั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับเอาน้ำมัน
สนสักสามสี่หยด ๆ ลงในน้ำที่ใช้ซักผ้า

ซักถุงแพร

ถ้าน้ำหมักเปอนถุงแพร จงแช่ลงในน้ำส้มสักสองชั่วโมง แล้วขย
เบา ๆ แล้วซักน้ำก็จะสะอาดดั่งเดิม

ถุงเท้าดำ

ถุงเท้าสีดำ ถ้าจะไม่ให้ดูเก่าเร็ว เมื่อซักบ่อย ๆ แล้วให้ลงคราม
ภายหลังที่ซักสะอาดแล้ว ครามที่ใช้นั้นควรผสมแก้ ๆ เสียหน่อย

ซักผ้าผ้าน

ก่อนที่จะซักผ้าผ้านนั้น ถ้าหากเอาลงแช่ในน้ำเย็นซึ่งได้ใส่เกลือผสม
ลงไปด้วยสองกำมือท่านจะได้รับความประหลาดใจที่ผงจับผ้าและสกปรกที่ผ้า
จะหมดไปอย่างง่ายดาย

ซักกำมะหยี่

ซักน้ำส้มเจือสะอาดอย่างบิดอย่างผ้าธรรมดา จงใช้รดหรือที่บนน้ำออก
ให้หมด สบัดให้คล้ออกเอาข้างขนองไฟจนแห้ง แล้ววางบนผ้าห่มนอนนุ่ม ๆ
ค่อย ๆ ระวังรดทางข้างใน

เสื้อผ้าขนสัตว์

เมื่อจะซักเสื้อผาที่ทำด้วยขนสัตว์ให้เอาสบู่อย่างเป็นเกล็ดใส่ลงในน้ำ
เปล่า แล้วจึงซัก เมื่อจะซักผ้าสักหลาดสีเทาให้ใช้น้ำส้ม ๑ ช้อนชาลงไป
ในน้ำที่จะซัก

ซักผ้าหมั่นนอน

การซักผ้าหมั่นนอนของท่านจะง่ายเข้าสองเท่าตัว ถ้าหากท่านใช้น้ำเย็นผสมเกลือหยาบ ๆ ครึ่งปอนด์ครึ่งคนไว้ เขายกผ้าขนจากน้ำเกลือ บีบเอาน้ำออกจนหายโซกแล้วซักด้วยน้ำสบู่มผสมแอมโมเนีย

ถ้าอยากจะให้ถุงเท้าแพร เสื้อหรือสิ่งอื่นที่ทำได้ด้วยแพรหรือไหมเป็นมันอยู่เสมอ ควรซักด้วยสบู่ลูกซ์ในน้ำอุ่น ๆ แล้วเอามาถ่ายไปมาในน้ำสะอาด ซึ่งผสมด้วยแอลกอฮอล์หนึ่งชอนชา ทำดังนี้ ๓ ครั้ง แพรหรือไหมของท่านจะมันคงทนอยู่เสมอ

วิธีซักแพร

การซักแพรห้ามไม่ให้เอาสบู่และไม่ต้องแช่ด้วย ให้ตั้งสบู่เป็นชั้นเล็ก ๆ ใส่ในซามอ่างซึ่งมีน้ำอยู่แล้วตักให้เป็นฟอง (น้ำที่ใช้ซักแพรนี้ ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะดีกว่าน้ำเย็นมาก) เอาแพรลงแช่ ห้ามไม่ให้ขยี้ เสร็จแล้วซักน้ำเปล่า ๆ อีกหน แล้วจึงลงคราม (ถ้าเป็นแพรขาว) อย่าบิดอย่างฉะฉวมตาเพราะเนื้อแพรจะรวม จะให้หมดน้ำก็ใช้บีบเท่านั้นเป็นพอ

ถ้าจะให้แข็งใช้กาวยละลายน้ำอย่าใช้แข็ง สำหรับแพรมัตถนวล เมื่อซักน้ำเปล่าให้หมดสบู่แล้ว แทนที่จะเอาไปตากเฉย ๆ ให้เอาลงแช่ในน้ำชาเย็น ๆ สักครู่หนึ่งแล้วจึงตาก จะทำให้สีนวลสดใสนอก

มวธซักแพรอย่างหนึ่ง แต่เป็นการเปลืองเงินมาก ควรจะใช้สำหรับซักแพรราคาแพง ๆ คือซักด้วยน้ำมันเบนซินลงในซาม เอาแพรจุ่มลงและขย้าอย่างเร็วที่สุด มิฉะนั้นน้ำมันจะแห้งเสียหมด ถ้ามรอยด่างหรือเปื้อนสีตรงไหน ต้องถูและขย้าตรงนั้นให้มากแล้วเอามาผึ่งบนราว พอแห้งหมาด

กรตทเดยว การชักเช่นนี้จะทำให้แพร่ไหมและส่วยกว่าชักด้วยน้ำธรรมดา
กับรอยเประเปอนก็จะหายไปหมดด้วย

ชักเสียดก

เสื่อเสียดเตอร์หรือเสื่อถกจมเปอร หรือจะเป็นผ้าห่มผ้าพันคออะไร
ก็ตาม เมื่อถึงคราวชักมันจะเลเยเสีย ๆ มาก เพราะมันจะยืดยาวเกินขนาด
ไปหมด วิชาชักจะไม่ทำให้เสียมเคล็ดล้อยู่เพียงเล็กน้อย คือแทนที่จะชัก
และขยเหมือนผ้าธรรมดา ก็คือให้เอาเชล่งในน้ำอุ่น ๆ เสียก่อน ทั้งไว้
ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วจึงเอาชนจากน้ำอุ่น ยกชนทงบนเอาขยาในน้ำอุ่น ขย
ไม่ได้ เมื่อเห็นว่าสะอาดดีแล้วเทน้ำเก่าออกเปลี่ยนน้ำใหม่ลงหลาย ๆ ครั้ง
จนหมดคราวอุ่น และเสื่อสะอาดดีแล้ว ยกเสื่อชนทงบน บินน้ำออกเสีย
แล้วคลเสื่อออกวางราบบนแผ่นกระดานทงตากไว้ให้แห้ง

ชักเครื่องขาวที่สกปรก

ผ้าที่ทำด้วยฝ้ายหรือลินินขาว ถ้าเปอนสกปรกหรือมัวหมองไปไม่
สะอาดแล้ว ให้เอาเชล่งในน้ำอุ่นเจือโซดาเล็กน้อยค่างคั้นไว้ แต่ก่อนที่จะ
แช่ให้เอาลงจุ่มน้ำอุ่นบนโซดานั้นทีละตัว ใช้สับถูตามทเปอนมาก ๆ นั้นด้วย
พอรุ่งเช้าให้ขยให้ทวน แล้วเอาลงต้มกับสบู่ชนเล็ก ๆ สัก ๑๕ นาที ถ้า
เครื่องใช้ทมเป็นกระทะหรือกระป๋องเหล็กให้หาผ้าห่อ เสื่อผ้าที่จะต้มนั้นก่อน
ด้วยเพื่อไม่ให้สนิมเหล็กจับ ต้มแล้วเอาลงมาขยน้ำเปลาเสียสองน้ำ
ให้หมดสบู่แล้วจึงลงคราม สำหรับผ้าลินินไม่ควรบิด ให้เอาตากทงทชุ่มน้ำ
อยู่ เมื่อแห้งแล้วจะได้แข็งชน และเวลาทรดจะได้เป็นมันดี

อีกวิธีหนึ่ง ให้ต้มกับเปลือกไข่และสบู่ ไม่ต้องแช่โซดา เปลือก

ไซ้จะทำให้เสื้อผ้าขาวสะอาดดี

ซักผ้าสักหลาด

ไซ้สับดู ๆ หันเป็นชั้นเล็ก ๆ ใส่ลงในน้ำร้อนจัด ๆ แล้วเอาผ้าลงซัก ห้ามไม่ให้ขย แต่ใช้มือบีบให้หมดน้ำและถ้างไม่หมดเปื้อนให้ซักเป็นหนที่สองออก ใช้น้ำร้อนจัด ๆ ผสมสบู่อย่างทุกกล่าวมาแล้วบีบให้หมดน้ำแล้วไม่ต้องใช้น้ำเปล่าซักออก ตากกลางแจ้งและต้องคอยมันส์บดบ่อย ๆ จนแห้ง

ซักผ้าสักหลาดอ่อน

ไซ้ฟองสบู่ผสมกับน้ำอุ่น (ไม่ใช้น้ำที่ต้มจนเดือด) อย่าใช้โซดา เพราะจะทำให้สีตก ฟอกเพียงเล็กน้อยและตากให้แห้ง ใช้มือรีดพอควรในเวลาตาก เวลาซักอย่าขยเป็นอันขาด

นมเปรี้ยวมีธาตุที่จะพอกผาตินนม มีกลิ่นให้ขาวขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงมากด้วย ผาที่เป็นดอกดวงลวดลายเช่น ผ้าโปร่ง ผ้าเช็ดหน้าปัก ผ้ามัน หรือผ้าบ้าน ซึ่งมองดูเหมือนและไม่มองได้ ใช้ซักในนมเปรี้ยวก็จะขาวสะอาดขนทนนาน วัชชกครั้งแรกซักอย่างธรรมดา แล้วซักด้วยน้ำอุ่น แล้วเอาใส่ลงในหม้อพร้อมกับนมเปรี้ยว และปิดฝาทิ้งไว้ ๒ วันหรือยิ่งกว่านั้น แล้วจึงนำมาซักให้สะอาดหมดจด แล้วจึงลงครามอ่อน ๆ และตากแดดจนแห้ง

ผาตินขาวหรือผ้าดำ ถ้าเปื้อนยางผลไม้ ให้แช่ลงในนมเปรี้ยวสักครึ่งชั่วโมง แล้วจึงซักด้วยน้ำสับดู ๆ รอยเปื้อนก็จะหายไป ถ้าเปื้อนหมึกทำอย่างเดียวกันแต่ต้องทำทันที สำหรับที่เปื้อนสนิมเตารีดให้แช่ในนมเปรี้ยว ๒๔ ชั่วโมง แล้วซักด้วยน้ำร้อน

การชักผ้าด้วยวิธีลัด

การชักผ้าทรวมกันมาก ๆ นั้น จะชักสะดวกขึ้นอีกมากหากจะใช้วิธีดังต่อไปนี้ช่วย

วิธีที่ ๑ ให้เอาน้ำ ๓๐ แกลลอนผสมกับน้ำประสานทองครึ่งปอนด์ แล้วเอาเสื้อผาลงแช่ค้างคืนไว้คืนหนึ่ง เช้าจึงเอาขึ้นตึงไฟต้ม ถ้าเสื้อผาสกปรกมากให้ใส่น้ำประสานทองลงอีกเล็กน้อย เสื้อผ้าจะขาวสะอาดโดยไม่ต้องใช้สบู่ซักฟอกอีก และไม่กัดมือให้เปื่อยด้วย วิธีนี้ใช้ชักเสื้อผ้าของคนเจ็บได้ดีมาก ชักสักหลาดอ่อนด้วยวิธีนี้ทำให้สักหลาดไม่แข็งกระด้าง แต่เนื้อจะนุ่มอย่างเดิม ผ้าลูกไม้หรือริบบิ้นต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน

วิธีที่ ๒ ก่อนที่จะชักเสื้อผ้าตามนํ้ามันพาราฟินลงในน้ำที่ ชักสัก ๓ ช้อนโต๊ะ จะทุ่นแรงชักฟอกได้อีกมาก

วิธีที่ ๓ เวลาชักเสื้อผ้าตามผงโบเร็กซ์ลงไปด้วย รอยเปื้อนที่คอที่ขมอมเสื้อหรือรอยต่าง ๆ จะหลุดได้ง่าย ๆ ผ้าปูโต๊ะที่เปื้อนน้ำชา ถ้าชักตามวิธีนี้ก็ได้ดี

วิธีที่ ๔ เมื่อนำมาชักฟอกลงต้ม เอานํ้ามะนาวขึ้นใหญ่ๆ ใสลงไปด้วยสัก ๒-๓ ชัน โดยไม่มีการเสียหายแก่ผ้านนด้วย

ชักผ้าสี

ผ้าสีห้ามไม่ให้แช่ ให้ชักแต่ ๒ น้ำเท่านั้น และต้องให้เสร็จทันทีด้วย เพราะถ้าแช่ไว้นานถึงจะเป็นสีดอย่างไรก็ตก น้ำแรกให้ใช้สบู่ แต่ห้ามไม่ให้เจอโซดา น้ำที่สองละลายเกลือเม็ดลงสักกำมือหนึ่งเพื่อรักษาสี

ชักผ้าสี ถ้าผ้าสีตก ให้แช่ลงในน้ำเย็นซึ่งผสมกับน้ำส้มหนึ่งช้อน

โต๊ะ ทงไวลึก ๑ หรือ ๒ ชั่วโมงแล้วจงชักด้วยวชรรมตา ต้องการรักษาสีให้คงสดอยู่ ภายหลังทชักด้วยน้ำเปล่าให้สีเกล็ดปนลงไป ๑ ช้อนใหญ่ จะช่วยรักษาสีให้คงสดอยู่ได้

ผ้าหรือแพรทจะชักถ้าเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าให้ชักในน้ำผสม ด้วย น้ำวอชิง โซดา ๑ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ ๑ แกลลอนจะทำให้สีคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

ถ้าเป็นสีดำให้โซโบไอว ๑ กำมือชงด้วยน้ำเดือด ๆ ทงไวให้เย็น แล้วกรองผสมน้ำตามสมควร

ถ้าเป็นสีเขียวหรือสีชมพู ให้ใส่น้ำส้ม ๑ ถ้วยชาในน้ำทจะชัก

ถ้าเป็นสีเนวบลูให้ชักด้วยน้ำครามแก่ ๆ ตากในร่ม ถ้าเป็นสีอื่น ๆ ให้ชักในน้ำผสมเกลือ

คำแนะนำสำหรับการย้อมเสื้อ

ถ้าเสื้อสีขาวกลายเป็นสีเหลืองภายหลังทชักบ่อย ๆ ควรจะย้อมเสียสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเป็นด บินกำลังนิยมใช้สีน้ำตาลปนทองกันอยู่ และจะใช้ดสีน้ำเงิน น้ำตาลหรือดากัสวดี สีอำพันหรือน้ำตาลปนทองนี้อาจย้อมได้โดยผสมสีเหลืองกับน้ำตาลอ่อนเข้าด้วยกัน ผสมสีน้ำตาลอ่อนกับชมพูก็ได้สีอำพันนเหมือนกัน และดูจะสวยมากด้วย แต่สำหรับการผสมสีวชิรนี้ ไม่ต้องแบ่งสีให้เข้ากัน แต่ผสมด้วยละลายกับน้ำทละน้อย ๆ ก่อนจนกระทั่งได้สีและเงาทดองการ

เครื่องใช้ ในการตัดเสื้อ

ขอผ้าตัดและให้ช่างตัดเสื้อขนเย็บมดเตียบให้ท่าน นี่เป็นการประ-
 หยัตถรพยทถูก เสื้อผ้าชนิดทอดลำรับหนึ่งจะใช้ได้ทนนานมากกว่าชนิดอย่าง
 กลางสองลำรับ

สี่

เสื้อผ้าของท่านทั้งหมดควรจะมีสีพื้น ๆ ไว้ การเลือกหารองเท้า ผ้า
 พื้นคอ ฯลฯ จะได้ไม่เป็นการเปลืองทรัพยากรนักในการจะหาให้เข้าสกับชุดเสื้อ
 ผ้า

เสื้อฝน

ท่านคงจะไม่กลัวในเมื่อจะไปทำทำงานหรือธุระนอกบ้านด้วยเสื้อผ้า
 ทัดในเวลาอากาศมดครมไปด้วยฝน ถ้าท่านเอาเสื้อฝนไปด้วย แต่บางทท่าน
 อาจไม่แลเห็นประโยชน์ของการมีเสื้อฝน นอกจากจะพาดแขนไว้เก้ๆ อย่าง
 ไรก็ดี การมีเสื้อฝนไว้จะช่วยประหยัตถรพยในค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าได้มากทีเดียว
 เสื้อผ้าที่เป็นสีขาว เมื่อจะต้มจงได้น้ำมันสน ๑ ช้อนกาเฟต่อน้ำ
 เดือด ๑ แกลลอน ต้มสัก ๒๐ นาที จะช่วยทำให้ผ้าขาวดังสโน

รอยไหม้เกรียม

วิธีการจรรอยไหม้เกรียมทสะดวก และดนนคือให้เอาสบู่ซักผ้าสอง
 ออนซ์ น้ำส้มครึ่งไปทและหัวหอมสับให้ละเอียด ผสมรวมกันตงไฟต้มสัก
 สิบนาที แล้วยกลงทงไว้ให้เย็น ราดสิ่งเหล่านลงบนรอยไหม้ ทงไว้จนแห้ง
 แล้วยกลงให้สะอาดภายหลัง

หรือถารอยไหม้เกรียมเปอนผ้าปูโต๊ะสีขาว ให้รับผ่านมะนาวสด ๆ

ถูตรกรอยไหม้ทันทีทันควันแล้วมาแช่ในน้ำเย็น ก็จะหายเหมือนกัน

ข้อมผ้ามานโปรง

เมื่อมานทำด้วยผ้าโปรงขาดเป็นรู ไม่ควรเย็บซุนหรือจับตองที่ตรงนั้น ให้ซักและลงแป้งอย่างธรรมดา เมื่อเวลารีด ให้ตัดผ้ามานโปรงเก่า ๆ ที่ไม่ใช่แล้วเป็นชนกลม ๆ ชนหนึ่ง ซุบแป้งแล้วเอามาวางบนผ้าโปรงตรงที่ขาดนั้น แล้วเอาเตารีดรีดเสีย

ผ้าเปอนนาชา

แช่ผ้าตรกรอยเปอนนั้นในน้ำเย็น แล้วซักอย่างธรรมดา ถ้ายังไม่หาย ให้ใช้น้ำร้อนเดือด ๆ รีดตรงที่เปอนหลาย ๆ ครั้งจะหายไปเอง

ผ้าปูโต๊ะที่ไม่ลงแป้ง

ถ้าไม่อยากจะลงแป้งผ้าปูโต๊ะจะใช้เหล้าเมทธิลแลกแทนก็ได้ จะทำให้รดขนเงางามดีมากกวาผ้าทลงแป้งอย่างธรรมดา เมื่อซักผ้าปูโต๊ะแล้วซักน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนั้น ให้เติมเหล้าเมทธิลแลกครึ่งเอานซ์ด้วย ทำให้ผ้าเป็นเงางามดีมากเมื่อรีดแล้ว

รอยไหม้บนผ้าหรือแพร

ถ้าผ้าหรือแพรมีรอยเกรียมที่ไม่หนาเกินไปนั้นจะแก้ให้หายได้ด้วย การผสมผง Fuller's earth กับเกลือส่วนละเท่า ๆ กัน เข้มกับน้ำพอเปียก ๆ แล้วโปะลงบนรอยไหม้ ทิ้งไว้จนแห้งแล้วขัดออกก่อนจึงซักตามวิธีธรรมดา

นาหมักเปอนเสื้อผ้า

หมักที่หกรดเสื้อผ้าหรือพรหม ถึงแม้จะแห้งไปแล้วก็จะเอาออกให้

หายได้ คือให้เอาตรงรอยเปื้อนชุบน้ำมันมะกอกทิ้งไว้เจ็ดชั่วโมง แล้วเอา
ชนชกด้วยน้ำฟองสบู่

สักหลาด

สักหลาดทมรอยเกรียมไหม้ไฟ จงถูด้วยน้ำมันมะนาวให้มาก ๆ ผึงแดด
จัด ๆ ให้แห้ง แล้วจึงซักรด

รอยขแมลงวัน

รอยขแมลงวันทอดอยู่ตามม่านหมอน หรือโป๊ะโคม ฯลฯ ที่ทำด้วย
ผ้าแพรวน ถ้าเอาผ้าชุบน้ำมันสนเพียงเล็กน้อยเช็ดรอยนั้นจะหายไป

ซักล้างจตุรา

ครั้งแรกซักด้วยวชเอานารอนผสมกับสบู่ แล้วใช้เกลือโปะลงตรง
รอยเปื้อนรา และเอาออกตากแดดทั้งที่ยังโปะเกลืออยู่นั้น ทิ้งไว้จนแห้งจึง
ซักอีกครั้งหนึ่ง

เสื้อลงแป้ง

ถ้าเสื้อทลงแป้งแข็งใช้น้ำเย็นธรรมดาพรมก็จะทำให้เตารีดผืด หรือ
ติดตะกุกตะกัก รีดได้ไม่เรียบ ให้ใช้นารอนหรือน้ำอุ่นจัด ๆ พรมเสื้อ และ
ใช้เศษผ้าทขาวสะอาด ๆ ชุบน้ำอุ่นเช็ดบางแห่งที่น้ำซึมไปไม่ถึง ก็จะทำให้
รีดได้เรียบและเตาไม่ผืดด้วย

เสื้อทเย็บด้วยผ้ามัสลินหรือผ้าแกวอย่างแข็ง มักจะแข็งกระด้างไป
เมื่ออ่อนนุ่มเหมือนก่อนซัก วชแก้คือให้สับด แล้วตัดด้วยท่อนไม้สำหรับตี
พรมให้ทั่ว จะกลับนุ่มเหมือนดังทใหม่ ๆ

ผ้าไหม

ผ้าที่ถูกเตารีดร้อนจัด ๆ รีด ให้ใช้น้ำประสานทองละลายกับน้ำพอ
ควร เอาผ้าสะอาดชุบน้ำยาแล้วถูตรงไหม ก็หายได้

บางคนใช้เสื้อขนในททำแขนด้วยสายยัด หรือสายยาง เสื้อขนใน
ที่เขาทำขายบางชนิดก็ทำแขนเช่นนั้น แต่ทางที่ดีควรจะเปลี่ยนใช้รบบนแทน
จะความยาวตามต้องการให้แน่นนอนลงไปจะดีกว่าใช้สายยางมาก

ถ้าจะชอกางเกงแพรยัดใช้ ให้ชอกขนาดใหญ่กว่าที่ท่านเคยใช้ขนาด
หนึ่ง จะใช้ทนทานดี

ถ้าผ้าหรือเสื้อสักหลาดเปื้อนโคลน ให้เอาแปรง ๆ ออก แล้วเคาะ
สักหลาดขาวเตะแอลกอฮอล์ถูตรงที่เปื้อน เมื่อแห้งแล้วเอาก้อนฝุ่นขาวททา
รองเท้า ถูตรงบริเวณที่เปื้อนทิ้งไว้ ๑ ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น จึงเอาแปรง ๆ
ออกให้หมด เสื้อจะสะอาดดังเดิม

แพรเทียมทต่างเพราะถูกน้ำอาจทำให้หายได้ ถ้าเอาเสื้อลงชุบน้ำให้
เปียกทั่วกันแล้วก็ทำโดยใช้เตารีดร้อน ๆ รีดในขณะที่ยังชื้นอยู่ แพร่ชาน
ต่างทต่างเพราะถูกน้ำอย่างเดียวกัน ให้จุ่มน้ำลงทิ้งทิ้ง เวลาจะรีดควรจะรีด
เมื่อยังชื้น ๆ อยู่

ถ้ากางเกงหรือเสื้อสักหลาดของท่านเปื้อนหญ้าหรือใบไม้เป็นสีเขียว ๆ
ให้เอาน้ำมันกลีเซอรินผสมกับโซเดียมส่วนเท่ากัน ทาลงตรงที่ ๆ เปื้อนแล้ว
ทิ้งไว้สัก ๑ ชั่วโมง จึงซักด้วยน้ำรอยที่เปื้อนนั่นจะออกโดยง่าย

ผ้าเปื้อนสี

ถ้าผ้าเปื้อนสีทสีขาวดเชย ให้ใช้น้ำมันสนบ้ายททตรงเปื้อน สีจะ

ละลายไปโดยเร็ว แต่ถ้ามันยังคงแข็งอยู่ให้แช่โดยตรงรอยเปื้อนในเหล้า
เมทิลเลต

รอยหมึกหยด

ถ้าหมึกหกกรดมา ให้เอาน้ำเทียนไขอุ่น ๆ โปะลงบนรอยเปื้อน
ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งดี ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเวลาซัก ๆ ด้วยน้ำร้อนจัด ๆ จะไม่มีรอย
หมึกเหลือ

รอยไหม้

รอยไหม้บนผ้าที่เกิดจากเตารีดร้อนจัดนั้น จะหายไปได้ ถ้าหาก
เอาตรงรอยเปื้อนลงแช่น้ำไว้อหลาย ๆ ชั่วโมง

หมึกหยด

ถ้าหมึกหยดเปื้อนผ้าหรือแพรบาง ๆ ให้เอามันสดผสมกันกับแป้ง
ชนิด จนเข้ากันพอเบียดแล้วค่อย ๆ เช็ดที่รอยเปื้อนหมึกจะหมดไปได้

น้ำมะเขือเทศ

น้ำหมึกหยดเปื้อนผ้าหรือแพรบาง ๆ ให้ฝานมะเขือเทศสดมาชั้น
หนึ่งแล้วถูตรงรอยหมึกหมึกจะหายไป แต่ถ้ายรอยหมึกนั้นเก่าแล้ว หรือ
เปื้อนมาก ๆ ต้องทาน้ำมะเขือเทศทิ้งไว้บนรอยหมึกอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
ก่อนแล้วจึงซัก

ผ้าฝ้าย

ผ้าที่ทาด้วยฝ้ายเมื่อยอมสแล้ว ก่อนจะใช้ถ้าได้แช่น้ำเกลืออุ่น ๆ
น้อย ๆ เสียก่อน สีนนั้นจะไม่ตก ถ้าผ้าเปื้อนหมึก ให้จับตรงรอยที่เปื้อน

แช่ทิ้งไว้ในน้ำมะเขือเทศ ๑๒ ชั่วโมง แม่จะเบื่อนมาก ๆ บนผาตินหรือ
แพร ไหมพรมก็จะออกดี

ถ้าผาหรือแพรเบื่อนน้ำมัน ให้เอาก่อนแมกนิเซียและน้ำถูตรงรอย
ที่เบื่อน ทิ้งไว้จนแห้งจึงเอาแปรง ๆ ออก

ผ้าปูโต๊ะ

ไม่ควรซักหรือทำให้เปียกน้ำบ่อย ๆ ใช้ทำความสะอาดโดยวิธีเอาแปรง
ขัดสิ่งสกปรกออกหรือมาชุบแอมโมเนียเช็ดก็พอ ได้รับการพิสูจน์จาก fhi,
National Buriav od Slamdadc ว่า ถ้าได้ใช้ผ้าบาง ๆ รองด้านล่างของผ้า
ปูโต๊ะหรือพรมชนิดนี้ไว้ก่อนแล้วจะทำให้ทนทานขึ้นอีกเท่าตัว และจะทนทาน
ยิ่งขึ้น หากว่าอากาศในสถานที่ที่นำไปใช้อยู่ไม่ร้อนจัดหรือไม่แห้งจนเกินไป

ผ้าห่มนอน

ผ้าห่มนอนผืนใหญ่ใช้นานก็มีรอยเปื้อนสกปรกได้ วิธีซักทำความสะอาด
แช่ลงในอ่างน้ำผสมเกลือดูให้น้ำท่วมผ้า ทิ้งค้างคืนไว้ เชายกขนบบ
(อย่าบิด) เอาน้ำเกลือทิ้งก่อนจึงนำลงซักน้ำสบู่มผสมแอมโมเนียอีกครั้งหนึ่ง

เสื้อผ้าเปอนลี

เสื้อผ้า ชุดงาม ๆ ขอนท่านที่เปอนลีเป็นรอยต่างจนใช้ไม่ได้ จงนำ
ลงแช่กับน้ำมันผสมแอมโมเนียหอมส่วนละเท่า ๆ กัน ทิ้งไว้สัก ๓-๔
ชั่วโมง จึงเอามาซักน้ำสบู่ ๆ อีกครั้งหนึ่งขย ๆ เท่านั้น สักเปอนลีสกปรก
จะหลุดหายไปหมดสิ้น วิธีทำถ้าครั้งแรก ถ้ายังไม่หมดจงทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
อย่าท้อถอยเข้าใจว่าไม่ได้ผล เพราะสีบางชนิดติดทนมาก

การย้อมสี

ท่านจะย้อมสีหรือเปลี่ยนสีเสื้อผ้า เครื่องประดับหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของท่านก็ตามใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอะไรก็ได้ตามือท่านให้ทั่วก่อนจับของที่ย้อมสี ๆ จะไม่จับติดมือ และจะล้างออกได้โดยง่าย

ผ้าเช็ดมือ ๆ

อย่านำไปใช้ในเวลารับประทานผลไม้ จงใช้ผืนทึมราคาถูก ๆ เพื่อการประหยัด เพราะยางผลไม้เมื่อหยดถูกมาแล้วจะต้องรีบเช็ดซักทำความสะอาดทันที ผลไม้บางชนิดยางเปื้อนผ้าแล้วจะซักออกได้ยาก

ถุงเท้า

ถุงเท้าที่ทาด้วยผ้าฝ้ายหรือสักหลาด ก่อนซักแช่น้ำเกลืออุ่นไว้สักครู่จึงนำลงซักกับสบู่ผสมแอมโมเนีย จะสะอาดหมดจดและอ่อนนุ่มมาก

ผ้าขนสัตว์

เมื่อจับยกขึ้นสะบัดฝุ่นออก จงอย่าจับปลายผ้าหรือตอนหัวของผ้า จงจับด้านข้างของผาด้านหนึ่งด้านใดก็ได้ สะบัดขนลงแรง ๆ

ยางอัสฟัลต์เปื้อนบนขนสัตว์

ยางอัสฟัลต์หรือน้ำมันดินที่เปื้อนติดมาบนขนสัตว์ จงใช้กระดาษสีน้ำตาลวางปิดรอยเปื้อนแล้วใช้เตารีดร้อน ๆ รีดทับบนกระดาษ ๆ จะดูดยางออกจากที่เปื้อนมาติดกับกระดาษจนหมด

ชุดอาบนํ้าบนขนสัตว์

เมื่อหมดฤดูตากอากาศก็จะถูกเก็บ หมดความจำเป็นต้องใช้ วิธีเก็บโดยไม่ถูกตัวสัตว์หรือแมลงเล็ก ๆ ทำอันตรายกัดแทะพรุณเสียหาย ท่าน

ต้องใช้กาแฟผงโรยลงในหีบหรือตุ้บเก็บ ถ้ามหีบที่ทำด้วยกระจกควรเก็บใน
หีบนั้น ตัวแมลงจะไม่สามารถทำอันตรายได้

แพรสีขาว

นำมาแช่กับน้ำที่ผสมนมสดเสียก่อน แล้วจึงซักกับน้ำสบู่อุ่น ๆ อีก
ครั้งหนึ่ง แพร่นั้นจะขาวงามสดใสเหมือนเดิม โดยจะไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วง
เหลืองได้ การซักแพรอย่าขยหรือบิดเพราะเนื้อแพรบาง เบาลจะทำให้ขาด
ได้ง่าย

ผ้าม่าน

นำแช่น้ำสบู่ผงทั้งไว้สัก ๑ ชั่วโมง ใช้แปรงถูตรงรอยเปื้อนให้ทั่ว
เมื่อเห็นว่าสะอาดดีแล้ว แกว่งสับดน้ำสะอาดอีก ๒-๓ ครั้ง อย่าขย
อย่าบิด นำไปตากทางที่เบียดน้ำมาก ถ้าเป็นผ้าม่านมัดอกส์สวย ๆ แล้ว
ตากให้ถูกแดด ขณะตากดึงตามส่วนรอยย่นให้ตึง

เมื่อแห้งแล้วท่านจะนำไปแช่ก็ได้เลย โดยไม่ต้องรดให้เสียเวลาอีก

ผ้าขึงเบอนมาก

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของท่านที่ เปื้อนเหงื่อไคลเป็นรอยต่างดำสก-
ปรกมาก ๆ แช่ลงในอ่างน้ำ ผสมกับแอสไพริน ๒-๓ เม็ด ทั้งลึกครุ้ง
ขยหรือใช้แปรง ๆ รอยเปื้อนจะออกหมดกลับงดงามอยู่ในสภาพเดิม

เมอรัดผ้า

ท่านเผลอปปล่อยเตาให้ร้อนจัดจนรด เป็นรอยไหม้เกรียมขนบนเสื้อ
ผ้า จงรีบใช้สิ่งของเครื่องใช้อะไรก็ได้ที่ทำด้วยโลหะ เงิน เช่น ช้อนเงิน

ส้มเงิน หรือเหรียญเงิน ถูรอยไหม้เกรียมบนพื้นที่ ท่านจะประหลาดใจ
 ถูรอยไหม้หายไปหมดสิ้น

ถูกทำในรอนหรือแพร์ ชักกับน้ำผสมน้ำส้มอ่อน ๆ แช่ทิ้งไว้อย่า
ปิด อย่ากินเป็นอนขาดหลังจากนั้นนำชนชักด้วยน้ำส้มธรรมดา นอกจาก
จะอ่อนนุ่มไม่เปลี่ยนสีแล้วยังเป็นเงางามอีกด้วย

ถ้าถามะหยมรอยย่น จงเอาตรงรอยย่นชนองกับไอนารอน
แล้วเลื่อนไปมาให้ทั่ว รอยย่นจะเรียบรอยดงเดิม อย่าลืมว่าไของดานใน

๑๔๐ ๕ ๑๔ ๓ ๐ ๖
วิชาแบ่งวิชาตอนบริหาร

แบ่งนวลละลายน้ำอบตะคัน แล้วทำเป็นเกล็ดผงแดดไว้ให้แห้ง เอา
มาใส่โหลอบควันเทียนใส่ดอกไม้หอมทำเช่นนี้สัก ๒-๓ คืน แล้วจึงเอาแบ่ง
มาปรุง

ประชุมเล่น ชมดไทย กระแจะ กล้วยน้ำว้า รัน น้ำนั้นหอม ต่าง ๆ
 กวน! สักในแบ่ง ซึ่งละลายด้วยน้ำดอกไม้นั้นแล้วจึงนำมาหยอดเป็นผิงแดด
 ไวจนแห้ง แล้วเอามาอบควันเทียนนอกครึ่งหนึ่ง

การอบหรือรำผ้าแบบไทย จะต้องใช้หีบอบ หีบนั้นต้องเป็นไม้เอา
ออกตากแดดเสียก่อน แล้วฝนจันทร์เทศกับเนื้อไม้ ใช้น้ำอบไทยฝน ใน
ผิวมะกรูดและกระแจะ ประกับพิมพ์เส้น น้ำมันจันทร์ชะมัด และหย้าฝรัง
แล้วเอาพรมหีบหีบพอหมาดเอาพานดินวางทกลางหีบ ไล่ถ่านแล้วเอาขลุ่ย
ประง ไล่กำยาน ผิวมะกรูด ชะมัด แล้วปั้นให้เข้ากันโรยลงไป ในถ่านไฟ
ฉิดหีบให้ควนชน ถ้าหีบใหญ่ทำเช่นนี้สัก ๕ หน ถ้าหีบเล็กทำสัก ๓ หนก็
พอ พอดวันหมดเอาพานดินออก และรมควันเทียนไล่ดอกไม้หอมต่าง ๆ

รองเท้า

รองเท้านักดำ

หาร้าขาวมาเล็กน้อย ผสมกับน้ำใส่ภาชนะตั้งไฟอุ่นให้เข้ากันดี แล้ว ใช้น้ำราวน้ำยรองเท้าให้ทั่ว ทั้งไว้สักครู่พอหมาดก็ขัดออกให้หมด ละออง แล้วขัดด้วยแปรงสำหรับแปรงรองเท้าอย่างนุ่ม ๆ ให้ทั่วจนชั้นเงาจะเป็นเงางามดี

รองเท้านักสกี

ละลายกรดออกแซลลิกอย่างอ่อน แต่ไม่ต้องใช้สำหรับรองเท้าที่หนังชำรุดเท่านั้น และไม่มีสิ่งใดจะล้างได้ดีกว่าน้ำร้อนผสมกับชนส์บูห์นา ๆ

รองเท้านักสกี

รองเท้านักสกีเมื่อสวมไปนานๆ พอเก่าเข้าก็มักจะกลายเป็นสีเหลือง จึงเมื่อก่อนใช้ (เวลาที่ซ่อมมาใหม่ ๆ) ควรจะใช้ผ้าชุบน้ำมันสนทาให้ทั่ว แล้วทิ้งไว้จนแห้ง และทำซ้ำ ๆ กันดังนี้สักสองหรือสามครั้ง เมื่อเก่าจะคงมีสีเข้มงามเหมือนอย่างเดิม

รองเท้าแพรวต่วนสีอ่อน

ใช้ผ้านุ่มชุบเหล้าไวน์ค้อย ๆ บ้ายให้ทั่ว ยานี้จะได้แม่แต่รองเท้าที่เป็นแพรวดอก

รองเท้าผ้าใบขาว

ถ้าจะให้รองเท้าผ้าใบขาวสดใสขาวสะอาดยิ่งขั้นแล้ว ให้ใช้ผ้าขาวสะอาด ๆ ชุบน้ำมันสดทาให้ทั่วภายหลังที่ได้อาบน้ำรองเท้านั้นให้หายสกปรก ดีแล้ว นมสดนั้นเป็นยาทารองเท้าผ้าใบสีขาวดีกว่ายาอื่น ๆ มากนัก

รองเท้าหนังที่เป็นลวดลาย

ใช้น้ำมันสนหรือนมสดทาให้ทั่วสน และขอบพนักรองเท้า และขัดให้ชื่นเงา

แผ่นหนังในรองเท้า

ถ้าแผ่นหนังสำหรับรองฝ่าเท้ารองเท้าย่น หรือเลือนออกมาโดยจะเป็นด้วยถูกฝนชื้นหรือเปียกน้ำก็ตาม ให้ละลายขมิ้นด้วยเอาใส่ภาชนะตั้งไฟและใช้ทาพนักข้างล่างทงทกालังรอน ๆ โดยหาไม้แบนเรียบ ๆ จุ่มขมิ้นแล้วแทรกพนักหนังเข้าไปหาข้างในโดยเร็ว

ทำความสะอาดแก้รองเท้า

รองเท้าผ้าใบสีขาว ถ้าจะให้สดใสและขาวสะอาดยิ่งขึ้น ให้ใช้ผ้าขาวสะอาด ๆ ชุบน้ำนมสดทาให้ทั่ว ภายหลังที่ได้ชำระล้างรองเท้าให้หายสกปรกได้แล้ว นมสดนั้นเป็นยาทารองเท้าผ้าใบสีขาวดีกว่ายาอื่นมาก

รองเท้า

ก่อนจะเดินทางไกล ๆ ควรทารองเท้าด้วยน้ำมันวาสลีนให้ทั่ว เมื่อกลับมาแล้วทำอีกครั้งหนึ่ง หรือมิได้ใช้เดินทางก็ควรทาวาสลีนเสียสัปดาห์ละครั้ง และในครั้งหนึ่ง ๆ ควรทาทั้งไว้อย่างน้อยสัก ๑ วัน

รองเท้าเปียก

รองเท้าที่เปียกน้ำ อย่าล้างใกล้ไฟหรือกลางแดด จงเช็ดให้แห้งแล้วใช้ผ้านุ่มหรือกระดาษอัดไว้ให้เต็มท

รองเท้านาน ๆ จึงจะใช้เสียครั้งหนึ่ง ควรจะละเลงน้ำมันวาสลีนให้ทั่วก่อนจะเก็บไว้

รองเท้าเดินทาง

รองเท้าสำหรับเดินทางที่หาซื้ออย่างด้นนได้สบาย แต่ว่ามีราคาแพง
ทั้งรองเท้าเดินทาง และรองเท้าที่สวมเวลากลางคืนควรจะเลือกชนิดที่ใส่สบาย
มากกว่าเรื่องราคาถูก

รองเท้า

รองเท้านาตาล ถ้าเป็นรอยต่าง จะตัดมะนาวสักชิ้นหนึ่งให้ทั่วก็
ให้ทั่วก็จะหายได้

หมวกสักหลาดสีขาว

วิธีล้างหมวกสักหลาดสีขาว คือให้ใช้แปรง ๆ ฝุ่นละอองให้ทั่ว
แล้วผสมแมกนีเซียมกับน้ำเย็นพอชน ๆ แล้วใช้แปรงอีกอันหนึ่งขูดขยันทา
หมวกให้ทั่ว ทั้งไว้ให้แห้งแล้วจึงแปรงแบ้งนออกให้หมด

หมวกฟางสี

ใช้แปรงดี ๆ แปรงหมวกให้หมดฝุ่นละอองแล้วจึงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด
เมตขเลดทาให้ทั่ว เมื่อหมวกยังขนอยุ่นให้โค้งดัดหมวกเป็นรูปเสียอย่าง
เดิม และเมื่อแห้งแล้วจะใหม่ขึ้น ทั้งฟางก็จะมเส้นแข็งขึ้นอีกด้วย

หัวรองเท้า ท่านต้องดูรูปเท้าของท่านให้ดี เท้าซึ่งมีรูปยาวบาง
และมีแต่กระดูกจะได้รองเท้าเล็กเขาไม่ได้ ถ้าท่านจะรู้สึกเจ็บเท้าจนชาเพราะ
ถูกรองเท้าบบแล้วพึงรู้สึกเถิดว่าโลหิตเดินไม่สะดวก เหตุเช่นนั้นมักจะเกิดขึ้น
ภายหลังที่ท่านใส่รองเท้าไปสักสองหรือสามชั่วโมงแล้ว เวลาเลือกรองเท้า
ควรจะระมัดระวังไม่ให้หัวเท้าบบ และขอบรองเท้ามัดแน่นหลังเท้า คนโดย
มากรู้สึกอดอดเวลาใส่รองเท้าสวมซึ่งหุ้มเท้าอยู่โดยรอบ และไม่มีสายรัดข้าง

บน ถารองส่วนโค้งไตรองเท้า ส่วนล่างของรองเท้าควรจะโค้งไปตามรูปเท้าของท่านพอดี ตัวส่วนโค้งของรองเท้าต่ำกว่าตัวเท้า เท้าก็จะชันไปร่อยรอยเฉย ๆ โดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดรับ แต่ถารองเท้าโค้งเกินกว่าตัวเท้าก็จะดันเท้าทำให้รูปเท้าเสียรองเท้ากับเท้าควรจะเหมาะสมกันทุกส่วน

จงระวังส่วนกว้างของส่วนไตรองเท้ากว้างสำหรับเท้าท่าน ชันเท้าข้อหัวแม่เท้า และนิ้วก้อยควรจะเป็นส่วนที่ท่าน ใช้รับน้ำหนักของท่าน พยายามอย่าจิกหัวเท้าเดิน และรองเท้ากับเท้าควรจะเคลื่อนไหวพร้อม ๆ กันในเวลาเดิน ไม่ใช่เคลื่อนไหวกันคนละที

ถ่านวท่านสั้นและเท้ากว้างแบบ ควรใส่รองเท้าหัวบ้านและกว้าง ถ้าหาไม่เท้าจะบีบทำให้เกิดเนอด้านขนเช่นเดียวกัน ถ้าท่านเปลี่ยนจากการใส่รองเท้าหัวแหลมแล้วมาใช้หัวบ้านแล้ว ควรให้รองเท้าโตกว่าธรรมดาเล็กน้อยเพราะเหตุว่า ในรองเท้าหัวบ้านนั้นพื้นที่สำหรับนิ้วก้อยมากกว่าชนิดหัวแหลม

ชั้นที่สี่หรือทำให้หลังรองเท้าเสีย ฉะนั้นควรจะรับจัดการซ่อมแซมเสียทันที

ชั้นรองเท้าของท่านจะสูงได้เพียงใดนั้นต้องแล้วแต่เท้า ชั้นที่สูงเกินไปไปทิ่มน้ำหนักตัวไปข้างหน้าดังนั้นท่านจึงฝืนตัวกลับ ทำให้ทองย่นไปข้างหน้าและก้นย่นไปข้างหลัง ซึ่งทำให้รูปร่างน่าเกลียดยิ่งกว่านั้น ชั้นที่สูงเกินไปยังทำให้เท้าเหนื่อยและเพลียง่ายจน

ถ่านวเท้าท่านยาวและผอมเล็ก ท่านควรใส่รองเท้ายาวแหลม เพื่อให้หมวกที่เหยียดได้ตามสบาย ถารองเท้าหัวสั้นเกินไปก็จะบีบ และถึงแม้ว่า

เท้าจะขยายไปตามกว้างได้เล็กน้อยตามยาวก็ยังคงไม่มทพอ นิ้วเท้าจะงอขึ้น
ไปถูกกับหนังรองเท้าทำให้เกิดเป็นไตแข็งและเนอดาน

รองเท้าหนัง

ก่อนที่จะตัดเงาทำความสะอาด

สำหรับรองเท้าหนังสีดำ ใช้น้ำส้มสายชูทาทั้งไว้ให้แห้งจึงขัดด้วย
ยาขัด หนังจะอ่อนนุ่มและเป็นเงาปลาบ

สำหรับรองเท้าหนังสีน้ำตาล ใช้น้ำเปลือกกล้วยสด ๆ ทาทั้งไว้ให้
แห้งแล้วใช้ยาขัด หนังจะอ่อนนุ่มและเป็นเงาเช่นสีดำ แต่จะสวยสดกว่า
ใช้ยาขัดอย่างเดียว

รองเท้าสีขาว

เมื่อนำน้ำยาล้างขาวทารองเท้า ใช้นมสดผสมลงไปใ้ในน้ำยาล้างขาวนั้น
เล็กน้อยแล้วทา จะทำให้รองเท้ามีสีขาวสดใสอ่อนนุ่มและทนทาน

รู้ไว้ใช้ว่า

หยิบมือ เป็นคำซึ่งท่านจะพบในตำราอาหาร ท่านเข้าใจได้ทันที และวิธี
ธรรมดาโดยทั่ว ๆ ไปท่านก็ใช้หัวแม่มือกับนิ้วหยิบ เช่น— เกือบหนึ่ง
หยิบมือหรือน้ำตาลทรายหนึ่งหยิบมือ ท่านหยิบด้วยนิ้วทั้งสองเช่นนั้น ก็
เป็นอันใช้ได้

ท่านคงได้ผ่าน หยิบมือ ของฝรั่งมาแล้ว คือ น้อยกว่า $1/8$ ของ
ช้อนชา

แต่ หยิบมือ อีกแบบหนึ่ง (ของฝรั่งเหมือนกัน) ดูเหมือนจะนำ
ดูมากกว่าเขาวางอัตราไว้ว่า หยิบมือ คือ $1/4$ ของช้อนเกลือพูน

อัตราเช่นนั้น ท่านจำเป็นจะต้องทราบว่า 1 ช้อนเกลือไม่พูนเท่า
กับ $1/4$ ช้อนชา

อัตราความร้อนของไฟในการครัว

225	ดก	เท่ากับ	อ่อนมาก
ต่ำกว่า 345	ดก	เท่ากับ	อ่อน
345 ถึง 365	ดก	เท่ากับ	ปานกลาง
365 ถึง 425	ดก	เท่ากับ	ร้อนปานกลาง
425 ถึง 460	ดก	เท่ากับ	ร้อน
ตั้งแต่ 460	ดกขึ้นไป	เท่านั้น	ร้อนจัด

(ดก — ฟาห์เรนไฮต์)

ไข่แดง 12—14 ฟอง	เท่ากับ	1	ถ้วย
ไข่ขาว 8—10 ฟอง	เท่ากับ	1	ถ้วย
3 ช้อนชา	เท่ากับ	1	ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ (ของเหลว)	เท่ากับ	1	ออนซ์
4 ช้อนโต๊ะ	เท่ากับ	$1/4$	ถ้วย
16 ช้อนโต๊ะ	เท่ากับ	1	ถ้วย
1 ถ้วย	เท่ากับ	16	ช้อนโต๊ะ
2 ถ้วย	เท่ากับ	8	ออนซ์ (ของเหลว)
1 ถ้วย	เท่ากับ	$1/2$	ปอนด์
1 ช้อนชา	เท่ากับ	120	หยด (น้ำ)
1 ช้อนชา	เท่ากับ	60	หยด (น้ำขุ่น)
2 ช้อนชา	เท่ากับ	1	ช้อนหวาน
1 ช้อนโต๊ะ	เท่ากับ	460	หยด
แบ่ง 4 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
เนยแข็ง 1 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
น้ำตาลทรายเกล็ด 2 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
น้ำตาลทรายละเอียด $2\frac{2}{3}$ ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
เนยเหลว 2 ช้อนโต๊ะ	เท่ากับ	1	ออนซ์
เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ	เท่ากับ	1	ออนซ์
น้ำมันหมู 1 ปอนด์	เท่ากับ	2	ถ้วย
3 ช้อนชา	เท่ากับ	1	ช้อนโต๊ะ

16	ช้อนโต๊ะ	เท่ากับ	1	ถ้วย
1	ปอนด์	เท่ากับ	2	ถ้วย (ของเหลว)
ข้าวสาร	1 ถ้วย	เท่ากับ	ข้าวสุก	3 ถ้วย
แป้ง	4 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
น้ำตาล	2 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
เนย	2 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
น้ำ	2 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
นมสด	2 ถ้วย	เท่ากับ	1	ปอนด์
ไข่	1 ฟอง	เท่ากับ	2	ออนซ์
ไข่ขาว	1 ถ้วย	เท่ากับ	8	ถึง 10 ออนซ์

ปีที่มี 366 วันนั้น ฝรั่งเรียกว่า leap year (ปีกระโดด) เพราะ
กระโดดข้ามปีธรรมดาที่ละสามปีเรื่อยไป

ปีไหนเป็นปี leap year ปีนั้นมีลักษณะพิเศษ สังเกตได้คือ:—

- 1— ปีนั้น เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
- 2— ปีนั้น เอา 4 หาร ค.ศ. ได้ (เช่น 1904 1908 1912 ฯลฯ)
- 3— ปีสุดท้ายของศตวรรษ จะเป็นปี ได้ก็ต่อเมื่อ ค.ศ. ของปีนั้น
หารด้วย 400 ได้

ปีธรรมดา หนึ่งปีมี 362 วัน

ปีดาราศาสตร์ หนึ่งปีประมาณ 365 1/4 วัน (คือ 365 วัน

5 ชั่วโมง 48 นาที 45.51 วินาที)

1 Billion (บิลยััน) ของอเมริกาและฝรั่งเศส

= 1, 000,000,000

= 1.000 Million (มิลยััน)

= พันล้าน

1 Billion ของอังกฤษ

= 1, 000,000,000,000 million

= 1, 000,000

= ล้านล้าน

สูงเท่าใด ควรมีหน้าหนักเท่าใด

หญิงร่างเล็ก

ตามความสูง	ฟุต	นิ้ว	ควรมีหน้าหนัก
„ „	4	11	194—111 ปอนด์
„ „	5	0	105—113 ปอนด์
„ „	5	1	107—115 ปอนด์
„ „	5	2	110—118 ปอนด์
„ „	5	3	113—121 ปอนด์
„ „	5	3	116—125 ปอนด์
„ „	5	5	119—128 ปอนด์
„ „	5	6	123—132 ปอนด์
„ „	5	7	126—136 ปอนด์

ถามความสูง	ฟุต	นิ้ว	ควรจะมีน้ำหนัก
„ „	5	8	129—139
„ „	5	9	133—143
„ „	5	10	136—147
„ „	5	11	139—150

หญิงร่างปานกลาง

ถามความสูง	ฟุต	นิ้ว	ควรจะมีน้ำหนัก
„ „	4	11	110—118 ปอนด์
„ „	5	0	112—120 „
„ „	5	1	114—122 „
„ „	5	2	117—125 „
„ „	5	3	120—128 „
„ „	5	4	124—132 „
„ „	5	5	127—135 „
„ „	5	6	130—140 „
„ „	5	7	134—144 „
„ „	5	8	137—147 „
„ „	5	9	141—151 „
„ „	5	10	145—155 „
„ „	5	11	148—158 „

หญิงร่างใหญ่

ตามความสูง	ฟุต	นิ้ว	ควรจะมีน้ำหนัก
„ „	4	11	117—127 ปอนด์
„ „	5	0	119—129 „
„ „	5	1	121—131 „
„ „	5	2	124—135 „
„ „	5	3	127—138 „
„ „	5	4	131—142 „
„ „	5	5	133—155 „
„ „	5	6	138—150 „
„ „	5	7	152—154 „
„ „	5	8	145—158 „
„ „	5	9	149—162 „
„ „	5	10	152—166 „
„ „	5	11	155—169 „

ตามความนิยมของชาวตะวันตก โดยมากใช้สัทยันตา เช่นผนัง
 หอทางสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน เกือบจะเป็นขาวเป็นต้น แลเครื่องประดับ
 ห้อย เช่น ตุ้ม ใต้อัฒกา ฯลฯ ก็ใช้สีขาวเช่นเดียวกัน จำพวกของเล็ก ๆ
 น้อย ๆ เช่นขวดปักดอกไม้ โป๊ะ โคมไฟ ผ้าปูเบาะก็มักใช้สีที่ไม่แสดลง
 แก่นยันตา เช่นสีน้ำเงินอ่อน สีฟ้า หรือเขียว อโศก เช่นนี้เป็นต้น
 ถ้าห้องนอนเป็นทึบเปิดผืนก ให้ใช้ฉากทึบได้บังเสีย

น้ำมันวานิชทาเตยงปีละครั้ง เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้त्वเล็ดตัวไร
เกิดขึ้นได้ออกดวย

ถ้าหากมีत्वเล็ดเกิดขึ้น ล้าง—ด้วยสบู่คาบอดิก แลเช็ดให้สะอาด
ก็จะค่อยหายไปได้

ถ้าจะให้อากาศดียิ่งขึ้น ควรจะมีห้องแต่งตัวออกส่วหนึ่ง (หรือท่าน
จะเก็บเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้ออกห้องก็ได้) เพราะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมักจะทำให้
อากาศเสีย ห้องแต่งตัวก็มีโต๊ะเครื่องแป้ง หิ้งและขอแขวนเสื้อ ตู้เสื้อผ้า
และของอื่น ๆ อีกตามจำเป็น

ควรจะต้องเตียงนอนไว้ทางหน้าต่างทิศตะวันออก ไม่ใช่เพ่อตามธรรมเนียม
โบราณแต่เพื่อให้แสงแดดในตอนเช้าส่องถึงทนอนได้ จะได้ไม่ชื้นและ
มักกลิ่นอับ

ห้องนอนจะต้องรักษาให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เช่นเดียวกับห้อง
รับแขก เพราะเหตุว่าเป็นที่ ๆ สำคัญแก่ความสุขทางร่างกายมาก

ความรู้เบ็ดเตล็ด

เครื่องเพชรพลอย จะสุกใสแวววาวงดงาม โดยผสมแอมโมเนียเล็กน้อยลงในสบู่แล้วแช่น้ำเย็นที่สะอาด จึงเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

เครื่องทองและเงิน ที่เป็นฝ้ามัว จงแช่ในน้ำร้อนที่เติมแอมโมเนียไว้อย่างแรง

เครื่องแก้วเจียรไน จะใส่สะอาดควรชำระล้างด้วยน้ำนั้น ๓ ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำครึ่งแกลลอน

ขวดโหล ขวดนม ขวดยา และขวดต่าง ๆ หากใช้กรดเกลือ กรดน้ำส้มหรือน้ำด่างขูดกลางจะหมดจดดี

การเก็บหนังสือหรือเอกสารไว้นาน ๆ จงพรมหนังสือหรือกระดาษด้วยพริกไทยป่น หรือสารส้มบดละเอียด จะป้องกันมอดแมลงได้

วิธีกำจัดแมลงวัน ใช้กานพลูตำพอบแหลก ใส่กระเช้าแขวนไว้ แมลงวันจะหนีหมด

การกำจัดมด ใช้ขมิ้นผง นำนมสดหรือปูนขาว อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้โรยตรงบริเวณนั้น

การกำจัดยุง ใช้การะบูนก่อนห่อผ้า แล้วแขวนไว้เหนือตะเกียง พอคันออกยุงจะหนี

วิธีกำจัดแมลงมุมขี้ไย และเกาะสกปรกตามฝาผนังบ้าน ให้เอาน้ำมันพาร์ฟฟินถูตามฝาแมลงมุมจะไม่เกาะอีก

วิธีทำน้ำหอมลาเวนเดอร์ ซึ่งมักกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ ใช้ส่วนผสม
ดงน นำนอบเชย ๑๐ หยดน้ำมันหอม ๔ กรัม น้ำชมดหอม ๔ กรัม น้ำ
มันกุหลาบ ๒ กรัม สเปิร์ตออฟไวน์ ๒๐ ออนซ์ และน้ำลาเวนเดอร์อังกฤษ
๒ กรัม ผสมกันจะได้ น้ำหอมอย่างดีพิเศษสุด

เล็บมือของท่านจะเป็นเงางามน่ารัก ด้วยการใช้น้ำมันถั่วทุก
วัน ประมาณ ๒ สัปดาห์จะเห็นผลทันที

ยาแก้สวัชงก ลินทะเลเบาหนึ่งส่วน สารส้มสระตุ ๑ ส่วน ดินสอ
พองเผาไฟ ๑ ส่วนและเพลยจันเผาไฟ ๑/๒ ส่วน บดให้ละเอียดใช้ถูหน้าทุก
วัน หลังจากหนึ่งอาทิตย์จะค่อย ๆ จางไป

วิธีชำระเพดาน และฝาผนังห้องเป็นรอยดำคำด้วยเขม่าไฟ ให้ใช้
ผ้าขาวทึบสะอาดจุ่มลงในน้ำอุ่นผสมด้วยโซดา ให้ทั่วเสียครึ่งหนึ่งแล้วจึงจุ่ม
น้ำออกครึ่งหนึ่ง

การต้มเสื้อผ้า จะเป็นผ้าสีขาวก็ตาม ถ้าจะทำให้สะอาดหมดจดจง
บีบน้ำมะนาวสดผสมลงไปด้วยสัก ๒-๓ ชันใหญ่ ๆ จะทำให้ผ้าขาวยิ่งขึ้น

แพรสีขาว ผ้าแพรสีขาวต่าง ๆ ที่เปื้อนมาก ๆ จะแช่น้ำอุ่นและ
คอยขยำในฟองสบู่อุ่น ๆ อย่าขยจะทำให้เนื้อผ้าแยกห่างกัน ทำให้หมด
สวยและขาดง่ายและอย่าใช้น้ำร้อนจัดหรือต้มเป็นอันขาด

วิธีทูลเวลาทำงาน

๑. อย่าไปเสียเวลาชักผ้าเช็ดขามบ่อย ควรหาที่ใส่ถ้วยขามเป็น
ช่อง ๆ อาจจะให้พ่อบ้านใช้ระแนงดี วางให้เป็นระเบียบ คุณจะไม่ต้องนั่ง
เช็ดถ้วยขามทุกวัน

๒. หาตะกร้าจ่ายของที่เล็กใช้ นำเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการทำความสะอาดบ้าน เช่นที่ขัดฝุ่น ถ่านม ๆ สำหรับทำความสะอาดเครื่องเฟอร์นิเจอร์ แปรงขัดเครื่องใช้ นานาเช็ดกระจกไว้ในตะกร้าเวลาจะทำความสะอาดที่ไหน จะได้หิ้วไปได้สะดวก

๓. ควรมีส้มุดบันทึกเล็ก ๆ ประจำตัว เวลาของใดชาดจะได้จดไว้ เมื่อถึงวันไปจ่ายของ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดนาน

๔. ถ้าคุณไม่มีเวลาสลักเตงกว่าให้ส่วย เมื่อจะจดผักสด หรือ ต้มแกงจืดกดี ลองใช้ช้อนขีดลงไปตามความยาวทั้งสามด้าน แล้วค่อยฝาน เป็นแว่น ก็จะได้เตงกว่าทั้งามไม่น้อย

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ควรรู้

๑. ดอกไม้และใบไม้ที่ทงอยู่ในแจกันนาน ๆ ทำให้มกดินและเวลา ทำความสะอาดแจกัน ให้ใส่น้ำเย็นลงไปในน้าส้ม ๑ ช้อนชา ทงค่างคนไว้ ก็จะทำความสะอาดไดยาขุ่นและไม่มกดิน

๒. เนอผ้าเสื้อของคุณและลูกบ้านจะแน่นและทนเป็นพิเคษ ถ้าคุณ จะใช้น้ำอุ่นพรหมเสื้อทุกครั้ง แทนการใช้น้ำเย็น

๓. ถ้าคุณไม่มีด่างทบทมล้างผักสด อาจใช้เกลือเพียงช้อนความผสม กับน้ำธรรมดาหนึ่งขวดใหญ่ ล้างผักแทนก็จะสะอาดเหมือนเดิม

๔. จะปิ้งจะย่างอะไรไม่ให้เหม็นควันไฟ ก่อนจะปิ้งให้โรยเกลือป่น ลงบนถ่านไฟเสียก่อนก็จะดับกลิ่นควันไฟได้

๕. ถาผ้าเปอนนาหมาก ให้ใช้น้ำตาลโรยตรงรอยเปอนหยดน้ำ เล็กน้อยและถูด้วยน้ำมะนาว หรือซักด้วยน้ำชาแก่ ๆ ก็ได้

๖. ผาตเปอนหมักอดโรเนยว เอนำนันหมูทาทเปอนแล้วโรยผง
ชุกฟอกทรอยเปอนบาง ๆ ชยเบา ๆ แล้วจ้งนำไปชุกหมักโรเนยวจะออก
เสื่อผาจะขาวสะอาดเหมือนเดิม

๗. เครื่องใช้ทองเหลือง เช่นหัวเข็มขัด เครื่องหมายสังกัดต่าง ๆ
ถ้าเก่าจนเอาดูบราสโซแล้วยังไม่ออก ลองเอาบราสโซชนิดขมงทาหัวแม่มือ
แล้วชยทองเหลืองเหล่านั้นแรง ๆ ไปมาหลายครั้ง จ้งเอาผาเช็ดทหลังทอง
เหลืองก็แวววาวใหม่ขึ้นอย่างเดิม

ความรูเบคเตลด

การต้มไข่ ถ้าใส่เกลือลงไปในน้ำด้วย ต้มเสร็จแช่น้ำเย็น ไข่จะ
ปอกได้ง่าย

ถ้าเร่งรีบจะไปไหนหาขายตรองเท่าไม่ได้ เปลือกกล้วยหอมก็แกะ
ได้ โดยใช้ผิวหนังในของกล้วยหอมถูเบา ๆ

ถ้าทบานมมะนาวอยู่มากจนเหลือเฟือ หากเก็บไว้นานมะนาวจะ
เหี่ยวใช้การไม่ได้ จ้งเอามะนาวที่เหลือฝังทรายไว้ มะนาวจะเก็บสดไว้
ได้นาน

เวลาชุกผ้า น้ำสกปรกทชุกผ้าแล้ว เอาไปรดน้ำต้นไม้หรือไมดอก
เขาทดี เพราะเหงื่อไคลทออกจากเสื่อผาต้นไม้ชอบนัก

ผาลินนทมรอยใหม่ จะใช้ดินสอพองต้มกับน้ำส้ม และน้ำมัน
หัวหอม เช็ดลางรอยทเปอนในมิชาก็จะหายไป

กากกาแพทไม่ใช้น้ำมันบักเข็มใดดและไม่ชนสนิม

เครื่องแก้วเจียรในควรวางด้วยน้ำมันส้มกับน้ำมันสนจะสะอาด

ไขไก่ต้มเปลือกสีน้ำตาลไขทำสังขยาจะมีสีเข้มกว่าไขไก่ต้มสีขาว
 ผาตเปอนนาหมาก จะโรยน้ำตาลตรงรอยเปอน หยดน้ำลงไปเล็กน้อย
 แล้วนำไปชก รอยเปอนก็จะหาย ก่อนที่จะนำไปชกต้องถูด้วยน้ำมันมะนาว
 เสียก่อน

ฟองน้ำที่ไขแล้วจนลึกลงไป จงแช่น้ำอุ่นผสมกับแอมโมเนียเข้าไว้
 สักครึ่งวัน แล้วนำไปแช่ในน้ำเย็น ก็จะสะอาดเหมือนเดิม

ผลไม้ที่สด และมีรสเปรี้ยวและมีรสกรอบก็นำมาแช่ในน้ำสารส้ม
 สักครึ่งชั่วโมง ก็จะกรอบและหายเปรี้ยวทันที

เห็ดที่เราอยากทราบว่าเป็นเห็ดเบอเมาหรือเปล่านั้นก็นำเห็ดนั้นมา
 ต้มกับน้ำหอมจนเดือด หากว่าน้ำที่ต้มนั้นดำแสดงว่าเห็ดนั้นเป็นเห็ดเบอ
 เมา ถ้าหากว่าทานเข้าไปแล้วก็จะถึงแก่ความตายได้

ปลาสดที่ต้องการจะชุบแป้งทอด ควรที่จะทงปลาให้แห้งเสียก่อน
 จึงค่อยชุบ แป้งจะติดตัวปลากรอบตามที่ต้องการ

แป้งรชนอ่อนก่อนที่จะใช้ ถ้าใช้น้ำหรือน้ำเกลือ หรือน้ำเกลืออื่นๆ
 ใส่อีกครึ่งวันก็จะทำให้ทนชื้นมาก

เปลือกไขไม่ควรทิ้ง เปลือกไขนั้นมีประโยชน์บางอย่างถ้าท่านใส่
 ลงใน เวลาต้มเสื้อผ้าให้เอาถุงเปลือกไขใส่ต้มลงไปด้วย ฝุ่นที่เปลือกไขจะ
 กัดเสื้อผ้ารอยทาด้านนั้นขาวสะอาดดี

แก้วใส่นมรับประทาน ถ้าขัดด้วยเกลือและถูด้วยนารอน จะทำ
 ให้แก้วนั้นใสสะอาดเป็นเงางามดชน

มดที่เป็นสนิม จะใช้หัวหอมหรือมะนาวถูก็จะหายสนิมได้โดยง่าย

ล่างแปรงและหวี เอาน้ำร้อนผสมกับแอมโมเนีย ๑ ช้อน ใช้ล้าง
แปรงและหวีได้สะอาดหมดจด

เก็บมะนาวสดไว้นาน ๆ เช่นมัทเสียแล้ว เปลี่ยนอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง
ใช้น้ำแข็งหรือเก็บไว้ในตู้เย็นแข็ง หมกทรายที่ชุ่มน้ำไว้

เครื่องใช้ไม้ไผ่ เช่น กระจาด กระบุง ฯลฯ ถ้าจะใช้ให้ทนดึกก่อน
ใช้จะแช่ด้วยน้ำส้มบูรอน ๆ เดี่ยวก่อนของนั้นจะดี

เขม่าไฟ ใช้สำหรับกำจัดรอยน้ำมันเปื้อนรองเท้าได้

หมูแฮม เมื่อตัดแล้วเอาน้ำส้มสายชูทาไว้จะป้องกันเป็นราได้ดีกว่า
จะทิ้งไว้เฉย ๆ

ผ้าเปื้อนสนิมเหล็ก ใช้น้ำมะนาวใส่เฉพาะที่เปื้อนแล้วผึ่งแดดไว้
เมื่อแห้งจึงซักสนิมเหล็กนั้นก็หายไป

แว่นตา ก่อนที่ท่านจะสวมแว่นตาเข้าไปในโรงงานที่ใช้ด้วยกำลัง
ไอน้ำชน ๆ จงเอาสบู่ทาแว่นตาของท่าน แล้วใช้ผ้าถูให้สะอาดเสียก่อน
ไอน้ำหรือความชื้นจะไม่จับกระจกของท่านเลย

เครื่องเงินทดำ ต้องการจะให้ขาวสะอาด ใช้ดินสอพองละลายน้ำทา
ให้ทั่วเครื่องเงินนั้นแล้วนำไปผึ่งแดด พอแห้งใช้แปรงอ่อน ๆ บัดดินสอพอง
ออกให้หมด

เครื่องทองเหลืองทดำ ให้ใช้มะขามเปียกขัดจะสุกใสเป็นเงาขึ้น
ถ้าเสื้อผ้าเปื้อนลิปสติก ให้ถูส่วนนั้นด้วยขนมปังขาว
ผู้ถูกนกกรด ใช้ล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วเอาน้ำส้มสายชูไปล้าง
บอเนต ๒ เปอร์เซ็นต์ปิดแผลไว้

๒๑๐ ผาตาดำเพราะไล่มานาน ต้องการจะให้ดูใหม่ขึ้น ให้สงครามแก่ ๆ
 ชิบที่ผิดรูปไม่คล่อง ไซ้เทียนไขจะทำไมหุดคล่องขึ้น
 ๒๑๑ วิชาวางกลวยหอมสูกทั้งหวโดยไม่ให้ซ้ำ ต้องควาหวกลวยแทนที่จะ
 วางหางหรือจะไซ้เชือกผูกแขวนไว้ก็ได้ กลวยจะไม่ซ้ำเช่นกัน
 จะลบรอยคราบนาตามภาชนะ ให้ได้เกล็ดสารส้มทั้งไว้สัก ๒—๓

เกล็ด

๒๑๒ ต้นกุหลาบที่หนอนกินใบ มีวิธีทำให้หนอนไม่กินได้โดยหา
 เปลือกไข่ที่ไซ้แล้วแต่ยังเป็นรูปที่ไม่บอบสลาย ครอบไว้บนปลายไม้เล็ก ๆ
 ปักไว้ให้ต้นกุหลาบได้ทำไร่ยังดเปลือกไข่ไซ้จะต้องเป็นไข่ไก่

๒๑๓ เนยที่นำออกจากตู้เย็น ทำให้อ่อนตัวได้โดยใช้ขามอุ่นครอบจานเนย
 ต้องการจะให้กระจกใสสะอาด ใช้น้ำอุ่น ๕ แก้วผสมน้ำมันกาด
 หนึ่งช้อนโต๊ะเช็ดคร้วจะหายกลืนเหี้ยน ถ้าใช้รอยผงกาแฟให้เกิดควันช่วย
 ๒๑๔ ลินชักที่ผิดตดแน่น ไซ้ผงถูดานข้างลนชักและดงลนชักเข้า—ออก
 ๒—๓ ครั้งจากนั้นจะเปิดลนชักงายขึ้น

๒๑๕ เค็ชแก้วหรือเค็ชกระจกตกไล่พรหม หรือพินไม่สามารถจะเก็บหมด
 ให้ใช้สบู่แตะบริเวณเหล่านั้นนเค็ชแก้วขนาดเล็ก ๆ ก็จะมีหมดไป

๒๑๖ ผาที่ถูกยางมะตอยให้ใช้กระดาษห่อของวางทาบทาแล้วรตรอนด้วย
 เตา รตรอน ๆ ยางมะตอยจะซึมอยู่กับกระดาษ

๒๑๗ บ้องกัณมีให้หนึ่งถือถูกหนูกัด แมลงสาบ หรือตัวแมลงอื่น ๆ ควร
 ไล่การะบุน ตามหงหรือชนหนึ่งถือ

๒๑๘ อย่างนั่งเล่นริมเตียง เพราะจะทำให้หมอนหนุนและหมอนหนุนทรุด
 ลงกว่าตรงกลาง

อากาศร้อนอยากนอนให้สบาย ใช้แอลกอฮอล์อย่างเจือจางพรม
ผ้าปูที่นอนอย่างเบาบาง

อากาศหนาว ควรปูกระดานหนังสือพิมพ์เก่า ๆ หลาย ๆ ชั้นไว้
ใต้ที่นอนจะช่วยให้อุ่นขึ้น

ใช้ไข่ขาว ๑ ฟองตีผสมกับแอมมูนิอะม จะช่วยให้ผมดำเป็นเงา
เนอวรัสตมส์ชมพูนแสดงว่าเป็นเนอทมเชอโรค เนอวรัสตมส์
ตอมส์แดงเข้ม ส่วนมนมส์เหลือง

ใส่ข้าวสารลงในกระปุกเกลือเล็กน้อย จะทำให้เกลือไม่ชื้นและติด
กันเป็นก้อน

ท่านต้องการจะเก็บพลาสติกเอาไว้นาน ๆ จงเอาน้ำตาลหวาน ๆ โรย
ลงบนพลาสติกจะได้ผลดี

ถ้ารอยเกลือปนเล็กน้อยลงในน้ำกาแฟ จะทำให้กาแฟมีกลิ่นหอม
และรสโอชาขึ้นด้วย

น้ำมันที่เหลือใช้จากการทอดปลา ควรเอามันฝรั่งปอกเปลือกแล้ว
สัก ๒-๓ หัวใส่ลงไปจะทำให้น้ำมันสะอาดและเก็บไว้ใช้ได้ต่อไป

มะนาวก่อนที่จะใช้ปรุงอาหารควรแช่น้ำไว้สัก ๕-๑๐ นาที จะทำให้
มะนาวมีรสชาติออกหนึ่งเท่าตัว

ขนเนอหรือมันไซส์ตวทกำลังร้อน ไม่ควรจะมีมดตัดในขณะนั้น
เพราะจะทำให้หมดเสียคม

ถ้าหากนมเปรี้ยวหรือบุดไม่ควรทิ้ง ควรจะเอาเครื่องเงินมาแช่ไว้สัก
ครึ่งชั่วโมงแล้วขัด เครื่องเงินของท่านจะสะอาดเหมือนของใหม่

ถ่านหินหรือถ่านขรรคมดา ก่อนใช้ตัดไฟควรเอาน้ำเกลือราดเสีย
ก่อนให้ทั่วแล้วทงไว้ให้แห้ง เวลาตัดไฟจะทำให้ไฟลุกและใช้ได้นาน

ถ่านนํ้าร้อนใส่ถวญแก้วมักจะแตกได้ง่าย ถ้าจะไม่ให้แตกท่านควร
รินนํ้าแต่่น้อยแล้วชยั้บไปมา ให้ความรอนกระจายไปทั่วเนื้อแก้ว แล้วจรง
รินต่อให้เต็มทำเช่นนี้ถวญแก้วจะไม่แตกเลย

กระเทียม ถากกลนกระเทียมตมมือหรือภาชนะใช้สอย จะละลาย
เมล็ดพันธุ์ผักกาดปนนํ้าอุ่นล้างกลนจะหาย

ไข่ ถ้าเอานํ้ามันมะพร้าวหรือนํ้ามันหมูเช็ดให้ทั่วจะรักษาให้เสียช้า
กว่าขรรคมดา

เก็บผักสดไว้นาน ๆ จรงบรรจุไว้ในขวดที่ใส่เกลือชนิดหน่น้อย แล้ว
บีดฝาเสียให้แน่น

ถุงแพรจะทำให้ทน เอาโซดาไบคาร์บอเนตโรยเสียก่อนใช้ ถุงนั้น
จะทนมากขึ้น

นาฬิกาพกวิธล้าง เปิดฝาทออกแล้วเอาลํ้าชุบน้ำมันเคโรซินพอชน ๆ
เผื่อให้เต็มบีดฝาทอดไว้ ๔-๕ วันผงทจบบเครื่องจะตดทลํ้าล

เมื่อกปลาถ้าจะล้างออกให้หมด ใช้ลํ้ารลํ้ามถุหลาย ๆ ครั้งจะออกได้
ต้มไข่ควรให้นํ้าเดือดเสียก่อน แล้วจึงใส่ไข่พอสุกยกกลงแช่ในนํ้านั้น
ต่อไปอีกสักประเดี๋ยวจ้ไข่ขาวจะไม่เหนียว

เครื่องเรือน เครื่องประดับ ภาชนะที่ทาทวญหินอ่อน ถ้าใช้เปื้อน
แล้วให้ใช้มะนาวผ่าซีกถู

หินอ่อนที่สกปรกผสมผงซอล์คกับนํ้าโซดาให้ชนขนาดเบ้งเปี้ยกแล้ว
ทาหินอ่อนให้ทั่วทงไว้สัก ๒๔ ชั่วโมง แล้วเช็ดล้างจะสะอาดด

ถ้าจะให้เค็กนุ่มใส่ไข่ไก่ที่ตดชนแล้ว (เลือกไข่สดใหม่ที่สุด) แล้ว
ไข่ขาวที่ตดชนแล้วจะทำให้เค็กเบาอกด้วย

นมที่จะใช้ทำเค็กผสมน้ำส้มเล็กน้อย เมื่อสุกเค็กนั้นจะเบาลง

มะนาวที่ตดชนเมื่อตดควรใช้ยากันบูดหน่อยจะดี

ดอกไม้ ถ้าจะให้สดได้นาน ๆ ควรใส่ยาแก้ปวดในน้ำที่แช่ดอกไม้
ไวหลาย ๆ เม็ด

ชาวตมถ้าจะให้แกะได้ง่าย ก่อนจะตดชาวตมควรยกหม้อชาวลงจากเตา
แล้ววางไว้ที่ตดสักครู่หนึ่ง จะทำให้แกะได้ง่าย

ชาวตมถ้าจะให้ดี เวลาตมควรใส่ข้าวเหนียวผสมนิดหน่อยจะดี

น้ำชาที่คางคนไม่ควรตม จะทำให้ปวดหลัง (ตามคนแก่)

น้ำคางผสมกับน้ำมันแถวตำละเอียด กับไข่ขาวของไข่ไก่ให้ทาแก้ส
เม็ดพริกไทย ใช้แทนลูกเหม็นได้

